

فصل هفتم

آمار و احتمال

- مقدمه‌ای بر علم آمار
- جامعه، نمونه و انواع متغیرها
- اندازه‌گیری شانس

کاربرد علم آمار در علوم پزشکی



کاربرد علم آمار در مهندسی کامپیوتر



کاربرد علم آمار در محیط زیست



کاربرد علم آمار در مهندسی کشاورزی



امروزه آمار به عنوان یک علم پرکاربرد در همه علوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای علم آمار، در علوم مختلف را ملاحظه می‌کنید و در ادامه این فصل با این کاربردها آشنا می‌شویم.

مقدمه‌ای بر علم آمار

فعالیت

آیا تاکنون به نقش اعداد و ارقام در زندگی روزمره یک خانواده فکر کرده‌اید؟



خانواده‌ای شامل پدر، مادر و فرزندان را در نظر بگیرید. به عنوان مثال:

اعضای این خانواده در فصل بهار، قصد رفتن به مسافرت تفریحی به یکی از شهرهای کشور را دارند. برای این منظور پدر و مادر خانواده با دیدن اخبار هواشناسی، به دنبال تعیین مناسب‌ترین زمان برای مسافرت خود هستند. در این اخبار، کارشناس هواشناسی می‌گوید:

«با جمع‌آوری اعداد و ارقامی در مورد میزان دمای هوا، میزان رطوبت

ها و میزان بارش باران در ۱۰ روز گذشته، با استفاده از مدل‌های مربوط به هواشناسی، پیش‌بینی می‌شود، هوا در پنج روز آینده ۵ درجه گرم‌تر، میزان رطوبت تغییری نمی‌کند و هوا صاف و آفتابی است».

پدر و مادر، با شنیدن این گزارش، تصمیم می‌گیرند به همراه فرزندان خود در این پنج روز به مسافرت بروند.

بنابراین سازمان هواشناسی با استفاده از روش‌های شامل جمع‌آوری اعداد و ارقام مربوط به دما، رطوبت و میزان بارش، سازماندهی و نمایش آن اعداد و ارقام و انجام تحلیل و تفسیر بر روی آن اعداد و ارقام با استفاده از روش‌های آماری به پیش‌بینی وضعیت هوا در پنج روز آینده پرداخته است. هرچقدر این اطلاعات کامل‌تر باشد، با تجزیه و تحلیل دقیق، مناسب‌ترین زمان و لوازم برای سفر را پیش‌بینی کرده و بهترین تصمیم را اتخاذ می‌نمایند.

بنابراین ما در زندگی روزمره با مجموعه‌ای از اعداد، ارقام و اطلاعات که به آن آمار می‌گویند، سروکار داریم و با استفاده از جمع‌آوری، سازماندهی و تحلیل و تفسیر آنها بر اساس روش‌های آماری به نتیجه‌گیری، قضاؤت و پیش‌بینی در مورد پدیده‌ها و آزمایش‌های تصادفی می‌پردازیم.

تعريف علم آمار

مجموعه روش‌هایی که شامل جمع‌آوری اعداد و ارقام، سازماندهی و نمایش، تحلیل و تفسیر داده‌ها و در نهایت نتیجه‌گیری، قضاؤت و پیش‌بینی مناسب بر اساس تحلیل داده‌هاست را علم آمار می‌گویند.

کارد در کلاس

۱- در پیرامون خود، مثال‌هایی از تصمیم‌گیری یا پیش‌بینی بر اساس اعداد و ارقام بیاورید؟

کاربرد علم آمار در مهندسی کامپیوتر

(پردازش تصویر)



هر تصویر از تعداد زیادی مربع‌های کوچک تشکیل شده است. هر یک از این مربع‌های کوچک پیکسل نام دارند و به هر پیکسل می‌توان یک عدد را نسبت داد که بیانگر مقدار روشنایی آن پیکسل است.

در واقع هر تصویر از یک جدول عددی تشکیل می‌شود که هر یک از اعداد مقدار روشنایی هر پیکسل را نشان می‌دهند. جدول مربوط به هر تصویر را به راحتی می‌توان به دست آورد. در اینجا نکته حائز اهمیت، کاربرد پردازش تصویر است.

پردازش تصویر یکی از موضوعات بسیار مهم در مهندسی کامپیوتر محسوب می‌شود. رشد استفاده از پردازش تصویر در سیستم‌های کنترل هوشمند سرعت، خواندن اتوماتیک پلاک خودرو در طرح‌های زوج و فرد و طرح ترافیک و ثبت تخلفات خودرو در سال‌های اخیر مشهود بوده است.



با استفاده از معیارهایی که در علم آمار وجود دارد می‌توان به بررسی کیفیت تصاویر پرداخت و تصاویر مخدوش و نامناسب را با تصاویر حقیقی‌شان مورد مقایسه و شناسایی قرار داد.



۲- کدام جملات درست و کدام جملات نادرست است :

الف) اولین قدم در استفاده از علم آمار، جمع‌آوری داده‌هاست

ب) پیش‌بینی و تصمیم‌گیری برای آینده نتیجه استفاده از علم آمار است

ج) جمع‌آوری داده‌ها و رسم نمودارهای آماری، همان علم آمار است

۳- مراحل علم آمار را در شکل زیر کامل کنید؟



۴- به شکل زیر توجه کنید : آیا این شکل را می‌توان به اعداد و ارقام تبدیل کرد؟ اعداد و ارقام آن چگونه‌اند؟ برای پاسخ به این سوالات از مطالب حاشیه این صفحه استفاده کنید؟



تمرین

۱- مدیر یک کارخانه لامپ‌سازی برای پیدا کردن تعداد کل لامپ‌های معیوب در یک ماه آینده، می‌خواهد یک تحقیق آماری انجام دهد. برای این منظور تعداد لامپ‌های معیوب را در پنج روز کاری به صورت زیر جمع‌آوری کرده است.

روزهای کاری	تعداد لامپ‌های معیوب	شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه
۱۳	۱۱	۹	۷	۵	۱۱	۱۳

بر اساس داده‌های به دست آمده مدیر کارخانه متوجه می‌شود، تعداد لامپ‌های معیوب براساس یک دنباله حسابی، در حال افزایش است. بر اساس اطلاعات داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) اعداد و ارقام در این تمرین نشان‌دهنده چه چیزی هستند؟


ب) دنباله حسابی مربوط به تعداد لامپ‌های معیوب را به دست آورید؟

ج) مدیر کارخانه از روی داده‌ها چه تحلیل و تفسیری انجام می‌دهد؟

د) بهترین تصمیمی که مدیر کارخانه می‌تواند بگیرد چیست؟

متوقف کردن خط تولید لامپ‌ها ادامه خط تولید لامپ‌ها

۲- فرض کنید رنگ سبز را با عدد ۳، رنگ زرد را با عدد ۲، رنگ قرمز را با عدد ۱ و رنگ مشکی را با عدد صفر، نشان دهیم. جدول عددی و شکل زیر را کامل کنید؟



۱	?	?
?	?	۰
۱	۰	۲

کاربرد علم آمار در پزشکی
(مسئله چاقی)



یکی از کاربردهای علم آمار در علوم پزشکی، بررسی مسئله چاقی است. برای اینکه میزان چاقی یک فرد را بسنجیم از معیاری تحت عنوان، معیار شاخص توده بدن استفاده می‌کیم. این معیار از تقسیم وزن افراد (W) بر قد افراد (H) به توان دو

یا به عبارت دیگر $\frac{W_{kg}}{(H_m)^2}$ محاسبه شده و براساس آن نتایج زیر بدست می‌آید:

شاخص توده بدن	طبقه‌بندی
کمتر از ۱۸/۵	کم وزن
۲۴/۹ تا ۱۸/۵	وزن طبیعی
۲۹/۹ تا ۲۵	اضافه وزن
۳۴/۹ تا ۳۰	چاقی درجه یک
۳۹/۹-۳۵	چاقی درجه دو
پیشتر از ۴۰	چاقی درجه سه

براساس علم آمار با استفاده از مدل‌های آماری مناسب تحت عنوان مدل‌های رگرسیونی، عوامل مؤثر بر شاخص توده بدنی شناسایی می‌شود. به عنوان مثال، عواملی همچون رژیم غذایی ناسالم، کم تحرکی، فشارخون و چربی خون می‌تواند در بالا رفتن این معیار و ایجاد بیماری چاقی مؤثر باشد. از سوی دیگر، با استفاده از مدل‌های رگرسیونی، بیماری چاقی، به عنوان یک عامل مهم زمینه‌ای در بروز بیماری‌ها از جمله افسردگی، دردهای مفصلی و انواع نارسالی‌ها و حملات قلبی-عروقی شناخته شده است. بنابراین، امروزه با توجه به تغییر شیوه‌های زندگی، به سوی ماشینی شدن و کم تحرکی و همچنین استفاده از خوراکی‌های آماده و فست‌فودها نیاز به استفاده از رژیم غذایی سالم، عدم مصرف خوراکی‌های مضر و ورزش و فعالیت بدنی، بسیار ضروری می‌باشد.

جامعه و نمونه


فعالیت

مسئله چاقی امروزه، به عنوان یکی از مسائل مهم و اساسی در زمینه سلامت افراد محسوب می‌شود. برای اطلاع بیشتر، حاشیه رو به رو را مطالعه کنید.
به شکل زیر توجه کنید. این شکل افراد یک شهر را نشان می‌دهد که شامل افراد عادی و افراد چاق می‌باشد.

می‌خواهیم تعداد کل افرادی که در این شهر زندگی می‌کنند را بشماریم.

به نظر شما، این تعداد چه عددی است؟
چند درصد از افراد این شهر چاق و چند درصدی عادی هستند؟
برای پاسخ دادن به سؤالات بالا، با مشکلاتی رو به رو هستیم. به سرعت نمی‌توانیم به سؤالات بالا پاسخ دهیم یا در شمارش افراد چاق و عادی دچار اشتباه شویم.

اکنون به جای شمارش کل افراد این شهر، تعدادی از افراد شهر را به طور تصادفی انتخاب کرده و براساس افراد انتخاب شده، یک بار دیگر به سؤالات پاسخ می‌دهیم.



افراد انتخابی از شهر

همانطور که ملاحظه می‌کنید این بار پاسخ به سؤالات به سرعت، با دقت بیشتر و آسان‌تر داده می‌شود و به راحتی درصد افراد چاق در زیر مجموعه انتخابی قابل محاسبه است.

تعريف جامعه یا جمعیت

مجموعه‌ئ تمام افراد یا اشیائی که در مورد یک یا چند ویژگی آنها تحقیق صورت گیرد، جامعه یا جمعیت گویند و هر یک از این افراد یا اشیا را عضو جامعه می‌گویند.

تعریف اندازه یا حجم جامعه

تعداد اعضای جامعه را اندازه جامعه یا حجم جامعه گویند.
به عنوان مثال افراد یک شهر، دانشآموزان یک مدرسه، تولیدات یک کارخانه و غیره می‌تواند یک جامعه باشد.

تعریف نمونه

بخشی از جامعه که به تصادف انتخاب شود را نمونه گویند و هر یک از افراد یا اشیایی که به تصادف انتخاب شوند را عضو نمونه گویند.


تعریف اندازه یا حجم نمونه

تعداد اعضای نمونه را اندازه نمونه یا حجم نمونه گویند.
به عنوان مثال، افراد انتخابی از شهر، به عنوان یک نمونه و حجم نمونه برابر 20% است.

کار در کلاس

دو کارخانه تولید قطعات الکترونیکی مانند قطعه موجود در نمودار این صفحه را در نظر بگیرید. در نمودار زیر تعداد کل قطعات تولیدی این دو کارخانه مشخص شده است و همچنین به منظور شناسایی قطعات معیوب، نمونه‌هایی از تعداد کل قطعات تولیدی انتخاب می‌شود که تعداد آنها در نمودار مشخص شده است.

نمودار مربوط به تعداد قطعات تولیدی



با توجه به اعداد و ارقام موجود در نمودار، جدول زیر را کامل کنیم؟

جامعه	عضو جامعه	اندازه جامعه	عضو نمونه	اندازه نمونه
کارخانه الف	قطعات تولیدی		قطعات تولیدی	۱۵۰
				نمونه‌های انتخابی

تمرین

کاربرد علم آمار در مهندسی کشاورزی (طراحی و نحوه تولید محصولات)



علم آمار در مهندسی کشاورزی کاربرد بسیار زیادی دارد. یک مهندس کشاورز همواره علاقه مند است تا میزان تولید محصولاتش به بیشترین حد ممکن برسد. برای این منظور، مهندس کشاورز از انواع کودها مانند نیترات آمونیوم، فسفر و غیره استفاده می‌کند. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که چه میزان کود می‌بایست استفاده شود تا کیفیت و میزان تولید محصولات آن به بیشترین مقدار برسد؟ اینجاست که علم آمار با طراحی آزمایش‌هایی، به این سؤال پاسخ می‌دهد. بدین منظور، قطعات مختلفی از زمین به طوری که از نظر رطوبت، حاصلخیزی خاک، نور و غیره کاملاً همگن باشند، در نظر گرفته می‌شود. سپس به مطالعه درصدهای مختلف کودهای مورد نظر در این قطعات زمین برداخته می‌شود.

به عبارت دیگر علم آمار در تعیین عوامل مؤثر مانند کودهای مورد استفاده در زمین کشاورزی و سطوحی از عوامل مانند درصدهایی از میزان استفاده کودها برای رسیدن به تولیدات بیشتر کشاورزی به مهندسان کشاورزی کمک می‌کند.



۱- می خواهیم در مورد کیفیت محصولات تولیدی یک کارخانه تحقیقی انجام دهیم . به این منظور، تعداد کل قطعات تولید شده در کارخانه درنظر گرفته شده که برابر با ۱۰۰۰۰ قطعه می باشد. از میان قطعات تولید شده به تصادف ۱۰۰ قطعه انتخاب می شود. با توجه به اطلاعات موجود، جدول زیر را کامل کنید.

جامعه	اندازه جامعه	نمونه	ویژگی مورد بررسی	اندازه نمونه

۲- کدام جمله درست و کدام جمله نادرست است :


الف) اندازه جامعه کمتر از اندازه نمونه است.....

ب) اعضای نمونه، همان اعضای جامعه هستند.....

ج) اعضای نمونه، نماینده اعضای جامعه نیستند.....

د) اعضای نمونه با استفاده از روش خاصی انتخاب می شوند.....

۳- در شکل زیر، تعداد مهره‌های سبز و قرمز مشاهده می شوند. بخشی از این مهره‌ها به تصادف با خط آبی مشخص شده‌اند. جامعه، نمونه، اعضای جامعه و اعضای نمونه را مشخص کنید؟




فعالیت

شکل زیر محصولات هلوی یک مزرعه کشاورزی را نشان می‌دهد. میوه‌های هلوی این مزرعه را به عنوان اعضای جامعه در نظر بگیرید. یکی از میوه‌های هلو را انتخاب کنید و آن را a بنامید. برای بررسی کیفیت این میوه، یکی از ویژگی‌هایی که این میوه می‌تواند داشته باشد وزن و یا درشتی آن است. به نظر شما :



منظور از اندازه‌گیری وزن و درشتی میوه هلو چیست?
چگونه می‌توان وزن و درشتی این میوه را اندازه‌گیری کرد؟

کشاورز چگونه می‌تواند تولیدات و کیفیت میوه هلوی خود را به حد اکثر برساند؟ (برای پاسخ به این سؤال، مطالب حاشیه صفحه را مطالعه کنید).



برای پاسخ دادن به این سؤالات می‌توان با استفاده از یک ترازو، میوه هلو را وزن کرد و عددی مانند y را بر حسب کیلوگرم به وزن آن اختصاص داد. در واقع ترازو نقش تابعی مانند f را بازی می‌کند به طوری که بین عدد y به عنوان وزن میوه هلو و x به عنوان خود میوه هلو، رابطه‌ای به صورت $y=f(x)$ برقرار می‌کند. به شکل رو به رو توجه کنید :

برای اندازه گیری درشتی میوه هلو چه باید کرد؟ آیا ترازو، پاسخ این سؤال را هم می‌دهد؟ برای پاسخ به این سؤال باید گفت که هیچ ترازو و یا وسیله‌ای که بتواند میزان درشتی میوه هلو را اندازه گیری کند، وجود ندارد. با این حال کشاورزان با توجه به درشتی میوه هلو، این میوه را به صورت درجه یک، درجه دو و درجه سه به بازار عرضه می‌کنند. به عبارت بهتر عدد یک را به میوه‌های هلوی بسیار درشت، عدد دو را به میوه‌های هلوی متوسط و عدد سه را به میوه‌های هلوی ریز نسبت می‌دهند.

اندازه گیری یک ویژگی

فرض کنید x یکی از افراد جامعه و t ویژگی آن فرد باشد. منظور از اندازه گیری ویژگی t برای فرد x ، اختصاص دادن یک عدد مانند y طبق تابعی مشخص مانند f به فرد x است. به عبارت بهتر $y=f(x)$.

تعریف متغیر

ویژگی t ، که در افراد جامعه یکسان نیست و معمولاً از یک فرد به فرد دیگر تغییر می‌کند را متغیر می‌گویند.

تعریف مقیاس

عددی که به ویژگی یک فرد نسبت داده می‌شود را مقیاس متغیر می‌گویند.

کاردکلاس

شکل رو به رو نشان‌دهنده یک خودرو است، برخی از ویژگی‌های این خودرو در شکل مشخص شده است، به عنوان مثال سرعت خودرو، میزان بنزین مصرفی و مدل خودرو در نظر گرفته شده است.



سرعت خودرو و میزان بنزین مصرفی قابل اندازه گیری است، به عنوان مثال سرعت خودرو در جاده‌ها 120 کیلومتر بر ساعت است. به عبارت دیگر مقیاس سرعت خودرو 120 کیلومتر بر ساعت است. همچنین هر خودرو به عنوان مثال برای هر 100 کیلومتر، 10 لیتر بنزین مصرف می‌کند بنابراین مقیاس میزان مصرف خودرو 10 لیتر برای هر 100 کیلومتر است.

ولی مدل خودرو قابل اندازه گیری نیست و معمولاً مدل

کاربرد علم آمار در محیط زیست



خودرو، همان سال تولید خودرو می‌باشد به عنوان مثال مدل خودروی سال ۱۳۹۴. بنابراین مقیاس مدل خودرو همان سال تولید آن است.


- ✓ به نظر شما چه متغیرهای دیگری در این خودرو می‌توان معرفی نمود؟
- ✓ در متغیرهای معرفی شده جدید، کدام متغیر قابل اندازه‌گیری و کدام متغیر قابل اندازه‌گیری نیست؟
- ✓ مقیاس هریک از متغیرهای معرفی شده جدید را بیان کنید؟

تمرین

۱- با توجه به مطالب حاشیه رو به رو، متغیرها و مقیاس‌های مربوط به یوزپلنگ ایرانی را در

جدول زیر بنویسید؟

مقیاس	متغیر	ویژگی یوز ^۱



یکی از کاربردهای علم آمار، در محیط‌زیست است. به عنوان مثال با استفاده روش تحقیق عاملی در علم آمار می‌توان به شناسایی و شناخت عوامل مؤثر بر زیستگاه‌های مطلوب حیوانات در حال انفراض اشاره نمود. این موضوع مدیران محیط‌زیست را در مدیریت و حفاظت از این زیستگاه‌ها یاری می‌کند.

یکی از این حیوانات در حال انفراض یوزپلنگ ایرانی است. یوزپلنگ ایرانی یک زیستگونه بشدت در معرض خطر انفراض از یوزپلنگ است که اکنون تنها چند ده قلاده از آن در ایران یافت می‌شود. این جانور در مناطق بیابانی در سطح منطقه زندگی می‌کرد و سال‌های است که نسل آن در معرض نابودی کلی قرار دارد. یوزپلنگ از خانواده گربه‌سانان به شمار می‌آید، اما به دلیل داشتن دست و پایی بلند، بدنه کشیده و باریک، و سینه‌ای فراخ تا حدود زیادی به سگ‌های تازی شبیه است. در میان گربه‌سانان، یوز با داشتن ارتفاع شانه‌ای برابر با ۷۶–۸۳ سانتی‌متر و وزنی میان ۷۷–۷۰ کیلوگرم از جمله گربه‌سانان کوچک‌جثه به شمار می‌رود. اندازه طول بدن به $1\frac{1}{2}$ متر می‌رسد و طول دم نیز بین ۶۶–۸۴ سانتی‌متر. ماده‌های این جانور اندکی کوچک‌تر و لاغرتر از نرها هستند. سر این جانوران به نسبت کوچک است و سینوس‌های بزرگ و گذرگاه‌های هوایی بینی بیشتر حجم جسمجه را می‌پوشانند. چنین چیزی باعث شده است که یوز فک و دندان‌های کوچک‌تری داشته باشد.

۲- در یک کارخانه، کارگران مختلفی مانند شکل رو به رو، مشغول کار هستند. این چهار کارگر از شهرهای مختلف هستند. از سویی دیگر، مهندس این کارخانه، این کارگران را از نظر مهارت درجه‌بندی نموده است. کدام جملات درست و کدام جملات نادرست است.



- الف) درجه‌بندی کارگران از نظر مهارت قابل اندازه‌گیری نیست.....
- ب) سن کارگران قابل اندازه‌گیری نیست.....
- ج) کارگران هر شهر با اعداد ۱، ۲، ۳ و ۴ مشخص می‌شوند.....

۳- کدام یک از موارد زیر متغیر و کدام یک از موارد زیر مقیاس هستند؟

الف) سن کارگران

مقیاس

متغیر

ب) عدد ۴۰ سن یکی از کارگران است.

مقیاس

متغیر

ج) مهارت کارگران از سمت چپ به راست با اعداد ۱، ۲، ۳ و ۴ مشخص شده‌اند.

مقیاس

متغیر

فعالیت


در یک شهر، با افراد مختلفی رو به رو می شویم و از آنها سؤالاتی را می برسیم و آنها به صورت زیر پاسخ می دهند. به عنوان مثال:

از یک آقا و خانم می برسیم، چقدر از آشپزی کردن لذت می برید؟

از مادر یک خانواده می برسیم، چند فرزند دارید؟



از همان خانم و آقا می برسیم، قد شما چند سانتی متر است؟



حال به سؤالات زیر پاسخ دهید :

		نام متغیر
۱	-	تعداد فرزندان
۲	-	قد افراد
		گروه خونی
		چقدر از آشپزی کردن لذت می برید؟

۱- با توجه به شکل های مورد نظر، پاسخ های افراد را در جدول رو به رو قرار داده و آن را کامل کنید؟



۲- با توجه به متغیرهای بیان شده، کدام متغیرها قابل اندازه‌گیری هستند و کدام نیستند؟ به جای علامت سوال، نام متغیر مورد نظر را بنویسید؟

تعريف متغیرهای کمی
متغیرهایی که قابل اندازه‌گیری هستند را متغیرهای کمی گویند. به عنوان مثال تعداد فرزندان و قد افراد متغیرهای کمی هستند.


تعريف متغیرهای کیفی

متغیرهایی که قابل اندازه‌گیری نیستند را متغیرهای کیفی گویند. به عنوان مثال گروه خونی، پاسخ سؤال «چقدر از آشپزی لذت می‌برید؟» متغیرهای کیفی هستند.

کار در کلاس

با توجه به شکل‌های زیر جملات را کامل کنید:

- در شکل الف، تعداد مسافران یک قطار، یک متغیر.....**کمی**..... است.
- در شکل ب، مقام اول، دوم و سوم یک ورزشکار، یک متغیر است.
- در شکل ج، قد فرد، یک متغیر..... است.
- در شکل د، جنسیت افراد یک متغیر..... است.



تمرین

۱- نوع متغیرهای زیر را مشخص کنید:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> کمی | <input type="checkbox"/> کیفی |
| <input type="checkbox"/> کمی | <input type="checkbox"/> کیفی |
| <input type="checkbox"/> کمی | <input type="checkbox"/> کیفی |

الف) انواع هواپیما (مسافربری، باربری، اف ۱۴)

ب) مدت زمانی که طول می‌کشد از خانه به مدرسه بررسید

ج) رنگ چشم

۲- در جدول زیر، پاسخ شما چه نوع متغیری است؟

نوع متغیر	پاسخ (مقیاس)	سؤال (متغیر)
	مشکی، قهوه‌ای، طلایی	رنگ موی شما چه رنگی است؟
	۶ کیلوگرم	وزن شما چه عددی است؟
	بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، بسیار کم	چقدر از دیدن بازی فوتبال لذت می‌برید؟

فعالیت

همانگونه که در فعالیت صفحه قبل مطرح شد، پاسخ دو سؤال زیر متغیرهایی از نوع متغیر کمی هستند.



- سؤال ۱ : از مادر یک خانواده می‌بریم، چند فرزند دارد؟

پاسخ : ۲ فرزند

- سؤال ۲ : قد شما چند سانتی متر است؟

پاسخ : ۱۸۲/۵ یا ۱۷۰ سانتی متر

- ✓ پاسخ کدام سؤال، فقط اعداد صحیح ۱، ۲، ۳ و ... است؟

✓ پاسخ کدام سؤال، هم به صورت اعداد صحیح و هم به صورت اعداد اعشاری نمایش داده می‌شود؟

- ✓ در شکل بالا، به جای علامت سؤال، پاسخ دو سؤال در کدام قسمت قرار می‌گیرد؟

انواع متغیرهای کمی

۱- متغیرهای گسسته - متغیرهای پیوسته

تعریف متغیرهای گسسته : متغیرهایی که فقط مقادیر صحیح $0, 1, 2, \dots$ می‌گیرند را متغیرهای گسسته گویند. یا به عبارت دیگر مقیاس آنها مقادیر صحیح $0, 1, 2, \dots$ است.

تعریف متغیرهای پیوسته : متغیرهایی که مقادیر صحیح و اعشاری می‌گیرند را متغیرهای پیوسته گویند. یا به عبارت دیگر مقیاس آنها مقادیر صحیح و اعشاری است.


کار در کلاس

با توجه به شکل‌های زیر جملات زیر را کامل کنید :

- در شکل الف، تعداد مسافران یک قطار، یک متغیر است و این تعداد برابر با است.

- در شکل ب، قد یک فرد، یک متغیر است و مقدار آن برابر است.

- در شکل ج، سرعت خودرو یک متغیر است. مقدار آن متغیر پیوسته است. ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت است.



تمرین

۱- انواع متغیرهای زیر را مشخص کنید :

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> پیوسته | <input type="checkbox"/> گسسته | الف) تعداد ماهی‌های یک دریا |
| <input type="checkbox"/> پیوسته | <input type="checkbox"/> گسسته | ب) مدت زمانی که طول می‌کشد از خانه به مدرسه برسید |
| <input type="checkbox"/> پیوسته | <input type="checkbox"/> گسسته | ج) وزن افراد |
| <input type="checkbox"/> پیوسته | <input type="checkbox"/> گسسته | د) تعداد دانشآموزان یک مدرسه |

۲- در جدول زیر، پاسخ شما چه نوع متغیری است؟

نوع متغیر	ح (مقیاس)	سؤال (متغیر)
	بین ۱۷۲ تا ۱۸۰ سانتی متر	قد شما چه عددی است؟
	۰/۵ کیا گرم	وزن شما چه عددی است؟
	۱، ۰، ۱، ۲، ۳	تعداد دوستان شما چند نفر است؟

فعالیت

با توجه به دو سؤال زیر که در صفحات قبل مطرح شده است، پاسخ دو سؤال زیر، متغیر کیفی است :

- سؤال : از یک آقا و خانم می‌پرسیم، چقدر از

آشپزی کردن لذت می‌برید؟

پاسخ : خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم

- سؤال : گروه خونی خود را بگویید؟

پاسخ : گروه خونی A یا B

✓ پاسخ کدام سؤال، اعداد ترتیبی است؟

✓ پاسخ کدام سؤال، اعداد غیرترتیبی است؟

✓ در شکل رویه‌رو، به جای علامت سؤال، پاسخ

دو سؤال در کدام قسمت قرار می‌گیرد؟



أنواع متغيرات كيفية

١- متغيرات اسمى (غير ترتيبى) - ٢- متغيرات اسماً ترتيبى

تعريف متغيرات اسمى (غير ترتيبى) : متغيرات اسماً ترتيبى نىستند و برای نشان دادن آنها از اعدادى دلخواه استفاده مى کنیم. این اعداد همان مقیاس متغير اسماً ترتيبى هستند که صرفاً برای نشان دادن ویژگی متغير است و دارای ترتيب خاصی نىستند، همچنان قابل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم هم نىستند.

تعريف متغيرات اسماً ترتيبى : متغيرات اسماً ترتيبى نىستند و برای نشان دادن آنها از اعدادى دلخواه استفاده مى کنیم. این اعداد همان مقیاس متغيرات اسماً ترتيبى هستند که ترتيب درجه بندی ویژگی متغير را نشان مى دهند. همانند حالت قبل این اعداد نيز قابل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم نىستند.

أنواع متغيرات في در يك نگاه




كار در كلاس


با توجه به شکل های زیر، جملات زیر را كامل کنید :

- در شکل الف، جنسیت افراد، یک متغير اسمی است و زن با عدد ۱ و مرد با عدد ۲ نشان داده شده است.
- در شکل ب، مقام هایی که یک ورزشکار در مسابقه می آورد، یک متغير است و مقام اول، دوم و سوم به ترتیب با اعداد نشان داده شده است.
- در شکل ج، میزان علاقه شما در مورد ساندویچ سؤال شده است که یک متغير است و میزان علاقه شما بسیار زیاد، متوسط، کم و بسیار کم است که به ترتیب با اعداد نشان داده شده است.
- همه اعداد موجود در این سه شکل قابل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم

٥ ٤ ٣ ٢ ١
بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، بسیار کم



ج



١٤


تمرین

۱- نوع متغیرهای زیر را مشخص کنید :

- الف) سطح تحصیلات (دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی، دیپلم)
 اسمی ترتیبی
 ب) تزاد افراد (سفید پوست، زرد پوست، سیاه پوست)
 اسمی ترتیبی
 ج) وزن افراد (مشکی، قهوه‌ای، طلایی)
 اسمی ترتیبی

۲- نوع متغیرها را در شکل زیر، دسته‌بندی کنید؟

متغیر	متغیر
۵- میزان دمای هوا	۱- میزان بارندگی بر حسب سانتی‌متر در بک شهر
۶- شدت آودگی هوا (ازیاد، متوسط، کم)	۲- تعداد ک شهر
۷- انواع وضعیت هوا (آفتابی، ابری، بارانی، برفی)	۳- باران، برف
۸- شدت بارندگی (ازیاد، متوسط، کم)	۴- تعداد که هوای آفتابی دارند



۴- درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید؟

- الف) متغیرهای اسمی و ترتیبی قابل ضرب، تقسیم و ضرب هستند
 ب) متغیرهای پیوسته و گسسته قابل جمع، ضرب، تقسیم و ضرب هستند.....

احتمال و اندازه‌گیری شانس

مقدمه

در دو درس قبل، با مثال‌هایی از کاربرد علم آمار در مهندسی کامپیوتر، علوم پزشکی، مهندسی کشاورزی و محیط‌زیست آشنا شدیم. از آنجایی که در هر یک از این کاربردها، با پدیده‌های تصادفی یا آزمایش‌های تصادفی مانند، انتخاب تصادفی اعضای نمونه از بین اعضای جامعه روبرو هستیم. برای بدست آوردن نتایج موردنظر در هر یک از این کاربردها می‌بایست از علمی به نام علم احتمال استفاده کنیم.

در هر یک از این کاربردها، پیشامدهایی وجود دارند که ممکن است رخ بدهند یا ندهند و ما از چگونگی رخ داد آنها اطلاع نداریم. به عنوان مثال نمی‌دانیم کدام عضو جامعه در نمونه مورد نظر انتخاب می‌شود. چنین پدیده‌ها یا آزمایش‌هایی را که نتیجه آن به طور دقیق قابل پیش‌بینی نباشد اما از همه حالت‌های ممکن در به‌وقوع پیوستن آنها، مطلع باشیم پدیده‌های تصادفی یا آزمایش‌های تصادفی می‌namیم.

همانطور که در سال قبل خواندید، مجموعه شامل همه این حالت‌های ممکن، فضای نمونه‌ای نامیده می‌شود. اگر این مجموعه را S بنامیم هر زیر مجموعه S مانند A را یک پیشامد تصادفی در S می‌نامیم. به عنوان مثال تمام افراد یک جامعه، فضای نمونه‌ای S و هر زیر مجموعه این افراد که به تصادف انتخاب شوند پیشامد تصادفی هستند.

پیشامدهای تصادفی و جبر پیشامدها فعالیت

اگر دو تاس آبی و قرمز را با هم بیاندازیم، همه حالت‌های ممکن را در جدول زیر می‌توانید مشاهده کنید. ابتدا این جدول را کامل کرده و از طریق اصل ضرب، درستی تعداد کل حالت‌های موجود در جدول را بررسی کنید و سپس به سوال‌های زیر پاسخ دهید:

	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱	(۱,۱)	(۱,۲)			(۱,۵)	
۲	(۲,۱)		(۲,۳)			(۲,۶)
۳			(۳,۱)		(۳,۵)	
۴			(۴,۱)			
۵						(۵,۶)
۶	(۶,۱)					(۶,۵)

- ۱- در چند حالت مجموع دو عدد رو شده ۷ و در چند حالت مجموع دو تاس ۶ و در چند حالت مجموع دو تاس ۸ است.
خانه های مربوط به هر یک از این مجموع ها را در جدول صفحه قبل توسط پاره خط های قطری به هم وصل کنید. آیا این خطوط الگویی برای مجموع دو تاس مشخص می کند؟
- ۲- قطر آبی رنگ چه پیشامدی را شناس می دهد؟
- ۳- خانه های مربوط به حالت هایی که هر دو عدد رو شده زوج و هر دو عدد رو شده فرد هستند را هاشور بزنید، چه الگویی به دست می آید؟
- ۴- شما با توجه به جدول، یک مسئله طرح کنید.
- ۵- با توجه به جدول و قطراهای آن، تعداد حالت ها برای مجموع دو تاس، در چه اعدادی برابر است؟ (راهنمایی : تعداد حالت ها برای مجموع دو تاس ۵ و مجموع دو تاس ۹، برابر است)

کار در کلاس

فرض کنید می خواهیم یک تاس و یک سکه را با هم بیاندازیم :

- ۱- آیا می توانید نتیجه حاصل را به صورت قطعی بیان کنید؟
- ۲- آیا این پدیده یا آزمایش، تصادفی است؟
- ۳- همه حالت های ممکن را بنویسید. (فضای نمونه ای را تشکیل دهید)
- ۴- تعداد این حالت ها را با استفاده از اصل ضرب به دست آورید.
- ۵- جدول 2×6 یا 6×2 مربوط به این آزمایش رارسم کنید.

مثال ۱ : خانواده ای دارای ۴ فرزند است و از جنسیت فرزندان

این خانواده اطلاع نداریم، اگر ترتیب بدینا آمدن اهمیت داشته باشد با توجه به اصل ضرب تعداد همه حالت های ممکن برای فرزندان این خانواده عبارت است از $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$. حالت (پ، پ، د، پ) به معنی این است که فرزند اول با بزرگ تر در این خانواده پسر و فرزند دومی دختر و فرزند سوم و چهارم، پسر هستند. حالت (د، پ، پ، پ) را شما توضیح دهید.

الف) ۴ حالت وجود دارد که فقط یک دختر در این خانواده متولد

شده است و اگر این پیشامد را A بنامیم داریم :

$$A = \{(p, p, p, p), (p, p, p, d), (p, p, d, p), (d, p, p, p)\}$$

تصویر یک خانواده با
چهار فرزند

ب) اگر B را پیشامد «حداکثر یک دختر در خانواده» تعریف کنیم، در این صورت داریم :


$$\{(p, p, p, p) \text{ و } \dots \text{ و } \dots \text{ و } (p, p, p, d)\}$$

اگر C را پیشامد «تعداد فرزندان پسر و دختر برابر باشند» و D را پیشامد «تعداد فرزندان پسر بیشتر از تعداد فرزندان دختر» تعریف کنیم، در این صورت جاهای خالی را برگرد و این مجموعه‌ها را کامل کنید.

$$\{(p, p, d, d) \text{ و } \dots \text{ و } \dots \text{ و } (d, d, p, p)\}$$

$$\{(p, p, p, p) \text{ و } \dots \text{ و } (d, p, p, p)\}$$

مثال ۲ : در جعبه‌ای ۳ مهره قرمز متفاوت (با شماره‌های ۱ تا ۳) و ۲ مهره آبی متفاوت (با



شماره‌های ۱ و ۲) وجود دارد. اگر ۳ مهره به تصادف از این جعبه خارج شود تعداد حالت‌های ممکن در انتخاب ۳ مهره از بین ۵ مهره، عبارت است از ۱۰ حالت زیرا انتخاب مهم نیست پس می‌نویسیم :

$$S = \{R_1 R_2 R_3, R_1 R_2 B_1, R_1 R_2 B_2, R_1 B_1 B_2, R_2 R_3 B_1, R_2 R_3 B_2, R_2 B_1 B_2, R_3 R_1 B_1, R_3 R_1 B_2, R_3 B_1 B_2\}$$

اگر پیشامدهای «حداقل ۱ مهره آبی» و «حداکثر ۱ مهره آبی» و «هر سه مهره قرمز» را به ترتیب A و B و C بنامیم خواهیم داشت :

$$A = \{B_1 R_1 R_2, B_1 R_1 B_2, B_1 R_2 R_3, B_2 R_1 R_2, B_2 R_1 B_3, B_2 R_2 R_3, B_3 R_1 R_2, B_3 R_1 B_2, B_3 R_2 R_1\}$$


$$B = \{R_1 R_2 R_3\}$$

$$C = \{R_1 R_2 R_3\}$$

اگر S را مجموعه مرجع فرض کنیم آیا $A' = B$ است؟ در مورد تساوی $C' = A'$ چه نظری دارید؟


جبر پیشامدها

اگر A و B پیشامدهای در فضای نمونه‌ای S باشند در این صورت هر یک از پیشامدهای $(A \cup B)$, $(A \cap B)$ و $(A - B)$ در فضای نمونه‌ای S به صورت‌های زیر توصیف می‌شوند :




الف) اجتماع دو پیشامد : پیشامد $(A \cup B)$ وقتی رخ می‌دهد (اتفاق می‌افتد) که حداقل

یکی از پیشامد رخ بدهد. (یا A رخ بدهد یا B رخ بدهد یا هر دو رخ بدهند.)




ب) اشتراک دو پیشامد : پیشامد $(A \cap B)$ وقتی رخ می‌دهد که دو پیشامد با هم رخ بدهند

(هم پیشامد A رخ بدهد و هم پیشامد B رخ بدهد)



ج) تفاضل دو پیشامد : پیشامد $(A - B)$ وقتی رخ می‌دهد که پیشامد A رخ بدهد و پیشامد

B رخ ندهد.



د) متمم یک پیشامد: اگر A یک پیشامد از فضای نمونه‌ای S باشد متمم پیشامد A که با A' نمایش داده می‌شود فقط وقتی رخ می‌دهد که پیشامد A رخ ندهد بنابراین با توجه به نمودار واضح است که $A \cap A' = \emptyset$ و $A \cup A' = S$.

تعریف: اگر A و B دو پیشامد از فضای نمونه‌ای S باشند و $A \cap B = \emptyset$ در این صورت A و B را دو پیشامد ناسازگار می‌نامیم و اگر $A \cap B \neq \emptyset$ این دو پیشامد سازگار هستند.

تذکر: با توجه به تعریف متمم یک پیشامد، همواره هر پیشامد تصادفی مانند A متمم آن یعنی A' ، دو پیشامد ناسازگار هستند.

اگر A ، B و C سه پیشامد از فضای نمونه‌ای S باشند، این سه پیشامد را دو به دو ناسازگار می‌نامیم هرگاه $A \cap B = \emptyset$ و $A \cap C = \emptyset$ و $B \cap C = \emptyset$ باشد.

مثال ۳: اگر یک تاس را بیاندازیم و پیشامدهای «روشندن عدد بزرگ‌تر از ۴»، «روشندن عدد کوچک‌تر از ۳» و «روشندن عدد ۳ یا ۴» را به ترتیب A ، B و C تعریف کنیم، در این صورت همواره، A ، B و C دو به دو ناسازگارند و داریم:

$$A = \{5, 6\}, B = \{1, 2\}, C = \{3, 4\}$$

$$A' = \{1, 2, 3, 4\}, B' = \{3, 4, 5, 6\}, C' = \{1, 2, 5, 6\}$$

کار در کلاس

با توجه به فعالیت اول در این درس (انداختن دو تاس) و تکمیل پیشامدهای A ، B و C هر یک از پیشامدهای خواسته شده

زیر را تشکیل دهید.

$$A = \{(1, 1), \dots\} = \text{پیشامد آنکه هر دو تاس فرد باشند}$$

$$B = \{(1, 5), (5, 1), \dots\} = \text{پیشامد آنکه مجموع دو تاس ۶ باشد}$$

$$C = \{(3, 1), \dots\} = \text{پیشامد آنکه تاس آبی مضرب ۳ بیاید}$$

الف) پیشامد اینکه «هر دو تاس فرد بوده و مجموع آنها ۶ باشد»

$$(A \cap B) = \{(1, 5), \dots\} \rightarrow n(A \cap B) = \dots$$

ب) پیشامد آنکه «هر دو تاس فرد یا مجموع دو تاس ۶ باشد»

$$\dots = \{(1, 1), (1, 3), (3, 1), (1, 5), (5, 1), (2, 4), (3, 3), (5, 3)\}$$

ج) پیشامد آنکه $(A - C)$ رخ بدهد یعنی «هر دو تاس فرد باشند ولی» پس داریم:

$$A - C = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), \dots, (5, 5)\}$$

د) پیشامد $(C - B)$ را توصیف کرده و آن را تشکیل دهید.

مثال ۴: یک تاس و ۲ سکه را با هم می‌اندازیم:

الف) فضای نمونه‌ای چند عضو دارد؟

$$n(S) = 2 \times 2 \times \dots = \dots$$

ب) پیشامد آنکه «هر دو سکه رو و تاس زوج باشد را تشکیل دهید.

$$A = \{(2, R, R), \dots\}$$

ج) پیشامد B آنکه «هر دو سکه پشت یا تاس عدد ۵ بیاید» را تشکیل دهید.

$$B = \{(6, P, P), \dots, (1, P, P), (5, P, P), (5, R, P), (5, P, R), (5, R, R)\}$$

احتمال رخداد یک پیشامد : (اندازه‌گیری شناس)

می‌دانیم اگر S فضای نمونه‌ای یک آزمایش تصادفی باشد و $A \subseteq S$ یک پیشامد در فضای S باشد، احتمال رخداد پیشامد A

معنی $P(A)$ عددی است حقیقی که $0 \leq P(A) \leq 1$ بوده و $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$. همچنین می‌دانیم $P(A)$ هرچه قدر به ۱ نزدیک‌تر باشد شناس رخداد A بیشتر و هر چقدر به صفر نزدیک‌تر باشد شناس رخداد A کمتر است. در واقع در مسائل احتمال با محاسبه $P(A)$ شناس رخداد پیشامد A را اندازه‌گیری می‌کنیم.

مثال : فرض کنیم هر یک از اعداد دو رقمی را که با ارقام ۲ و ۳ و ۴، می‌توانیم بسازیم را روی یک کارت نوشته و آنها را در کیسه‌ای قرار می‌دهیم (تکرار ارقام مجاز نمی‌باشد) و سپس ۱ کارت به تصادف از کیسه خارج می‌کنیم :
الف) اگر پیشامدهای A و B را به ترتیب «خارج شدن عدد زوج» و «خارج شدن عدد فرد» تعریف کنیم، شناس رخداد کدام پیشامد بیشتر است؟

$$S = \{43, 34, 24, 42, 23, 32\}$$

$$A = \{34, \dots, \dots, 32\}, B = \{\dots, \dots, \dots\}$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

واضح است که $P(A) > P(B)$ پس شناس رخداد پیشامد A از شناس رخداد پیشامد B بیشتر است. (تعداد عددهای زوج از تعداد عددهای فرد در بین ارقام ۲ و ۳ و ۴، بیشتر است)

فعالیت

اگر S فضای نمونه‌ای متناهی و ناتهی برای یک آزمایش تصادفی بوده و A و B پیشامدهایی در این فضا باشند در این صورت :

$$\text{I}) \circ \leq P(A) \leq 1$$

$$\text{زیرا : } A \subseteq S \Rightarrow \circ \leq n(A) \leq \dots \Rightarrow \frac{\circ}{n(S)} \leq \frac{n(A)}{n(S)} \leq \dots \Rightarrow \circ \leq \dots \leq 1$$

$$\text{II}) P(\emptyset) = \circ, P(S) = 1$$

$$\text{زیرا : } P(\emptyset) = \frac{n(\emptyset)}{\dots} = \circ, P(S) = \frac{\dots}{\dots} = 1$$

$$\text{III}) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\text{زیرا : } n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \xrightarrow{\text{ تقسیم طرفین بر } n(S)}$$

$$\frac{n(A \cup B)}{n(S)} = \dots + \dots - \dots$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = \dots + \dots - P(A \cap B)$$


برای هر دو پیشامد از فضای نمونه‌ای S همواره تساوی $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ برقرار بوده و اگر A و B دو پیشامد ناسازگار باشند این تساوی به صورت $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ نوشته می‌شود.

کار در کلاس

اگر A' متمم پیشامد A در فضای نمونه‌ای S باشد (A و A' ناسازگارند) نشان دهید.

$$P(A) = 1 - P(A'), \quad P(A') = 1 - P(A)$$

$$\begin{cases} A \cup A' = S \\ A \cap A' = \emptyset \end{cases} \Rightarrow P(A \cup A') = P(S) = \dots \dots$$



$$P(A \cup A') = P(A) + P(A') \Rightarrow P(A) + P(A') = 1 \Rightarrow \begin{cases} P(A) = \dots \dots \\ P(A') = \dots \dots \end{cases}$$

مثال: اگر در فعالیت اول دو تاس را با هم بیاندازیم، چقدر احتمال دارد:

(الف) هر دو تاس زوج باشند؟ (می‌دانیم در انداختن دو تاس $n(S) = 36$)

$A = \{(2,2), (2,4), (4,2), \dots, \dots, \dots, \dots, \dots, (6,6)\}$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

ب) مجموع دو تاس ۸ یا هر دو تاس فرد باشند.

$B = \{(3,5), (5,3), (2,6), (6,2), (4,4)\}$

$C = \{ \dots, \dots \}$

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(B \cap C) = \frac{5}{36} + \frac{9}{36} - \frac{2}{36} = \dots \dots$$

$$(B \cap C) = \{(3,5), (5,3)\} \Rightarrow P(B \cap C) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

ج) مجموع دو تاس ۷ یا هر دو زوج باشند.

$D = \{(1,6), (6,1), (2,5), (5,2), (3,4), (4,3)\}$

$A = \{ \text{هر دو تاس زوج}\} \rightarrow n(A) = 9, (A \cap B) = \emptyset$

$$\Rightarrow P(D \cup A) = P(D) + P(A) = \frac{6}{36} + \frac{9}{36} = \frac{15}{36}$$

د) مجموع دو تاس کمتر از ۱۱ باشد.

می‌دانیم مجموع دو تاس از ۲ تا ۱۲ می‌تواند تغییر کند و چون تعداد حالت‌هایی که مجموع دو تاس کمتر از ۱۱ است، زیاد و

محاسبه آن طولانی می‌باشد از پیشامد متمم استفاده می‌کنیم

$A' = \{ \text{پیشامد مجموع بزرگ‌تر یا مساوی ۱۱} \} \Rightarrow A' \text{ پیشامد مجموع کمتر از ۱۱}$

$$\Rightarrow P(A') = \frac{3}{36} \Rightarrow P(A) = 1 - \frac{3}{36} = \frac{33}{36}$$

ه) حاصل ضرب دو عدد رو شده ۱۲ باشد.

$$A = \{(2,6), \dots, \dots, \dots\}$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \dots$$

تمرین

۱- هر یک از اعداد طبیعی و زوج کوچک‌تر از ۱۱ را روی یک کارت نوشته و یکی از این کارت‌ها را به تصادف بر می‌داریم :

(الف) فضای نمونه‌ای این آزمایش یا پدیده تصادفی را مشخص کنید.

(ب) چه تعداد پیشامد تصادفی روی این فضای نمونه‌ای می‌توان تعریف کرد؟

(ج) پیشامد A را که در آن «عدد روی کارت انتخاب شده بر ۴ بخش پذیر باشد» را مشخص کنید.

۲- فرض کنید A و B و C سه پیشامد از فضای نمونه‌ای S باشند هر یک از عبارت‌های توصیفی زیر را با نمودار و نمایش

داده و هاشور بزنید.

(الف) پیشامدهای A و C رخ بدھند ولی B رخ ندهد.

(ب) فقط پیشامد B رخ بدھد.

(ج) پیشامد B رخ بدھد و C رخ ندهد.

۳- هر یک از ارقام ۱ تا ۸ را روی یک کارت نوشته و آنها را در یک کیسه قرار می‌دهیم و سپس یک کارت به تصادف از کیسه

خارج می‌کنیم هر یک از پیشامدهای زیر را تعیین کنید :

(الف) فضای نمونه‌ای و پیشامد A که در آن «عدد روی کارت زوج باشد»

(ب) پیشامد B که در آن «عدد روی کارت اول باشد»

(ج) پیشامد C که در آن «عدد رو شده بزرگ‌تر از ۲ باشد»

۴- خانواده‌ای دارای ۳ فرزند است فضای نمونه‌ای مربوط به فرزندان این خانواده و پیشامد آنکه حداقل یکی از فرزندان

دختر باشد را مشخص کنید.

۵- سکه‌ای را می‌اندازیم، اگر پشت بیاید یک تاس می‌اندازیم و اگر رو بیاید دو سکه دیگر را می‌اندازیم :

(الف) فضای نمونه‌ای این آزمایش تصادفی را مشخص کنید.

(ب) پیشامد آنکه «تاس زوج بیاید» را مشخص کنید.

(ج) پیشامد آنکه «حداقل ۲ سکه رو بیاید» را مشخص کنید.

۶- می‌خواهیم از بین ۳ نفر دانش‌آموزان کلاس دهم رشته ریاضی و ۲ نفر دانش‌آموزان دهم رشته تجربی یک تیم دو نفره تنسیس

روی میز انتخاب کنیم اگر این عمل به تصادف صورت پذیرد چقدر احتمال دارد :

(الف) هر دو نفر، از دانش‌آموزان کلاس دهم ریاضی باشند.

(ب) هر دو نفر، همکلاسی باشند.

(ج) ۱ نفر از رشته ریاضی و ۱ نفر از رشته تجربی باشد

(راهنمایی : دانش‌آموزان ریاضی را R_۱ و R_۲ و دانش‌آموزان تجربی را T_۱ و T_۲ فرض کنید)

۷- یک فروشگاه دو نوع کارت اعتباری A و B را می‌پذیرد اگر ۳۴٪ از مشتریان کارت نوع A و ۶۲٪ کارت نوع B و ۱۵٪ هر دو

کارت را همراه داشته باشند، چند درصد از مشتریان می‌توانند با در اختیار داشتن حداقل یکی از این دو کارت از این فروشگاه خرید کنند؟



سایت ویژه ریاضیات www.riazisara.ir

درسنامه ها و جزوه های دروس ریاضیات

دانلود نمونه سوالات امتحانات ریاضی

نمونه سوالات و پاسخنامه کنکور

دانلود نرم افزارهای ریاضیات

و...و

کانال سایت ریاضی سرا در تلگرام:

<https://telegram.me/riazisara> (@riazisara)