



## عبارات جبری و معادلات و نامعادلات

### ۱-۱: مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی

در سال قبل، در درس ریاضی (۲) شما با دنباله‌های حسابی و هندسی آشنا شده‌اید. در این بخش ما ابتدا مروایت می‌کنیم برآموخته‌های قبلی شما و سپس به بحث مجموع جملات این دنباله‌ها می‌پردازیم.

#### یادآوری: دنباله‌های حسابی و هندسی

۱- دنباله‌ی  $\{a_n\}$  با تعریف  $a_n = a + (n-1)d$  یک دنباله‌ی حسابی (یا تصاعد حسابی) نامیده می‌شود.  $a$  جمله‌ی اول و  $d$  قدرنسبت تصاعد است ( $d \neq 0$ ). این دنباله را می‌توانیم به صورت بازگشتی نیز تعریف کنیم:

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = a_n + d$$

۲- دنباله‌ی  $\{a_n\}$  با تعریف  $a_n = aq^{n-1}$  یک دنباله‌ی هندسی (یا تصاعد هندسی) نامیده می‌شود.  $a$  جمله‌ی اول و  $q$  قدرنسبت تصاعد است ( $q \neq 1, a \neq 0$ ). این دنباله را می‌توانیم به صورت بازگشتی نیز تعریف کنیم:

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = a_n q$$

در واقع در دنباله‌ی حسابی، هر جمله از افزودن مقدار قدرنسبت به جمله‌ی قبلی به دست می‌آید. در دنباله‌ی هندسی نیز هر جمله از ضرب مقدار ثابت قدرنسبت در جمله‌ی قبلی به دست می‌آید.


◀ **مثال:** ۱- دنباله‌های  $\{a_n\}$  با جمله‌ی عمومی  $a_n = 3 + 4n$ ، دنباله‌ای حسابی با قدرنسبت ۴ و جمله‌ی اول  $a_1 = 7$  است.

۲- دنباله‌ی  $\{b_n\}$  با جمله‌ی عمومی  $b_n = 3 \times 2^{n+2}$ ، دنباله‌ای هندسی با قدرنسبت ۲ و جمله‌ی اول  $a_1 = 24$  است.

#### مجموع اعداد طبیعی متواالی

اعداد طبیعی متواالی، نمونه‌ای از یک دنباله‌ی حسابی هستند. در اینجا ما ابتدا مجموع اعداد طبیعی متواالی از ۱ تا  $n$  را پیدا می‌کنیم و سپس در حالت کلی، مجموع جملات یک دنباله‌ی حسابی را بررسی می‌کنیم.

دنباله‌ی  $\{n\}$  (اعداد طبیعی) را در نظر بگیرید. می‌خواهیم  $S_n = 1 + 2 + \dots + n$  را بیابیم. به شکل رو به رو دقت کنید.



در شکل  $n$  ردیف و هر ردیف شامل  $n+1$  گوی وجود دارد. پس در شکل  $n(n+1)$  گوی داریم. حال به خط شکسته‌ای دقت کنید که با تقارن شکل را به دو نیمه تقسیم کرده است. پس تعداد گوی‌های هر نیمه برابر  $\frac{n(n+1)}{2}$  است. از طرفی به وضوح تعداد گوی‌های یک نیمه (مثلث‌نیمه‌ی چپ) در سطرها برابر است با  $1, 2, \dots, n$ . پس مجموع  $S_n = 1 + 2 + \dots + n$  به دست آمده است.

$$\text{مجموع اعداد طبیعی از ۱ تا } n \text{ برابر است با: } S_n = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$


نکته:

◀ **تذکر:** این روش منسوب به گاووس، ریاضی‌دان بزرگ قرن هجدهم میلادی است. این روش را به صورت زیر نیز می‌توانیم با زبان ریاضی بیان کنیم:

$$S_n = 1 + 2 + \dots + n \Rightarrow 2S_n = 1 + 2 + \dots + n + n + (n-1) + \dots + 1 = (1+n) + (2+(n-1)) + \dots + (n+1)$$

$$\Rightarrow 2S_n = \underbrace{(n+1) + (n+1) + \dots + (n+1)}_{n \text{ بار}} = n(n+1) \Rightarrow S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

## مجموع اعداد طبیعی فرد متوالی ◇



اعداد فرد طبیعی متوالی نمونه‌ای دیگر از یک دنباله‌ی حسابی‌اند. در اینجا مجموع این اعداد را با روشی هندسی پیدا می‌کنیم. دنباله‌ی  $\{1 - 2n\}$  شامل اعداد فرد طبیعی را در نظر بگیرید. می‌خواهیم  $(1 - 2n) + (2n - 1) + \dots + (2n - n)$  را به دست آوریم. به شکل رو به رو دقت کنید.

در این شکل  $n$  ردیف و هر ردیف شامل  $n$  گوی وجود دارد. پس در شکل  $n \times n = n^2$  گوی داریم. حال به خطوط شکسته دقت کنید که گوی‌های شکل را دسته‌بندی کرده‌اند. در دسته‌ی اول ۱ گوی داریم، در دسته‌ی دوم ۳ گوی، بعدی ۵ گوی و ... به این ترتیب در دسته‌ی آخر  $1 - 2n$  گوی داریم و اعداد دسته‌ها، همان اعداد فرد هستند.

**نکته:** مجموع اعداد طبیعی فرد از ۱ تا  $1 - 2n$  برابر است با:  $S_n = 1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2$

◀ **مثال:** چون  $1 - 9 = 2 \times 9 - 2 \times 1 = 16$ , پس مجموع ۹ عدد فرد متوالی ۱، ۳، ... و ۱۷ برابر است با  $81 = 9^2$ .

◀ **تذکر:** به جز روش بالا، این مجموع را به صورت زیر نیز می‌توانیم به دست آوریم:

$$\begin{aligned} S_n &= (2 \times 1 - 1) + (2 \times 2 - 1) + \dots + (2n - 1) = (2 \times 1 + 2 \times 2 + \dots + 2 \times n) - (\underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_{n \text{ بار}}) \\ &= 2(1 + \dots + n) - n = 2 \times \frac{n(n+1)}{2} - n = n(n+1) - n = n^2 \end{aligned}$$

## مجموع جملات دنباله‌ی حسابی ◇

در تذکری که پس از نکته‌ی قبل، در یافتن مجموع اعداد فرد ارائه کرده‌ایم، روشی آمده است که آن را برای هر دنباله‌ی حسابی می‌توانیم ارائه کنیم. فرض کنید می‌خواهیم مجموع  $n$  جمله از دنباله‌ی حسابی  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  با جمله‌ی عمومی  $a_n = a + (n-1)d$  را پیدا کنیم. داریم:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = a + (a+d) + (a+2d) + \dots + (a+(n-1)d)$$

$$= \underbrace{(a + a + \dots + a)}_{n \text{ بار}} + d(1 + 2 + \dots + (n-1)) = na + d \times \frac{(n-1)n}{2}$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n), \text{ یا به بیان دیگر } S_n = \frac{n(2a + (n-1)d)}{2}$$

**قضیه:** مجموع جملات دنباله‌ی حسابی  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  با جمله‌ی عمومی  $a_n = a + (n-1)d$  از جمله‌ی اول تا  $n$  ام برابر است با:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d) = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

در واقع برای محاسبه‌ی مجموع تعدادی جمله‌ی متوالی یک تصاعد حسابی، کافی است جمله‌ی اول و آخر را با هم جمع کنیم و حاصل را در نصف تعداد جملات ضرب کنیم.

◀ **تذکر:** با استفاده از روش گاوس نیز می‌توانیم این مجموع را به دست آوریم:


$$\left. \begin{array}{l} S_n = a + (a+d) + (a+2d) + \dots + (a+(n-1)d) \\ S_n = (a+(n-1)d) + (a+(n-2)d) + \dots + a \end{array} \right\} \Rightarrow 2S_n = (2a + (n-1)d) + (2a + (n-2)d) + \dots + (2a + (n-1)d)$$

پس  $2S_n$  برابر مجموع  $n$  عدد است که هر کدام برابر  $d(1 + (n-1)) = 2a + (n-1)d$  هستند، بنابراین:

$$2S_n = n(2a + (n-1)d) \Rightarrow S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d) \xrightarrow{\substack{a_1=a \\ a_n=a+(n-1)d}} S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

◀ **مثال:** اعداد طبیعی فرد از ۱ تا  $1 - 2n$  دنباله‌ی حسابی با قدر نسبت ۲ را تشکیل می‌دهند. پس داریم:

$$S_n = \frac{n}{2}(1 + (2n-1)) = \frac{n}{2} \times 2n = n^2$$



**مسئله‌ی (۱):** تعدادی الوار چوب با آرایشی مطابق شکل رو به روی هم قرار گرفته‌اند. در بالاترین ردیف ۷ چوب قرار دارد.

(الف) اگر تعداد چوب‌های پایین‌ترین ردیف ۲۰ باشد، روی هم چند چوب در این شکل وجود دارد؟  
ب) اگر روی هم ۱۱۵ چوب در شکل موجود باشد، تعداد ردیف‌های چوب چند تا است؟

**حل: (الف) راه‌آول:** به راحتی مشخص می‌شود که تعداد چوب‌های ردیف‌ها، در واقع دنباله‌ای حسابی را تشکیل می‌دهند. دنباله‌ای با قدرنسبت ۱، یعنی دنباله‌ی ۷، ۸، ۹، ... و ۲۰. بنابراین تعداد کل چوب‌ها برابر است با:

$$S = 7 + 8 + 9 + \dots + 20 = \frac{14}{2} (7 + 20) = 189$$

دقیق کنید که در شمارش تعداد اعداد مجموع بالا از تساوی  $14 = 20 - 7 + 1 = 20 - 7 + 1$  استفاده کرده‌ایم.

**(الف) راه‌ثانی:** برای محاسبه مجموع به این روش نیز می‌توانیم عمل کنیم:

$$S = (1 + 2 + \dots + 20) - (1 + 2 + \dots + 6) = \frac{20 \times 21}{2} - \frac{6 \times 7}{2} = 189$$

**(ب)** تعداد ردیف‌ها را  $n$  می‌گیریم. پس تعداد چوب‌های پایین‌ترین ردیف برابر است با:

$$7 + (n - 1) \times 1 = 6 + n$$

پس مجموع اعضای دنباله برابر است با:

$$S_n = \frac{n}{2} (7 + (6 + n)) = \frac{n}{2} (13 + n) \xrightarrow{S_n = 115} n(13 + n) = 230 \Rightarrow n^2 + 13n - 230 = 0 \\ \Rightarrow n_1 = 10, n_2 = -23$$

پاسخ  $n = 10$  قابل قبول است.

**تسنیت (۱):** در دنباله‌ای حسابی  $\{a_n\}$  می‌دانیم  $a_1 + a_{16} = 42$ . مجموع ۲۲ جمله‌ی اول این دنباله کدام است؟

۵۲۴

۵۴۲

۴۵۶

۴۶۲

**حل:** می‌دانیم  $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ، بنابراین:

$$a_1 + a_{16} = a_1 + 15d + a_1 + 15d = 2a_1 + 30d \Rightarrow 2a_1 + 30d = 42$$

از طرفی طبق فرمول مجموع جملات یک دنباله‌ای حسابی داریم:

$$S_{22} = \frac{22}{2} (2a_1 + 21d) \Rightarrow S_{22} = 11 \times 42 = 462$$

بنابراین گزینه‌ی (۱) درست است.

**مسئله‌ی (۲):** مجموع اعدادی بین ۱۰۰ و ۳۰۰ را بیابید که باقی‌مانده‌ی آن‌ها در تقسیم بر ۶ برابر ۲ باشد.

**حل:** اگر عدد  $a$  در تقسیم بر ۶ خارج قسمت  $k$  و باقی‌مانده‌ی ۲ داشته باشد، آن‌گاه  $a = 6k + 2$ . بین اعداد ۱۰۰ و ۳۰۰، کوچک‌ترین عددی که در تقسیم بر ۶ باقی‌مانده‌ی ۲ داشته باشد، ۱۰۴ است و بزرگ‌ترین عدد ۲۹۶، پس مجموع زیر را می‌خواهیم:

$$S = 104 + 110 + 116 + \dots + 296$$

**(الف) راه‌آول:** با دنباله‌ای حسابی با قدرنسبت ۶ مواجه‌ایم. تعداد اعداد مجموع بالا را  $n$  می‌گیریم. داریم:

$$296 = 104 + (n - 1) \times 6 \Rightarrow n - 1 = 32 \Rightarrow n = 33$$

$$S = \frac{n}{2} (a_1 + a_n) = \frac{33}{2} (104 + 296) = 6600$$

**(الف) راه‌ثانی:** چون هر عدد در مجموع به شکل  $6k + 2$  است، داریم:

$$S = (6 \times 17 + 2) + (6 \times 18 + 2) + \dots + (6 \times 49 + 2) = 6(17 + 18 + \dots + 49) + (\underbrace{2 + \dots + 2}_{39})$$

$$= 6 \left( \frac{49 \times 50}{2} - \frac{16 \times 17}{2} \right) - 39 \times 2 = 6600$$

## مجموع جملات دنباله‌ی هندسی

فرض کنید می‌خواهیم مجموع  $n$  جمله‌ی اول از دنباله‌ی هندسی  $\{aq^{n-1}, aq^n, \dots\}$  را بیابیم. یعنی مجموع زیر را می‌خواهیم:

$$S = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1}$$

اگر مجموع  $S$  را در  $q$  ضرب کنیم و  $S$  را از آن کم کنیم، به نتیجه‌ی زیر می‌رسیم:

$$qS - S = (aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1}) - (a + aq + \dots + aq^{n-1}) = aq^n - a \Rightarrow (q - 1)S = aq^n - a \Rightarrow S = a \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

**نکته:** در دنباله‌ی هندسی با جمله‌ی اول  $a$  و قدرنسبت  $q$ ، مجموع  $n$  جمله‌ی اول برابر است با:

◀ **مثال:** در دنباله‌ی هندسی ...  $1, 2, 4, \dots$ ، قدرنسبت ۲ و جمله‌ی اول  $\frac{1}{2}$  است، بنابراین:

$$S_n = a \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{\frac{1}{2}(2^n - 1)}{2 - 1} = \frac{2^n - 1}{2}$$

○ **مسئله‌ی (۱۳):** حاصل مجموع زیر را بیابید (مجموع از جملات یک دنباله‌ی هندسی تشکیل شده است).

$$S = -\sqrt{6} + \sqrt{2} - \frac{\sqrt{6}}{3} + \dots + \frac{\sqrt{2}}{81}$$

هل: قدرنسبت مجموع برابر  $\frac{\sqrt{2}}{-\sqrt{6}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$  است. تعداد جملات آن را  $n$  می‌گیریم. داریم:

$$a_n = a_1 q^{n-1} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{81} = -\sqrt{6} \times \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{n-1} \Rightarrow 3^{-4} = -\sqrt{3} \times (-1)^{n-1} \times (\sqrt{3})^{1-n} \Rightarrow (\sqrt{3})^{-8} = (-1)^n \times (\sqrt{3})^{2-n} \Rightarrow n = 10.$$

بنابراین طبق فرمول محاسبه‌ی مجموع داریم:

$$S_{10} = -\sqrt{6} \times \frac{\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{10} - 1}{-\frac{1}{\sqrt{3}} - 1} = -\sqrt{6} \times \frac{1 - \frac{1}{243}}{1 + \sqrt{3}} = -3\sqrt{2} \times \frac{\frac{242}{243}}{1 + \sqrt{3}} = \frac{121}{81}(\sqrt{2} - \sqrt{6})$$

تسنیت (۱۴): در یک دنباله‌ی هندسی، مجموع شش جمله‌ی اول،  $\frac{19}{27}$  برابر مجموع سه جمله‌ی اول آن است. قدرنسبت کدام است؟

$$\frac{3}{4} (4) \quad \frac{2}{3} (3) \quad -\frac{2}{3} (2) \quad -\frac{4}{3} (1)$$

هل: طبق فرض  $\frac{19}{27} = S_6$ . حال طبق فرمول داریم:

$$a_1 \frac{q^6 - 1}{q - 1} = \frac{19}{27} \times a_1 \frac{q^3 - 1}{q - 1} \xrightarrow{a_1 \neq 0, q \neq 1} q^6 - 1 = \frac{19}{27} (q^3 - 1) \xrightarrow{q^3 = x} 27x^2 - 27 = 19x - 19$$

$$\Rightarrow 27x^2 - 19x - 8 = 0 \Rightarrow (27x + 8)(x - 1) = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{8}{27}, x_2 = 1$$

پاسخ  $x = -\frac{8}{27}$  قابل قبول است، در نتیجه  $q^3 = -\frac{8}{27}$ ، پس  $q = -\frac{2}{3}$ . بنابراین گزینه‌ی (۲) درست است.

○ **مسئله‌ی (۱۵):** در یک بانک، سالیانه ۱۰٪ سود به حساب سپرده‌ی بلندمدت تعلق می‌گیرد. اگر حسابی با دو میلیون تومان در این بانک باز کنیم، پس از ۱۰ سال مقدار موجودی حساب چقدر خواهد بود؟

هل: اگر موجودی اولیه را با  $a$  نشان دهیم، در پایان سال اول موجودی برابر  $a(1 + \frac{1}{10})$  است. در پایان سال دوم موجودی برابر است با:

$$x_2 = x_1(1 + \frac{1}{10}) = a(1 + \frac{1}{10})^2$$

به این ترتیب مقدار موجودی حساب در واقع یک دنباله‌ی هندسی با قدرنسبت  $1 + \frac{1}{10} = \frac{11}{10}$  است. در پایان سال دهم، مقدار موجودی برابر است با:

$$x_{10} = a(1 + \frac{1}{10})^{10} = 2 \times 10^6 \times \frac{11^{10}}{10^{10}} \square 5187500$$

● مسئله‌ی (۵): فرض کنید دولت حدود ۳ هزار میلیارد تومان را برای هدیه بین مردم کشور پخش می‌کند! هر شخصی که پولی به دست می‌آورد، ۷۵٪ آن را خرج و ۲۵٪ آن را پس انداز می‌کند. بر اثر این تصمیم دولت چه مقدار پول در سطح کشور خرج می‌شود؟ آیا تصمیم دولت از نظر اقتصادی درست است؟

**مثال:** فرض کنید پول اولیه‌ی پخش شده بین مردم  $a$  باشد. در نتیجه  $a = \frac{3}{4}x_1$  توسط مردم خرج و  $\frac{1}{4}a$  پس‌انداز می‌شود. ولی آن  $x_1$  واحد خرج شده، دوباره به دست مردم رسیده است! پس  $x_2 = \frac{3}{4}x_1$  نیز دوباره توسط مردم خرج می‌شود. به همین ترتیب در مرحله‌ی بعد  $x_3 = \frac{3}{4}x_2$  نیز توسط مردم خرج می‌شود و ... به این ترتیب مقدار پول خرج شده توسط مردم در هر مرحله یک دنباله‌ی هندسی با قدرنسبت  $\frac{3}{4}$  تشکیل می‌دهد. پس پول خرج شده توسط مردم پس از  $n$  مرحله برابر است با:

$$S_n = x_1 + \dots + x_n = \frac{r}{q} a + \left(\frac{r}{q}\right)^2 a + \dots + \left(\frac{r}{q}\right)^n a = \frac{r}{q} a \times \frac{1 - \left(\frac{r}{q}\right)^n}{1 - \frac{r}{q}}$$

در دراز مدت با افزایش  $n$ ، مقدار  $\left(\frac{3}{4}\right)^n$  مرتباً کوچک و کوچک‌تر می‌شود، تا جایی که تقریباً برابر صفر می‌شود. بنابراین می‌توانیم کل پول خرج شده توسط مردم را عدد زیر در نظر بگیریم:

$$\frac{r}{c} a \times \frac{1}{1 - \frac{r}{c}} = ra$$

یعنی بر اثر این تصمیم دولت ۹ هزار میلیارد تومان توسط مردم خرج می‌شود. مطمئناً این تصمیم دولت از نظر اقتصادی کاری اشتباه است. زیرا ۳ هزار میلیارد تومان در سطح کشور پخش شده است، و بدون کار اقتصادی خاصی برای تولید پول، ۹ هزار میلیارد تومان خرج شده است. یعنی مردم ۶ میلیارد تومان پول را بدون پشتوانه‌ای اقتصادی مناسب تنها به شکل صوری خرج کرده‌اند و همین امر موجب نورم می‌شود.

حد مجموع

در مسئله‌ی (۵) دیدیم که چگونه با بزرگ شدن مقدار  $n$ , مجموع  $S_n$  تقریباً برابر  $3a$  شد. در حالت کلی اگر دنباله‌ی هندسی  $\{a_n\}$  با شرط  $|q| < 1$  را در نظر بگیریم، در مجموع  $S_n = a_1 \times \frac{1-q^n}{1-q}$  بسیار بزرگ می‌شود، به جای  $q^n$  می‌توانیم عدد صفر را قرار دهیم. به این ترتیب مجموع همه‌ی جملات دنباله به دست می‌آید.

**مفهوم:** مجموع همهٔ جملات دنبالهی هندسی  $\{a_n\}$  با تعریف  $a_n = a_1 q^{n-1}$ , به شرط آن که  $|q| < 1$  برابر است با:

○ مسأله‌ی (۴): توبی، از ارتفاع ۱۰ متر، ها می‌شود. توبی بار بیس از پرخود دایمین، به اندازه‌ی ۸۰٪ ارتفاع قلی بالا می‌رود.

الف) کل مسافتی که توب پس از ۲۰ بار برخورد با زمین طی می کند چقدر است؟

**حل: (الف)** توب پس از رها شدن به اندازه‌ی ارتفاع  $10 = h = a_1$  مسافت طی می‌کند. پس از برخورد با زمین در بار اول، به بالا به اندازه‌ی  $h/8$  بازمی‌گردد و دوباره به پایین می‌آید. یعنی بین بار اول و بار دوم برخورد، توب به اندازه‌ی  $a_2 = 2 \times h/8$  مسافت طی می‌کند. به همین ترتیب بین بار دوم و بار سوم برخورد توب به اندازه‌ی  $a_3 = 2 \times (h/8)^2$  مسافت طی می‌کند.

به این ترتیب باید مجموع زیر را برای به دست آوردن مسافت طی شده در ۲۰ پر خود به دست آوریم:

$$S = h + 2 \times \cdot / \lambda h + 2 \times (\cdot / \lambda)^2 h + \dots + 2 \times (\cdot / \lambda)^q h$$

اگر  $h$  اول را در نظر نگیریم، بقیه جملات یک دنباله هندسی با قدر نسبت  $8/0$  و جمله اول  $8h$  را تشکیل می‌دهند:

$$S = h + r \times \frac{1 - (1/\lambda)^q}{1 - (1/\lambda)} = 10 + 16 \times \frac{1 - (1/\lambda)^q}{1 - (1/2)} \sqcup 88/85 \text{ متر}$$

**ب) راه اول:** در حالت کلی بعد از  $n$  برخورد مسافت طی شده توسط توب برابر است با:

$$S_n = h + r \times \cdot / \lambda h + r \times (\cdot / \lambda)^r h + \cdots + r \times (\cdot / \lambda)^{n-1} h = h + r \times \cdot / \lambda h \times \frac{1 - (\cdot / \lambda)^{n-1}}{1 - \cdot / \lambda} = \dots + r \times \frac{1 - (\cdot / \lambda)^{n-1}}{\cdot / r}$$

می‌دانیم همواره  $1 < (\frac{1}{8})^{n-1} - 1$ ، پس همواره داریم:

$$\frac{1 - (\frac{1}{8})^{n-1}}{\frac{1}{2}} < \frac{1}{\frac{1}{2}} \Rightarrow 16 \times \frac{1 - (\frac{1}{8})^{n-1}}{\frac{1}{2}} < 16 \times 5 \Rightarrow S_n < 10 + 80 \Rightarrow S_n < 90.$$



(ا) **دوه:** مجموع همهٔ جملات دنباله برابر است با:  $S = 10 + \frac{16}{2} = 90$ ، پس همواره  $S_n < 90$ .

**مسئلهٔ (۷):** مربعی به طول ضلع ۴ سانتی‌متر را در نظر بگیرید. وسطهای اضلاع این مربع را مطابق شکل به هم وصل می‌کنیم و دو قسمت ایجاد شده را رنگ می‌زنیم. حال دوباره در مرحلهٔ دوم، وسطهای اضلاع مربع جدید داخل مربع اولیه را به هم وصل

می‌کنیم و باز دو قسمت ایجاد شده را رنگ می‌زنیم. این کار را همین‌طور تکرار می‌کنیم.

(الف) پس از ۱۰ مرحله چه سطحی رنگ شده است؟

(ب) سطح رنگ شده پس از تعداد زیادی از مراحل به چه عددی نزدیک می‌شود؟



هل: (الف) طبق شکل رو به رو، در هر مرحله ما درواقع یک مربع را به ۸ قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و دو قسمت از

آنها را رنگ می‌کنیم. یعنی  $\frac{1}{4}$  مساحت مربع را رنگ می‌کنیم.

در مرحلهٔ اول در مربع به مساحت  $S = a_1 = \frac{1}{4}S$  را رنگ کرده‌ایم و مربع جدیدی به مساحت  $\frac{S}{2}$  داخل آن ایجاد کرده‌ایم. در مرحلهٔ دوم، از

مربع به مساحت  $\frac{S}{2}$ ، مقدار  $a_2 = \frac{1}{4} \times \frac{S}{2}$  را رنگ کرده‌ایم و مربعی به مساحت  $\frac{S}{4}$  را داخل آن ایجاد کرده‌ایم. در مرحلهٔ دوم از مربع به

مساحت  $\frac{S}{4}$ ، مقدار  $a_3 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{S}{4}$  را رنگ کرده‌ایم. به این ترتیب بخش‌های رنگ شده یک دنبالهٔ هندسی با قدر نسبت  $\frac{1}{2}$  تشکیل

می‌دهند و ما مجموع زیر را می‌خواهیم:

$$S_{1.} = a_1 + a_2 + \dots + a_{1.} = \frac{S}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{S}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{S}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^9 \times \frac{S}{4}$$

$$\xrightarrow{S=16} S_{1.} = 4 + \frac{1}{2} \times 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 4 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^9 \times 4 = 4 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{1 - \frac{1}{2}}$$

پس تقریباً  $\frac{7}{98}$  سانتی‌متر مربع پس از ۱۰ مرحله رنگ شده است.

(ب) مجموع همهٔ جملات دنباله برابر است با:  $S = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}} = 8$ ، پس سطح رنگ شده تقریباً برابر ۸ می‌شود.

**مسئلهٔ (۸):** عدد گویای بسط اعشاری ... $666\overline{0}$  را به شکل  $\frac{p}{q}$  بنویسید که  $p$  و  $q$  دو عدد طبیعی نسبت به هم اول‌اند.

هل: بسط را می‌توانیم به این صورت به شکل مجموع جملات یک دنبالهٔ هندسی بنویسیم.

$$a = 0.\overline{6} = 0.6 + 0.06 + 0.006 + \dots = \frac{6}{10} + \frac{6}{100} + \frac{6}{1000} + \dots$$

یعنی دنبالهٔ هندسی با جملهٔ اول  $\frac{6}{10}$  و قدر نسبت  $\frac{1}{10}$ . پس مجموع همهٔ جملات برابر است با:

$$a = \frac{0.6}{1 - 0.1} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \Rightarrow p = 2, q = 3$$

## مجموع اعداد مربع کامل متوالی

هرچند اعداد مربع کامل متوالی، یعنی  $1^2, 2^2, 3^2, \dots$  دنباله‌ای حسابی یا هندسی تشکیل نمی‌دهند، ولی لازم است فرمول مجموع آن‌ها را بدانید که در بعضی از مسائل ظاهر می‌شوند. با توجه به این که  $k^2 = \underbrace{k+k+\dots+k}_{\text{بار}} = k \cdot n$ ، می‌توانیم مجموع اعداد مربع کامل متوالی از ۱ تا  $n^2$  را

به تعدادی مجموع دنبالهٔ حسابی تبدیل کنیم:

$$\begin{aligned} S_n &= 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = 1 + (2+2) + (3+3+3) + \dots + (\underbrace{n+n+\dots+n}_{\text{بار}}) \\ &= (1+2+\dots+n) + (2+3+\dots+n) + (3+\dots+n) + \dots + ((n-1)+n) + n \end{aligned}$$

مجموعهای داخل پرانتز در عبارت آخر، همگی جمع جملات دنباله‌ی حسابی هستند. حال می‌توانیم با جایگذاری فرمول‌ها، فرمول کلی  $S_n$  را به دست آوریم.

در اینجا ما روش ابتکاری دیگری نیز ارائه می‌دهیم.

به جای به دست آوردن مستقیم  $S_n$ ، حاصل  $(1^2 + 2^2 + \dots + n^2)$  را با شکل به دست می‌آوریم. با توجه به  $k = k + k + \dots + k$  بار

می‌توانیم شکل زیر را برای  $S_n$  بسازیم:

$$\begin{array}{ccccccccccccccccccccc} n & n & \cdots & n & n & n & n-1 & \cdots & 2 & 1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ n-1 & n-1 & \cdots & n-1 & n & n-1 & \cdots & 2 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & & + & \vdots & \vdots & \ddots & & + & \vdots & \vdots & \ddots \\ 2 & 2 & & & & n & n-1 & & & & n-1 & n \\ 1 & & & & & n & & & & & & n \end{array}$$

در آرایه‌ی سمت چپ، مجموع اعداد هر ردیف همان  $n^2$ ,  $(n-1)^2$ , ...,  $2^2$  و  $1^2$  است. در آرایه‌ی وسط مجموع اعداد هر ستون، همان مربع‌های کامل است و در آرایه‌ی سمت راست، مجموع اعداد روی خط‌های مورب موازی وتر مثلث، اعداد مربع کامل را ایجاد می‌کند. حال با کمی دقت متوجه می‌شویم که جمع اعداد متناظر در سه مثلث برابر  $2n+1$  است، یعنی با جمع اعداد بالا به شکل زیر می‌رسیم:

$$\begin{array}{ccccccccccccc} 2n+1 & 2n+1 & 2n+1 & \cdots & 2n+1 & 2n+1 & 2n+1 \\ 2n+1 & 2n+1 & \cdots & 2n+1 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & & & \\ 2n+1 & 2n+1 & & & & & \\ 2n+1 & & & & & & \end{array}$$

در مثلث نهایی  $\frac{n(n+1)}{2}$  عدد وجود دارد (چرا؟) که همگی برابر  $1$  هستند، پس مجموع آنها  $(2n+1)\frac{n(n+1)}{2}$  می‌شود. می‌دانیم این

مجموع  $3$  برابر  $S_n$  است. پس نکته‌ی زیر را نتیجه می‌گیریم:

$$S_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

**نکته:** مجموع اعداد مربع کامل از  $1$  تا  $n^2$  برابر است با:

◀ **مثال:** مجموع اعداد مربع کامل متوالی از  $1$  تا  $25$  برابر است با:

$$1^2 + 2^2 + \dots + 5^2 = \frac{5 \times 6 \times 11}{6} = 55$$

○ **مسئله‌ی (۹):** حاصل مجموع زیر را به دست آورید.

$$S = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}(1^2 + 2^2) + \frac{1}{12}(1^2 + 2^2 + 3^2) + \frac{1}{20}(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2) + \dots + \frac{1}{360}(1^2 + 2^2 + \dots + 6^2)$$

**حل:** اگر قرار دهیم  $a_n = \frac{1}{n(n+1)}(1^2 + 2^2 + \dots + n^2)$  است. داریم:

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2n+1}{6}$$

$$S_{60} = a_1 + a_2 + \dots + a_{60} = \frac{2 \times 1 + 1}{6} + \frac{2 \times 2 + 1}{6} + \dots + \frac{2 \times 60 + 1}{6} = \frac{1}{6}((2(1 + \dots + 60)) + (\underbrace{(1 + \dots + 1)}_{60}))$$

$$= \frac{1}{6}(2 \times \frac{60 \times 61}{2} + 60) = \frac{1}{6} \times 60 \times 62 = 620$$

○ **مسئله‌ی (۱۰):** معادله‌ی زیر را حل کنید.

$$1 \times 1987 + 2 \times 1986 + 3 \times 1985 + \dots + 1986 \times 2 + 1987 \times 1 = 1987 \times 994 \times x$$

**حل:** اگر قرار دهیم  $a_n = n(1988 - n)$ ، عبارت سمت چپ تساوی همان  $S_{1987}$  است.

با توجه به  $a_n = 1988n - n^2$  داریم:

$$S_{1987} = 1988 \times 1 - 1^2 + 1988 \times 2 - 2^2 + \dots + 1988 \times 1987 - 1987^2 = 1988(1 + 2 + \dots + 1987) - (1^2 + 2^2 + \dots + 1987^2)$$

$$= 1988 \times \frac{1987 \times 1988}{2} - \frac{1987 \times 1988 \times 3975}{6} = 1987 \times 994(1988 - 1325)$$


با توجه به آن که  $x = 1987 \times 994 = 1987$ ، از تساوی بالا نتیجه می‌گیریم:

$$x = 1988 - 1325 \Rightarrow x = 663$$


## تمرين‌های بخش ۱-۱

-۱ الف) مجموع اعداد طبیعی زوج متولی از ۲ تا ۲۱ را با استفاده از شکل زیر به دست آورید (ابعاد شکل را خودتان به دست آورید).


ب) این مجموع را با دو روش دیگر نیز به دست آورید.



-۲ با استفاده از دو شکل زیر، مجموع اعداد طبیعی فرد متولی را با روشی دیگر به دست آورید.



-۳ با استفاده از دو شکل زیر، و در نظر گرفتن مساحت‌ها، روشی جدید برای یافتن مجموع‌های زیر ارائه کنید.



$$\text{الف) } S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$


$$\text{ب) } S_n = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$$

-۴ مجموع  $n$  جمله‌ی اول دنباله‌های زیر را به دست آورید.

$$a_n = \frac{3 - 2n}{4} \quad \text{ب)$$

$$a_n = \frac{n-1}{3} \quad \text{ب)$$

$$a_n = 2n + 1 \quad \text{الف)$$



-۵ در هر حرکت شتابدار با شتاب ثابت، می‌توانیم مسافتی را که متحرک در مدت ۱ ثانیه می‌پیماید، با یک دنباله‌ی حسابی مدل کنیم.

الف) فرض کنید متحرکی از نقطه‌ی A شروع به حرکت کند، در ثانیه‌ی اول ۵ متر و در ثانیه‌ی دوم ۸ متر را طی کند. این متحرک در چه زمانی به نقطه‌ی B می‌رسد؟

ب) ادعای فرض مسأله را با قوانین فیزیکی اثبات کنید. یعنی نشان دهید که اگر با شتاب ثابت  $a$  و سرعت اولیه‌ی  $V_0$  شروع به حرکت کنیم، مسافت طی شده در ثانیه‌های ۱، ۲، ... یک دنباله‌ی حسابی را تشکیل می‌دهد.

-۶ مجموع اعداد طبیعی سه رقمی با شرایط زیر را بیابید.

الف) مضرب ۵ باشند.

ب) در تقسیم بر ۸، باقی‌مانده‌ی ۳ داشته باشند.

هر یک از مجموع‌های زیر شامل جملات یک دنباله‌ی هندسی است. حاصل مجموع را بیابید.

$$2 - \sqrt{2} + 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + \dots + \frac{1}{16} \quad \text{ب)}$$

$$\text{الف) } 54 - 18 + 6 - 2 + \dots + \frac{2}{243}$$

-۷ در یک دنباله‌ی هندسی می‌دانیم مجموع ۱۲ جمله‌ی اول، ۱۷ برابر مجموع ۶ جمله‌ی اول است. قدر نسبت تصاعد را به دست آورید.

-۸ در یک تصاعد هندسی با قدر نسبت  $\frac{1}{3}$  و جمله‌ی اول  $\frac{4}{3}$ ، مجموع جملات ابتدایی آن برابر  $\frac{4372}{2187}$  شده است. چند جمله‌ی تصاعد جمع شده است؟

-۹ در یک دنباله‌ی هندسی، جمله‌ی دهم ۹ برابر جمله‌ی ششم است. اگر جمله‌ی سوم برابر ۱۲ باشد، مجموع ۱۰ جمله‌ی اول دنباله را به دست آورید.

-۱۰ یک قرص دارویی، در هر بار مصرف ۵۰ میلی‌گرم ماده‌ی دارویی وارد بدن می‌کند. پس از هر ۸ ساعت، به طور متوسط هنوز ۲۳٪ از داروی ۸ ساعت قبل در بدن باقی مانده است.

الف) اگر فقط یک بار قرص را مصرف کنیم، پس از ۸۰ ساعت چقدر دارو در بدن باقی مانده است؟

ب) اگر هر ۸ ساعت یکبار، یک عدد از قرص را مصرف کنیم، پس از ۸۰ ساعت چقدر دارو در بدن باقی مانده است؟

- ۱۲ فرض کنید بانکی برای حساب سپرده‌ی کوتاه مدت ۱۰٪ سود سالیانه درنظر گرفته است. شخصی با یک میلیون تومان موجودی، حسابی کوتاه مدت باز می‌کند و در ابتدای هر سال، یک میلیون تومان دیگر به حساب واریز می‌کند. پس از ۶ سال موجودی حساب او چقدر است؟
- ۱۳ بانکی برای یک حساب سپرده، سود ۸٪ سالیانه درنظر گرفته است. طی ۲۰ سال، هر سال مبلغ ۱۰ میلیون تومان از این حساب برداشت شده است تا حساب خالی و بسته شده است. موجودی اولیه‌ی این حساب چقدر بوده است؟ \*
- ۱۴ یک شرکت تولیدی سالانه ۱۳ هزار کالا تولید می‌کند و هر سال ۱۰٪ از محصولات تولیدی آن شرکت در آن سال، از چرخه‌ی مصرف خارج می‌شوند. ۲۰ سال از شروع به کار این شرکت می‌گذرد. حدوداً چندهزار واحد کالا از این شرکت در چرخه‌ی مصرف است؟
- ۱۵ در مثلث قائم‌الزاویه‌ی  $ABC$  داریم  $\hat{C} = ۹۰^\circ$ . ارتفاع وارد بر وتر  $BA$  را رسم می‌کنیم، سپس در مثلث قائم‌الزاویه‌ی  $C, BA_1, A_1B_1$ ، ارتفاع وارد بر وتر  $A_1B_1$  را رسم می‌کنیم و این روند را ادامه می‌دهیم.
- (الف) طول پاره‌خط  $B_1A_1$  چقدر است؟
- (ب) طول پاره‌خط  $BB_2$  چه کسری از طول  $BC$  است؟
- (پ) مجموع طول همه‌ی پاره‌خط‌های  $B_1B_2, BB_1, B_2B_3, \dots$ ، چه می‌شود؟ آیا نتیجه با دید هندسی شما سازگار است؟
- ۱۶ هر یک از بسط‌های اعشاری زیر را به شکل یک کسر  $\frac{p}{q}$  بنویسید که در آن  $p$  و  $q$  دو عدد طبیعی نسبت به هم اول‌اند.
- (ب) ...  
 $b = ۰/۱۲۳۴۳۴۳۴۳۴\ldots$
- (الف) ...  
 $a = ۰/۶۷۶۷۶۷۶۷\ldots$
- ۱۷ اگر  $۲ - ۷x + f(x) = ۳x^3$ ، آن‌گاه حاصل  $f(۱) + f(۲) + \cdots + f(۲۰)$  را به دست آورید.
- ۱۸ حاصل مجموع  $S = ۱ \times ۴ + ۳ \times ۶ + ۵ \times ۸ + \cdots + (۲n - ۱)(۲n + ۲)$  را به دست آورید.
- ۱۹ (الف) اتحاد  $1 + (k+1)^3 - k^3 = ۲k + ۱$  را درنظر بگیرید. با نوشتن این تساوی به ازای  $k = ۱, ۲, \dots, n$  به  $n$  تساوی برسید و با جمع دو طرف آن‌ها نتیجه بگیرید: \*
- (ب) با درنظر گرفتن اتحاد  $1 + (k+1)^3 - k^3 = ۳k^2 + ۳k + ۱$  و با روش شبیه روشن قسمت (الف)، مجموع  $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3$  را به دست آورید.
- (پ) مجموع  $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3$  را به دست آورید.
- ۲۰ شبکه‌های هرمی (مانند شبکه‌ی غیر قانونی گلدکوئیست) از ساختاری استفاده می‌کنند که با استفاده از دنباله‌های هندسی می‌توانند آن‌ها را مدل کنند. در این تمرین حالت ساده‌ای از این نوع شبکه‌ها را برسی می‌کنیم. فرض کنید در شبکه‌ی «هرم طلای»، هر کسی برای ورود به شبکه باید ۵۰ هزار تومان پول بدهد. این شخص در عوض هدیه‌ای ۳۰۰ هزار تومانی از شبکه دریافت می‌کند. اگر یک نفر بتواند فرد دیگری را برای ورود به شبکه راضی کند، آن فرد زیرشاخه‌ی نفر اول محسوب می‌شود. همچنین تمام زیرشاخه‌های فرد جدید درآینده نیز زیرشاخه‌ی فرد اولیه هستند.
- (الف) اگر یک نفر در طول ۲ ماه بتواند دو نفر را زیرشاخه‌ی خود بکند و یک شهر یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد، طی چه مدتی همه‌ی افراد شهر عضو شبکه خواهند بود؟
- (ب) اگر جمعیت شهر با نرخ  $20\%$  درصد در ماه زیاد شود، قسمت (الف) را دوباره حل کنید.
- (پ) فرض کنید هر فرد به ازای هر زیرشاخه‌ای که جذب می‌کند، ۵۰ هزار تومان جایزه بگیرد. با فرض قسمت (الف) یک نفر طی چند ماه می‌تواند به سود برسد؟
- (ت) با درنظر گرفتن یک جمع ۱۰۰ نفره و فرض‌های قسمت (الف) و (پ) تعیین کنید که چند درصد افراد در این شبکه ضرر خواهند کرد و هیچ‌گاه به پول اولیه‌ی خود نخواهند رسید.



### پرسش‌های چهارگزینه‌ای

- ۱ در یک تصاعد عددی، جمله‌ی  $n^{\text{ام}}$  به صورت  $\frac{3}{2}n - 5$  است. مجموع ۱۵ جمله‌ی اول این تصاعد کدام است؟
- (۱) ۱۲۰ (۲) ۱۰۵ (۳) ۹۰ (۴) ۱۳۵
- ۲ حاصل جمع  $S = 169 + 171 + 173 + \dots + 209$  برابر کدام یک از اعداد زیر است؟
- (۱) ۴۱۳ (۲) ۴۱۰ (۳) ۶۳۳ (۴) ۸۱۳
- ۳ مقدار  $x$  از معادله  $231 = 23x + 5 + 9 + \dots + x$  کدام است؟
- (۱) ۴۳ (۲) ۳۹ (۳) ۴۱ (۴) ۳۷
- ۴ در تصاعد حسابی  $\dots, -27, x, -21, -15, -9, -3$ ، مجموع جملات منفی کدام است؟ (آزاد-۸۷)
- (۱) -۱۳۵ (۲) -۱۵۰ (۳) -۷۵ (۴) -۲۷۰
- ۵ در یک دنباله‌ی حسابی داریم:  $S_4 = a_1 + \dots + a_4 = 54$  و  $S_5 = a_1 + \dots + a_5 = 60$ . قدرنسبت دنباله کدام است؟
- (۱) -۳ (۲) -۶ (۳) ۳ (۴) ۶
- ۶ جواب معادله  $8^{5x} = 8^{5x+3+6+9+\dots+3x}$  کدام است؟
- (۱) ۶ (۲) ۷ (۳) ۸ (۴) ۹
- ۷ در یک تصاعد عددی با جمله‌ی اول  $a$ ، اگر یک واحد به قدرنسبت جملات افزوده شود، آن‌گاه به مجموع ۲۰ جمله‌ی اول چقدر افزوده خواهد شد؟ (سراسوی-۸۳)
- (۱) ۱۶۰ (۲) ۱۷۰ (۳) ۱۸۰ (۴) ۱۹۰
- ۸ اگر مجموع هشت جمله‌ی اول از تصاعد حسابی با جملات  $p - 1, p, 2p, \dots, 7p$  باشد، قدرنسبت این تصاعد چقدر است؟ (آزاد-۸۸)
- (۱) ۹ (۲) ۷ (۳) -۹ (۴) -۷
- ۹ مجموع  $n$  جمله‌ی اول یک دنباله‌ی حسابی  $S_n = \frac{n(9n-5)}{12}$  است. قدرنسبت این دنباله کدام است؟
- (۱)  $\frac{5}{4}$  (۲)  $\frac{5}{3}$  (۳)  $\frac{4}{3}$  (۴)  $\frac{3}{2}$
- ۱۰ مجموع اعداد دو رقمی که باقی‌مانده‌ی آن‌ها بر ۵ برابر ۲ باشد، کدام است؟
- (۱) ۹۸۱ (۲) ۹۹۳ (۳) ۸۹۱ (۴) ۹۰۱
- ۱۱ مجموع  $n$  جمله‌ی اولیه‌ی یک دنباله‌ی حسابی از رابطه  $S_n = n^2 + n$  بدست می‌آید. اگر جملات این دنباله را با  $a_1, a_2, \dots$  نشان بدهیم، حاصل مجموع  $A = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{99}$  چقدر است؟
- (۱) ۲۵۰۰ (۲) ۲۵۵۰ (۳) ۴۹۰۰ (۴) ۵۰۰۰
- ۱۲ حاصل مجموع  $S = 7 + 8 + 17 + 18 + 27 + 28 + \dots + 197 + 198$  کدام است؟
- (۱) ۴۵۰۰ (۲) ۳۸۰۰ (۳) ۴۰۰۰ (۴) ۴۱۰۰
- ۱۳ مجموع  $n$  جمله‌ی اولیه از دنباله‌ی هندسی زیر برابر ۱۰۲۶ است.  $n$  کدام است؟
- (۱) ۸ (۲) ۱۰ (۳) ۱۰۰۰ (۴) ۶, ۱۲, ۲۴, ...
- (۴) هیچ‌گاه جمع جملات برابر ۱۰۲۶ نمی‌شود.

- ۱۴- اگر جملات اول و پنجم یک دنباله‌ی هندسی به ترتیب  $\frac{7}{3}$  و  $189$  باشند، مجموع شش جمله‌ی اول آن چقدر است؟ (در دنباله جملات منفی نیز حضور دارند!)
- $\frac{1247}{3} \quad (4)$        $-\frac{2548}{3} \quad (3)$        $\frac{2548}{3} \quad (2)$        $-\frac{1247}{3} \quad (1)$
- ۱۵- در یک تصاعد هندسی، مجموع سه جمله‌ی اول  $136$  و مجموع شش جمله‌ی اول آن  $153$  است. جمله‌ی اول چند برابر جمله‌ی پنجم است؟ (سراسری-۸۹)
- ۱۶ (۴)      ۸ (۳)      ۹ (۲)       $\frac{81}{16} \quad (1)$
- ۱۶- در یک تصاعد هندسی، مجموع جملات اول و سوم برابر  $1$  و مجموع چهار جمله‌ی اول آن  $3$  است. مجموع شش جمله‌ی اول کدام است؟ (سراسری-۸۸)
- ۱۰/۸ (۴)      ۱۲/۶ (۳)      ۱۱/۲ (۲)       $13/4 \quad (1)$
- ۱۷- اگر  $S_n$  مجموع  $n$  جمله‌ی اول یک دنباله‌ی هندسی باشد و  $S_n = \frac{3^n - 1}{5}$ ، آن‌گاه جمله‌ی هفتم این دنباله کدام است؟
- $\frac{128}{5} \quad (4)$        $\frac{63}{5} \quad (3)$        $\frac{64}{5} \quad (2)$        $\frac{127}{5} \quad (1)$
- ۱۸- حاصل  $(x + x^r + \dots + x^k)(1 - x + x^r - \dots + x^k)$  به ازای  $x = \sqrt{2}$  کدام است؟ (سراسری-۸۲)
- ۵۱۶ (۴)      ۵۱۲ (۳)      ۵۱۱ (۲)      ۵۰۷ (۱)
- ۱۹- در دنباله‌ی  $\{a_n\}$  می‌دانیم  $a_2 = 2$  و  $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{3^n}$ . مقدار  $128a_7$  کدام است؟
- ۳۸۲ (۴)      ۱۲۶ (۳)      ۳۸۳ (۲)      ۵۱۱ (۱)
- ۲۰- دنباله‌ای از شکل‌ها طبق روند زیر می‌سازیم. اختلاف تعداد دایره‌های سیاه در شکل‌های پانزدهم و هفدهم کدام است؟
- (۱)      (۲)      (۳)      (۴)      ۳۱ (۲)      ۳۵ (۳) صفر
- ۲۱- موجی بر روی نیم‌دایره‌ها بالای یک محور حرکت می‌کند. با قطر اولیه‌ی  $1$  واحد، هر بار که به محور برخورد می‌کند،  $20$  درصد از طول قطر آن کاسته می‌شود. اندازه‌ی محیط این نیم‌دایره‌های متوالی، دنباله‌ی اعداد حقیقی است. مجموع این دنباله کدام است؟ (سراسری-۸۴)
- $3\pi/2$        $2\pi$  (۱)       $\frac{3}{2}\pi$  (۳)       $\frac{5}{2}\pi$  (۴)
- ۲۲- وسطهای اخلاص یک شش ضلعی منتظم به ضلع  $a$  را به هم وصل می‌کنیم تا شش ضلعی منتظم جدیدی تشکیل شود. سپس وسطهای اخلاص شش ضلعی منتظم جدید را به هم وصل می‌کنیم و عمل را ادامه می‌دهیم. حد مجموع محیط‌های این شش ضلعی‌ها کدام است؟
- $18a(\sqrt{2} + 2) \quad (4)$        $18a(\sqrt{3} + 2) \quad (3)$        $12a(\sqrt{3} + 2) \quad (2)$        $12a(\sqrt{2} + 2) \quad (1)$



### پاسخ‌های تشریمی

**۱- گزینه‌ی (۲)** جمله‌ی اول  $a_1 = \frac{3}{2} \times 15 - 5$  و جمله‌ی پانزدهم  $a_{15} = \frac{3}{2} \times 15 - 5$  است، حال داریم:

$$S_{15} = \frac{15}{2} (a_1 + a_{15}) = \frac{15}{2} \left( \frac{3}{2} \times 15 - 5 + \frac{3}{2} \times 15 - 5 \right) = \frac{15}{2} \left( \frac{3}{2} \times 16 - 10 \right) = 105$$

**۲- گزینه‌ی (۳)** می‌دانیم جمع اعداد فرد از ۱ تا ۲۰۹ برابر است با  $105^2$  و جمع اعداد فرد از ۱ تا ۱۶۷ برابر است با  $84^2$ ، بنابراین:

$$S = 105^2 - 84^2 = (105 - 84)(105 + 84) = 21 \times 189 = 21^2 \times 9 = 63^2$$

**۳- گزینه‌ی (۴)** با جملات یک دنباله‌ی حسابی با قدرنسبت ۴ مواجه‌ایم. تعداد جملات مجموع را  $n$  می‌گیریم، داریم:

$$x = 1 + (n-1) \times 4 \Rightarrow n-1 = \frac{x-1}{4} \Rightarrow n = \frac{x+3}{4}$$

$$S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n) = \frac{x+3}{8} (1+x) \xrightarrow{S_n=231} (x+3)(x+1) = 8 \times 231 = 42 \times 44 \Rightarrow x = 41$$

**۴- گزینه‌ی (۱)** قدرنسبت تصاعد را  $d$  می‌گیریم، پس  $d = 27 - 21 = 6$ . حال آخرین جمله‌ی منفی را  $a_n$  می‌گیریم، داریم:  $a_n < 0 \Rightarrow -27 + 3(n-1) < 0 \Rightarrow n-1 < 9 \Rightarrow n < 10 \xrightarrow{n \in \mathbb{N}} n \leq 9$

$$\text{پس مجموع } S = a_1 + a_2 + \dots + a_9 = \frac{9}{2} (2 \times (-27) + 8 \times 3) = -135$$

**۵- گزینه‌ی (۱)** با توجه به فرمول دنباله‌ی حسابی، دستگاهی شامل دو معادله تشکیل می‌دهیم:

$$\left. \begin{array}{l} S_5 = \frac{5}{2} (2a_1 + 4d) \xrightarrow{S_5=60} a_1 + 2d = 12 \\ S_4 = \frac{4}{2} (2a_1 + 3d) \xrightarrow{S_4=54} 2a_1 + 3d = 27 \end{array} \right\} \Rightarrow d = -3, a_1 = 18$$

**۶- گزینه‌ی (۲)** مجموع اعداد در توان ۴ را پیدا می‌کنیم:

$$3 + 6 + 9 + \dots + 3x = 3(1 + 2 + 3 + \dots + x) = 3 \times \frac{x(x+1)}{2} \Rightarrow 4^{3+...+3x} = 4^{3x(x+1)}$$

چون  $2^{3 \times 56} = 8^{56}$ ، از مقایسه‌ی دو طرف معادله نتیجه می‌گیریم  $x = 56$ ، پس  $x = 7$ .

**۷- گزینه‌ی (۱۴)** مجموع ۲۰ جمله‌ی اول تصاعد اولیه برابر است با  $S_{20} = \frac{20}{2} (a + 19d) = 10(a + 19d)$  و مجموع ۲۰ جمله‌ی تصاعد دوم برابر است با

$$S'_20 = \frac{20}{2} (a + 19(d+1))$$

$$S'_20 - S_{20} = 10(a + 19d + 19 - a - 19d) = 10 \times 19 = 190$$

**۸- گزینه‌ی (۲)** قدرنسبت تصاعد برابر است با:  $d = a_2 - a_1 = -2 - p$ ، پس مجموع ۸ جمله‌ی اول آن برابر است با:

$$S_8 = \frac{8}{2} (2a_1 + 7d) = 4(2(1+2p) + 7(-2-p)) = -4(12 + 3p) \xrightarrow{S_8=8} 12 + 3p = -15 \Rightarrow p = -9 \Rightarrow d = -2 + 9 = 7$$

**۹- گزینه‌ی (۱۵)** می‌دانیم  $a_2 = S_2 - S_1$  و  $S_1 = a_1$ ، بنابراین:

$$\left. \begin{array}{l} a_1 = \frac{1 \times 4}{12} = \frac{1}{3} \\ a_2 = \frac{2 \times 13}{12} - \frac{1}{3} = \frac{11}{6} \end{array} \right\} \Rightarrow d = a_2 - a_1 = \frac{11}{6} - \frac{1}{3} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

**۱۰- گزینه‌ی (۱)** می‌خواهیم مجموع  $97 + 97 + \dots$  را پیدا کنیم. با مجموع یک دنباله‌ی حسابی با قدرنسبت ۵ مواجه‌ایم که اگر تعداد جملات آن را  $n$  بگیریم، داریم:

$$97 = 12 + 5(n-1) \Rightarrow n = 18 \Rightarrow S = \frac{1}{2}(12 + 97) = 981$$

**۱۱- گزینه‌ی (۲)** اولاً چون  $S_1 = a_1 = 1 + 1 = 2$ ، پس  $A$  را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:  
 $A = a_1 + (a_1 + 2d) + (a_1 + 4d) + \dots + (a_1 + 98d) = 5 \cdot a_1 + 2(d + 2d + \dots + 49d)$   
 $\Rightarrow A = 2(5 \cdot a_1 + d + 2d + \dots + 49d) - 5 \cdot a_1 = 2(a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + 49d)) - 5 \cdot a_1$   
 $= 2S_5 - 5 \cdot a_1 \Rightarrow A = 2(5 \cdot 1 + 5 \cdot 1) - 5 \cdot 1 \times 2 = 500$

**۱۲- گزینه‌ی (۳)** مجموع  $S$  را به دو مجموع از جملات دو دنباله‌ی حسابی با قدرنسبت‌های ۱۰ تقسیم می‌کنیم:  
 $S_1 = 7 + 17 + 27 + \dots + 197 = \frac{1}{2}(\frac{197-7}{10} + 1)(7 + 197) = 10 \times 204$   
 $S_2 = 8 + 18 + 28 + \dots + 198 = \frac{1}{2}(\frac{198-8}{10} + 1)(8 + 198) = 10 \times 206$

پس مجموع نهایی برابر است با:  $S = 10(204 + 206) = 4100$

**۱۳- گزینه‌ی (۴)** قدرنسبت دنباله‌ی هندسی برابر ۲ است، پس اگر تعداد جملات را  $n$  بگیریم، داریم:  
 $S_n = 5 \times \frac{1 - (-2)^n}{1 - (-2)} \xrightarrow{S_n = 1 \cdot 2^6} \frac{1 \cdot 2^6}{2} = \frac{1 - (-2)^n}{3} \Rightarrow 513 = 1 - (-2)^n \Rightarrow (-2)^n = -512 \Rightarrow n = 9$

**۱۴- گزینه‌ی (۱)** جملات دنباله را  $a_1, a_2, \dots, a_5$  و می‌نامیم. داریم  $a_1 = 189$  و  $a_5 = \frac{\gamma}{3}$ ، بنابراین:  
 $189 = \frac{\gamma}{3} \times q^4 \Rightarrow q^4 = 27 \times 3 \xrightarrow{q < 0} q = -3 \Rightarrow S_5 = a_1 \times \frac{1 - q^5}{1 - q} = \frac{\gamma}{3} \times \frac{1 - (-3)^5}{1 + 3} = -\frac{1247}{3}$

**۱۵- گزینه‌ی (۲)** طبق فرمول  $S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$  و استفاده از فرض‌های  $S_2 = 136$  و  $S_4 = 153$  داریم:  
 $S_2 = \frac{153}{136} S_4 = \frac{9}{8} S_4 \Rightarrow a_1 \times \frac{1 - q^2}{1 - q} = \frac{9}{8} a_1 \times \frac{1 - q^4}{1 - q} \xrightarrow{a_1 \neq 0, q \neq 1} 8 - 8q^2 = 9 - 9q^4 \Rightarrow 8q^4 - 9q^2 + 1 = 0$   
 $\Rightarrow (8q^2 - 1)(q^2 - 1) = 0 \xrightarrow{q \neq 0} q^2 = 1 \Rightarrow q = \frac{1}{2}$

$a_1$  جمله‌ی اول،  $q$  برابر جمله‌ی پنجم یعنی  $a_5 = 16 = (\frac{1}{2})^{-4}$  است. پس پاسخ تست  $= 16$  برابر می‌شود.

**۱۶- گزینه‌ی (۳)** جمله‌ی اول را  $a$  و قدرنسبت را  $q$  می‌گیریم. پس  $a + aq^3 = 1$  و طبق فرض داریم:  
 $a \frac{1 - q^3}{1 - q} = 3 \Rightarrow a(1 + q^3) \times \frac{1 - q^3}{1 - q} = 3 \xrightarrow{a(1 + q^3) = 1} \frac{1 - q^3}{1 - q} = 3 \Rightarrow 1 + q = 3 \Rightarrow q = 2$

حال طبق فرض  $1 = (1 + q^3)a$ ، نتیجه می‌گیریم  $a = \frac{1}{5}$ ، بنابراین:

$$S_5 = a \times \frac{1 - q^5}{1 - q} = \frac{1}{5} \times \frac{1 - 2^5}{1 - 2} = \frac{1}{5}(64 - 1) = \frac{63}{5} = 12.6$$

**۱۷- گزینه‌ی (۴)** می‌دانیم  $a_7 = S_7 - S_6$ ، بنابراین:

$$a_7 = \frac{2^7 - 1}{5} - \frac{2^6 - 1}{5} = \frac{2^7 - 2^6}{5} = \frac{2^6(2 - 1)}{5} = \frac{64}{5}$$

**۱۸- گزینه‌ی (۵)** در پرانتر اول با جملات یک دنباله‌ی هندسی با قدرنسبت  $x$  و در پرانتر دوم با قدرنسبت  $-x$  مواجه‌ایم:

$$(1 + x + x^2 + \dots + x^k)(1 - x + x^2 - \dots + x^k) = \frac{1 - x^k}{1 - x} \times \frac{1 - (-x)^k}{1 - (-x)} = \frac{(1 - x^k)(1 + x^k)}{(1 - x)(1 + x)} = \frac{1 - x^{2k}}{1 - x^2}$$

به ازای  $x = \sqrt{2}$  عبارت بالا برابر است با:  $\frac{1 - 2^2}{1 - 2} = 511$

**۱۹-گزینه‌ی (۱۴)** در رابطه‌ی بازگشتی به جای  $n$  قرار می‌دهیم  $1, 2, \dots, 6$ . نتیجه می‌گیریم:

$$a_2 - a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_3 - a_2 = \frac{1}{4}, \quad a_4 - a_3 = \frac{1}{8}, \quad \dots, \quad a_7 - a_6 = \frac{1}{64}$$

با جمع دو طرف تساوی‌های بالا به دست می‌آوریم:

$$a_7 - a_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{64} \Rightarrow a_7 - a_1 = \frac{1}{2} \times \frac{1 - (\frac{1}{2})^6}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{64} = \frac{63}{64}$$

$$\text{با توجه به } a_1 = 2 \text{ نتیجه می‌گیریم } a_7 = 2 + \frac{63}{64} = \frac{191}{64}. \text{ پس } 128a_7 = 382.$$

**۲۰-گزینه‌ی (۱)** در شکل‌های اول و دوم تعداد دایره‌های سیاه برابر ۱، در شکل‌های سوم و چهارم برابر  $5+1=6$  است. یعنی در شکل‌های شماره‌ی  $(1-2n)$  و  $(2n)$ ، تعداد دایره‌های سیاه از دو شکل قبلی به اندازه‌ی  $(1-2n)$  اُمین عدد فرد بیشتر است. پس در شکل هفدهم، تعداد دایره‌های سیاه به اندازه‌ی هفدهمین عدد فرد از شکل‌های پانزدهم و شانزدهم بیشتر است، یعنی به اندازه‌ی  $33=17-1=2\times 17$  تا.


**۲۱-گزینه‌ی (۱۵)** محیط نیم‌دایره‌ی اول  $a = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{80}{5} = \frac{8\pi}{5}$  می‌گیریم. مطابق شکل، پاره‌خط  $AB$  از طرفی برابر  $2b$  است

$$\frac{\frac{\pi}{2}}{1 - \frac{4}{5}} = \frac{5\pi}{2}$$

(زیرا هر بار  $80^\circ$  درصد محیط قبلي باقی می‌ماند). به این ترتیب حد مجموع جملات دنباله برابر است با:

**۲۲-گزینه‌ی (۱۶)** ضلع شش‌ضلعی منتظم داخلی را  $b$  و ضلع شش‌ضلعی اول را  $a$  می‌گیریم. مطابق شکل، پاره‌خط  $AB$  از طرفی برابر  $2b$  است و از طرفی دو برابر ارتفاع مثلث متساوی‌الاضلاع‌های به ضلع  $a$  بنا برایم:

$$2b = 2a \times \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow b = a \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$



به این ترتیب با یک دنباله‌ی هندسی با جمله‌ی اول  $6a$  (محیط شش‌ضلعی اول) و قدرنسبت  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  مواجه‌ایم که حد مجموع

$$\frac{6a}{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}} = 12a(2 + \sqrt{3})$$

www.RIAZISARA.IR

سایت ریاضی سارا