




سایت ویژه ریاضیات www.riazisara.ir

درسنامه ها و جزوه های ریاضی
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور
نمونه سوالات امتحانات ریاضی
نرم افزارهای ریاضیات
و...

(@riazisara)

ریاضی سرا در تلگرام:



<https://t.me/riazisara>

(@riazisara.ir) ریاضی سرا در اینستاگرام:



<https://www.instagram.com/riazisara.ir>

فصل دوم

مشکلات

❖ درس اول: متاب و تاثرانت

❖ درس دوم: معادلات مشکاتی

شیرورادی	نوبت دوم	نوبت اول
۳	۲	۵

بارم فصل ۲:

فصل ۲ درس ۱: تناوب و تناثرانت


تابع مثلثاتی:

هر تابع شامل نسبت های مثلثاتی را تابع مثلثاتی می گوئیم که ساده ترین آن $f(x) = \sin x$ و $f(x) = \cos x$ می باشد.

ویژگی های تابع باضابطه های $f(x) = \sin x$ و $f(x) = \cos x$:


* نمودار تابع $f(x) = \sin x$:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
y	0	1	0	-1	0
تغییرات		↗	↘	↘	↗



* نمودار تابع $f(x) = \cos x$:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
y	1	0	-1	0	1
تغییرات		↘	↘	↗	↗



* هر دو تابع متناوب هستند چون در فواصل معینی نمودار آن تکرار می شود. طول هر یک از این فاصله را دوره تناوب می گوئیم و با حرف T نمایش می دهیم

* دوره تناوب تابع: $T = 2\pi$

* تعریف ریاضی تابع متناوب:

تابع f را متناوب می نامیم هرگاه یک عدد حقیقی مثبت مانند T موجود باشد به طوری که برای هر $x \in D_f$ داشته

$$f(x \pm T) = f(x)$$

$$1) \sin(x \pm 2\pi) = \sin x$$

$$2) \cos(x \pm 2\pi) = \cos x$$

باشیم:

کوچک ترین عدد مثبت T با این خاصیت را دوره تناوب f می نامیم

* ماکزیمم و مینیمم تابع: $\max = 1$, $\min = -1$

* دامنه و برد تابع: $D_f = \mathbb{R}$, $R_f = [-1, 1]$

ویژگی های تابع باضابطه های

$$f(x) = a \cos bx + c \text{ و } f(x) = a \sin bx + c$$

* ضریب a و مقدار c روی ماکزیمم و مینیمم تابع تاثیر می گذارد

* ضریب b روی دوره تناوب تابع تاثیر می گذارد

* دوره تناوب تابع: $T = \frac{2\pi}{|b|}$

توجه: دوره تناوب باید مثبت باشد بنابراین از قدر مطلق استفاده می کنیم.

پ) $y = \pi \sin(-x) + 1$

ت) $y = 8 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$

الف) $y = 1 + 2 \sin 7x$

ب) $y = \sqrt{3} - \cos \frac{\pi}{2} x$

پ) $y = -\pi \sin\left(\frac{x}{2}\right) - 2$

ت) $y = -\frac{3}{4} \cos 3x$

* ماکزیمم و مینیمم تابع:

$$\min = -|a| + c, \quad \max = |a| + c$$

* مقدار c و a :

$$\left. \begin{array}{l} \max = |a| + c \\ \min = -|a| + c \end{array} \right\} \rightarrow 2c = \max + \min$$

$$\rightarrow c = \frac{\max + \min}{2}, \quad |a| = \frac{\max - \min}{2}$$

نوشتن مقادیر ماکزیمم و مینیمم و دوره تناوب با داشتن ضابطه:

(مثال ص ۳۵ و تمرینی ص ۴۰)

دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم هر یک از توابع زیر را مشخص نمایید.

الف) $y = 3 \sin(2x) - 2$

✓ حل:

$$y = 3 \sin(2x) - 2 \quad \left\{ \begin{array}{l} a = 3 \\ b = 2 \\ c = -2 \end{array} \right.$$

$$\max = |a| + c \rightarrow \max = |3| - 2 = 1$$

$$\min = -|a| + c \rightarrow \min = -|3| - 2 = -5$$

$$T = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

ب) $y = -\frac{1}{4} \cos(\pi x)$

نوشتن مقادیر ماکزیمم و مینیمم و دوره تناوب با داشتن نمودار:

* تشخیص نمودار سینوس و کسینوس:

اگر محور y ها از اکسترمم تابع (ماکزیمم یا مینیمم تابع) رد شده باشد، نمودار کسینوس است. در غیر این صورت نمودار سینوس است

* a, b چون قدر مطلق دارند، پس می توانند مثبت یا منفی باشند

* علامت a :


در نمودار سینوس و کسینوس اگر ابتدا ماکزیمم داشتیم a مثبت است و اگر ابتدا مینیمم داشتیم a منفی است.

* علامت b :

مثبت یا منفی بودن b در کسینوس بی تاثیر است زیرا کسینوس منفی را می خورد ولی در سینوس اگر ابتدا ماکزیمم داشتیم b مثبت و اگر ابتدا مینیمم داشتیم b منفی است.

(مثال ص ۵ و تمرین ۴ ص ۴۱)

ضابطه مربوط به هر یک از نمودارهای داده شده را بنویسید.



✓ حل:

محور y ها از اکسترمم تابع (ماکزیمم یا مینیمم تابع) رد نشده است، نمودار سینوس است و چون ابتدا ماکزیمم آمده، پس a, b مثبت است.






$$\max = 7, \min = 1, T = \pi$$

$$|a| = \frac{\max - \min}{2} = \frac{7 - 1}{2} = 3$$

$$c = \frac{\max + \min}{2} = \frac{7 + 1}{2} = 4$$

$$T = \frac{2\pi}{|b|} \rightarrow |b| = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\pi} = 2$$

$$y = a \sin bx + c \rightarrow y = 3 \sin(2x) + 4$$



$$|a| = \frac{\max - \min}{2} = \frac{3 - (-3)}{2} = 3$$

$$c = \frac{\max + \min}{2} = \frac{3 + (-3)}{2} = 0$$

$$T = \frac{2\pi}{|b|} \rightarrow |b| = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\pi} = 2$$

$$y = a \sin bx + c \rightarrow \boxed{y = 3 \sin(2x)}$$

یا

$$y = a \cos bx + c \rightarrow \boxed{y = 3 \cos(2x)}$$

ب) $T = \pi$, $\max = 9$, $\min = 3$

پ) $T = 4\pi$, $\max = -1$, $\min = -7$

ت) $T = \frac{\pi}{2}$, $\max = 1$, $\min = -1$

(تمرین ۲ ص ۴۰)





② هر یک از توابع داده شده را با نمودارهای زیر نظیر کنید.

الف) $y = \sin \pi x$ (الف)

ب) $y = 2 - \cos \frac{1}{2} x$

ت) $y = 1 - \cos 2x$

پ) $y = \sin 2x$



نوشتن ضابطه با داشتن مقادیر ماکزیمم و مینیمم و دوره تناوب:

(تمرین ۳ ص ۴۱)

③ در هر مورد ضابطه تابعی مثلثاتی با دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم داده بنویسید.

الف) $T = \pi$, $\max = 3$, $\min = -3$

☑ حل: در سوال قید نکرده ضابطه تابع سینوس یا کسینوس ، بنابراین ضابطه هر کدام بنویسیم درست است.


a, b چون قدر مطلق دارند ، پس می توانند مثبت یا منفی

باشند که در اینجا ما هر دو را مثبت فرض می کنیم.

تابع تانژانت:

* نمودار تابع $f(x) = \tan x$:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
y	0	ت	0	ت	0
تغییرات		$+\infty$		$+\infty$	

* دوره تناوب تابع $f(x) = \tan x$: $T = \pi$

* دامنه و برد تابع:

تابع تانژانت در نقاطی که مضرب فرد $\frac{\pi}{2}$ هست تعریف نشدهاست $\left(x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right)$ مثلاً $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right)$ زیرا دراین نقاط مقدار $\cos x$ صفر می شود و $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ معنی

ندارد. بنابراین دامنه و برد تابع به صورت زیر است:


$$D_f = \left\{ x \in \mathbb{R} / x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}, \quad R_f = \mathbb{R}$$

* تابع تانژانت در بازه هایی مثل زیر و هر زیر مجموعه ای از

این بازه ها اکیدا صعودی است.

$$\left(0, \frac{\pi}{2} \right), \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right), \left(\pi, \frac{3\pi}{2} \right), \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi \right)$$

تانژانت: (فعالیت ص ۳۷)



* محور تانژانت بر دایره مثلثاتی

مماس و موازی محور سینوس

و عمود بر محور کسینوس است

* برای پیدا کردن تانژانت

هر زاویه، ضلع آن را امتداد می دهیم تا محور تانژانت را قطع

کند. سپس فاصله آن از مبدا تابع تانژانت یعنی A را به دست

می آوریم که در بالا مثبت و در پایین منفی است.

تغییرات تانژانت: (گارد رگلاسی ص ۳۸)

با تغییر زاویه α مقادیر تانژانت آن نیز تغییر می کند.

با افزایش α از 0 تا $\frac{\pi}{2}$ ، مقدار $\tan \alpha$ از 0 تا $+\infty$ افزایش می یابد.	
با افزایش α از $\frac{\pi}{2}$ تا π ، مقدار $\tan \alpha$ از $-\infty$ تا 0 افزایش می یابد.	
با افزایش α از π تا $\frac{3\pi}{2}$ ، مقدار $\tan \alpha$ از 0 تا $+\infty$ افزایش می یابد.	
با افزایش α از $\frac{3\pi}{2}$ تا 2π ، مقدار $\tan \alpha$ از $-\infty$ تا 0 افزایش می یابد.	

(گارد در کلاسی ص ۳۹)

صعودی یا نزولی بودن تابع $y = \tan x$ را در مجموعه
 $\left[0, 2\pi\right] - \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$ بررسی کنید.

☑ حل:

تابع تانژانت در بازه $\left[0, 2\pi\right]$ غیر یکنواست. ولی در
 $\left[0, 2\pi\right] - \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$ اکیدا صعودی است.

(تمرین ۵ ص ۴۰)

۵) کدام یک از جملات زیر درست و کدام یک نادرست است؟

الف) تابع تانژانت در دامنه اش صعودی است.

ب) می توان بازه ای یافت که تابع تانژانت در آن نزولی باشد.

پ) تابع تانژانت در هر بازه که در آن تعریف شده باشد،
 صعودی است.


مقایسه $\sin \alpha$ و $\tan \alpha$:

(تمرین ۶ ص ۴۰)

۶) با توجه به محورهای سینوس و تانژانت، در موارد زیر
 مقادیر $\sin \alpha$ و $\tan \alpha$ را با هم مقایسه کنید:

الف) $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ب) $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$

☑ حل:



$$\left. \begin{array}{l} \text{ربع اول و سوم} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \\ \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \sin \alpha < \tan \alpha \\ \text{ربع دوم و چهارم} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \\ \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi \end{array} \right\} \Rightarrow \sin \alpha > \tan \alpha \end{array} \right\}$$

$$\text{در کل دایره مثلثاتی} \rightarrow |\sin \alpha| < |\tan \alpha|$$

فصل ۲ درس ۲: معادلات مثلثاتی

$$\sin 30^\circ = 2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ$$

$$\frac{1}{2} = 2 \times \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{2} \cos 15^\circ$$

$$\frac{1}{2} = \sqrt{2} - \sqrt{3} \cos 15^\circ$$

$$\cos 15^\circ = \frac{1}{2\sqrt{2} - \sqrt{3}}$$

(15° در ربع اول است پس کسینوس مثبت است.)

(تمرین ۱ و ۲ ص ۴۵)

② نسبت‌های مثلثاتی سینوس و کسینوس را برای زاویه $22/5^\circ$ به دست آورید.

نسبت های مثلثاتی زوایای دوبرابر کمان:

* مقدار نسبت مثلثاتی برخی زوایای غیر معروف مثل:

($15^\circ, 22/5^\circ, \dots$) را می توان به کمک زوایای معروف مثل:

($30^\circ, 45^\circ, \dots$) به دست آورد.

* وقتی کمان دوبرابر یا نصف می شود مقدار سینوس یا کسینوس

دوبرابر یا نصف نمی شود. مثلاً $\cos 15^\circ$ را به کمک مقدار معلوم

$\cos 30^\circ$ می توان یافت اما نه با نصف کردن.

بنابراین از روابط زیر کمک می گیریم:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

(مثال ص ۴۳)

مقدار $\cos 15^\circ$ و $\sin 15^\circ$ را بیابید.

✓ حل:

$$\cos 30^\circ = 1 - 2 \sin^2 15^\circ$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = 1 - 2 \sin^2 15^\circ$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} - 1 = -2 \sin^2 15^\circ$$


$$\sin^2 15^\circ = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - 1}{-2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}$$

$$\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{2}$$

(15° در ربع اول است پس سینوس مثبت است.)

* اگر معادله به صورت $\sin x = a$ باشد:

(۱) این معادله وقتی جواب دارد که $(-1 \leq a \leq 1)$ باشد



$$\sin x = a \rightarrow \sin x = \sin \alpha \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \alpha \\ x = 2k\pi + \pi - \alpha \end{cases}$$

(۲) حالت های خاص:

$\sin x = 0 \rightarrow x = k\pi$	
$\sin x = 1 \rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$	
$\sin x = -1 \rightarrow x = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$	

$$\sin(-x) = -\sin x \quad (۳)$$

(مثال ص ۴۵)

معادله $\sin x = -\frac{1}{2}$ را حل کنید.

✓ حل:

$$\sin x = -\frac{1}{2} \rightarrow \sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi - \frac{\pi}{6} \\ x = 2k\pi + \pi + \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

① فرض کنید $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ و a زاویه ای حاده باشد، حاصل عبارات زیر را به دست آورید.

الف) $\cos 2\alpha$


✓ حل:

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$\cos 2\alpha = 2\left(\frac{5}{13}\right)^2 - 1 = \frac{119}{169}$$

ب) $\sin 2\alpha$

✓ حل:



با توجه به شکل:

$$\cos \alpha = \frac{5}{13}, \sin \alpha = \frac{12}{13}$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$\sin 2\alpha = 2 \times \frac{12}{13} \times \frac{5}{13} = \frac{120}{169}$$

مادلات مثلثاتی:

* معادله ای که در آن اطلاعاتی از نسبت های مثلثاتی یک زاویه مجهول داریم، یک معادله مثلثاتی نام دارد.

* در معادله مثلثاتی وقتی مقدار سینوس و کسینوس را پیدا کردیم باید جواب زاویه (x) را بنویسیم

(گاز دو کلاسی ص ۴۵)

الف) معادله $2 \sin x - \sqrt{3} = 0$ را حل کنید.

✓ حل:

$$2 \sin x - \sqrt{3} = 0 \rightarrow 2 \sin x = \sqrt{3}$$

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{3} \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{3} \\ x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

ب) معادله $4 \sin x + \sqrt{8} = 0$ را حل کنید.

(مثال ص ۴۷)

معادله $2 \sin 3x - \sqrt{2} = 0$ را حل کنید.

✓ حل:

$$2 \sin 3x - \sqrt{2} = 0 \rightarrow 2 \sin 3x = \sqrt{2}$$

$$\sin 3x = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \sin 3x = \sin \frac{\pi}{4} \rightarrow$$

$$\begin{cases} 3x = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \rightarrow x = \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{12} \\ 3x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{4} \rightarrow x = \frac{2k\pi + \pi}{3} - \frac{\pi}{12} \end{cases}$$

* اگر دو سینوس با هم برابر شوند، می توانیم جواب های کلی

معادله را بنویسیم و لازم نیست برای سینوس حتما یک عدد

مشخصی به دست آید

(مثال ص ۴۶ و تمرین ۳ الف ص ۴۸)

معادله $\sin 2x = \sin 3x$ را حل کنید.

✓ حل:

$$\sin 2x = \sin 3x \rightarrow \begin{cases} 2x = 2k\pi + 3x \rightarrow x = -2k\pi \\ 2x = 2k\pi + \pi - 3x \rightarrow x = \frac{2k\pi + \pi}{5} \end{cases}$$

الف) معادله $\sin \frac{\pi}{2} = \sin 3x$ را حل کنید.

(تمرین ۴ ص ۴۸)

④ مثلثی با مساحت ۳ سانتی متر مربع مفروض است. اگر اندازه

دو ضلع آن به ترتیب ۲ و ۶ سانتی متر باشند، آنگاه چند مثلث با

این خاصیت ها می توان ساخت؟

✓ حل:

$$s = \frac{1}{2} ab \sin \alpha$$

$$3 = \frac{1}{2} \times 2 \times 6 \sin \alpha \rightarrow \sin \alpha = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

در مثلث $0 < \alpha < 180^\circ$ است. بنابراین با توجه به

$$\sin \alpha = \frac{1}{2} \text{ داریم: } \alpha = 30^\circ, \alpha = 150^\circ$$

یعنی دو مثلث با این خاصیت ها می توان ساخت.

(مثال ص ۴۷)

یک بازیکن هندبال توپ را با سرعت 16 m/s برای هم تیمیخود که در $12/8$ متری او قرار دارد پرتاب می کند. اگر رابطهبین سرعت توپ v (برحسب متر بر ثانیه)، مسافت طی شدهافقی d (برحسب متر) و زاویه پرتاب θ به صورت زیر باشد، آنگاه

زاویه پرتاب توپ چقدر بوده است؟

$$d = \frac{v^2 \sin 2\theta}{10}$$

✓ حل:

$$12/8 = \frac{(16)^2 \sin 2\theta}{10}$$

$$\sin 2\theta = \frac{12/8 \times 10}{256} \rightarrow \sin 2\theta = \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} 2\theta = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \rightarrow \theta = k\pi + \frac{\pi}{12} \\ 2\theta = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6} \rightarrow \theta = \frac{k\pi + \pi}{2} - \frac{\pi}{12} \end{cases}$$

✓ نکته: اگر کسینوس منفی بود باید زاویه مربوط به مقدار مثبت را از π کم کنیم مثل:

$$\cos x = -\frac{1}{2} \rightarrow \cos x = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) \rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}$$

معادله $\cos x (2\cos x - 9) = 5$ را حل کنید.

✓ حل:

$$\cos x (2\cos x - 9) = 5 \rightarrow$$

$$2\cos^2 x - 9\cos x - 5 = 0$$

$$\xrightarrow{\cos x = t} 2t^2 - 9t - 5 = 0$$

$$\xrightarrow{\Delta = 121} \begin{cases} t = 5 \\ t = -\frac{1}{2} \end{cases} \xrightarrow{t = \cos x}$$

$$\begin{cases} \cos x = -\frac{1}{2} \rightarrow \cos x = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) \rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \\ \cos x = 5 \rightarrow \end{cases}$$

غیر قابل قبول. زیرا باید $(-1 \leq a \leq 1)$

(تمرین ۳ (ب) ص ۴۸)

ب) معادله $\cos 2x - \cos x + 1 = 0$ را حل کنید.

✓ حل:

$$\cos 2x - \cos x + 1 = 0 \xrightarrow{\cos 2x = 2\cos^2 x - 1}$$

$$2\cos^2 x - 1 - \cos x + 1 = 0 \rightarrow$$


$$2\cos^2 x - \cos x = 0 \xrightarrow{\text{فاکتور}} \cos x (2\cos x - 1) = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \xrightarrow{\text{حالت خاص}} x = k\pi + \frac{\pi}{2} \\ 2\cos x - 1 = 0 \rightarrow \cos x = \frac{1}{2} \rightarrow \\ \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

* اگر دو کسینوس با هم برابر شوند، می توانیم جواب های کلی معادله را بنویسیم و لازم نیست برای کسینوس حتما یک عدد مشخصی به دست آید

* اگر معادله به صورت $\cos x = a$ باشد:

(۱) این معادله وقتی جواب دارد که $(-1 \leq a \leq 1)$ باشد



$$\cos x = a \rightarrow \cos x = \cos \alpha \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \alpha \\ x = 2k\pi - \alpha \end{cases}$$

(۲) حالت های خاص:

$\cos x = 0 \rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2}$	
$\cos x = 1 \rightarrow x = 2k\pi$	
$\cos x = -1 \rightarrow x = 2k\pi + \pi$	

(مثال ص ۴۶ و ۴۸)

معادله $\cos x = \frac{1}{2}$ را حل کنید. کدام جوابها در بازه

$[-3\pi, \pi]$ می باشند.

✓ حل:

$$\cos x = \frac{1}{2} \rightarrow \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

به k اعداد صحیح می دهیم و جواب ها در بازه $[-3\pi, \pi]$ را

می یابیم. طبق جدول جوابها برابر است با: $2\pi \pm \frac{\pi}{3}$ و $\pm \frac{\pi}{3}$

k	-۲	-۱	۰	۱
	x	✓	✓	x
$2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$	$-4\pi \pm \frac{\pi}{3}$	$-2\pi \pm \frac{\pi}{3}$	$\pm \frac{\pi}{3}$	$2\pi \pm \frac{\pi}{3}$

(مثال ص ۴۷)

معادله $\sin x \cos x = \frac{\sqrt{3}}{4}$ را حل کنید.

✓ حل: دو طرف در ۲ ضرب می شود:

$$2 \sin x \cos x = 2 \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \sin 2x = \sin \frac{\pi}{3}$$

$$\begin{cases} 2x = 2k\pi + \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{6} \\ 2x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = \frac{2k\pi + \pi}{2} - \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

* در حل معادلات مثلثاتی میتوانیم از زوایای متمم کمک بگیریم

و دو طرف را به یک نسبت تبدیل کنیم

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

(تمرین ۳ (ج) ص ۴۸)

(ج) معادله $\sin x - \cos 2x = 0$ را حل کنید.

✓ حل:

$$\sin x = \cos 2x \xrightarrow{\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos 2x \rightarrow 2x = 2k\pi \pm \left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$\begin{cases} 2x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} - x \rightarrow x = \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \\ 2x = 2k\pi - \frac{\pi}{2} + x \rightarrow x = 2k\pi - \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

(تمرین ۳ (پ) ص ۴۸)

(پ) معادله $\cos x = \cos 2x$ را حل کنید.

✓ حل:

$$\cos x = \cos 2x \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + 2x \rightarrow x = -2k\pi \\ x = 2k\pi - 2x \rightarrow x = \frac{2k\pi}{3} \end{cases}$$

* در حل معادلات مثلثاتی باید نسبتها را به یک نسبت تبدیل کنیم

(تمرین ۳ (ت و ث) ص ۴۸)

(ت) معادله $\cos 2x - 3 \sin x + 1 = 0$ را حل کنید.(ث) معادله $\cos^2 x - \sin x = \frac{1}{4}$ را حل کنید.