

ریاضی

ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی
برای دانش آموزان دوره متوسطه ۲

ISSN: 1735-4951



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی



دوره بیست و پنجم

شماره ۹۱

بهمن ۱۳۹۴

۴۸ صفحه

۱۰۰۰۰ ریال



سالگرد دهه فجر
انقلاب اسلامی



دانلود از سایت ریاضی سرا

www.riazisara.ir

پیامک: ۳۰۰۰۸۹۹۵۰۰۰۶

www.roshdmag.ir



■ کاربرد لگاریتم در حل مسائل شیمی
■ ساده ترین اثبات قتیبة فیثاغورس!
■ روشی برای محاسبه سینوس پای تخته

■ مصاحبه با استاد جعفر نیوشا
معلم پیشکسوت درس هندسه

دانلود از سایت ریاضی سرا
www.riazisara.ir



موسی نثری همدانی

(۱۲۶۰-۱۳۳۲)

ریاضی دانان
معاصر
ایران

موسی دستجردی، فرزند ملا عبدالله معروف به موسی نثری در سال ۱۲۶۰ شمسی در روستای دستجرد کبودرآهنگ همدان متولد شد. تحصیلات مقدماتی را نزد پدرش آموخت و در جوانی به همدان آمد. وی ضمن اشتغال به معلمی، به تحصیل علوم ریاضی، فلسفه، منطق و عرفان پرداخت و در این علوم به کمال رسید. نثری که چندین سال ریاست «دبیرستان نصرت» را در همدان به عهده داشت، بعدها به ریاست فرهنگ کرمانشاه، کردستان، همدان و قزوین منصوب شد و مدارس زیادی را در این مناطق تأسیس کرد. وی سپس به تهران رفت و بازرس عالی وزارت فرهنگ شد. موسی نثری علاوه بر ریاضیات در ادبیات و تاریخ نیز تبحر فراوانی داشت. روزگاری مدیر «روزنامه اتحاد» بود و مقالات متعدد سیاسی و اجتماعی را در این روزنامه به چاپ رساند. همچنین چند سال قبل از شروع سده ۱۳۰۰، یعنی در سال ۱۲۹۷ رمانی تاریخی با عنوان «عشق و سلطنت» نوشت و منتشر کرد که داستانی تاریخی و مستند از زندگی کورش، مؤسس سلسله هخامنشی بود و شاید بتوان آن را از نخستین رمان‌های زبان فارسی دانست. وی همچنین در سال ۱۳۲۴ ترجمه‌ای از «قرآن مجید» را به زبان فارسی روان آغاز کرد که بخش‌هایی از آن منتشر شد و در سال ۱۳۲۶ به نثر درآوردن «مثنوی» مولوی را آغاز کرد که در اواخر عمر شریفش آن را در شش مجلد به پایان رساند.

کارهای او در ریاضیات در زمان خودش کم‌نظیر بوده‌اند. از جمله آن‌هاست کتاب «قوانین نثری در حل معادلات درجه سوم» که در سال ۱۳۱۱ به چاپ رسید و گویا برای آکادمی علوم فرانسه نیز ارسال شده بود. «قواعد نثری در جبر و مثلثات» نام کتاب دیگر اوست. همچنین اختراعاتی هم داشت که از آن جمله می‌توان به ساخت ساعت آفتابی و نصب آن در مسجد جامع همدان و اختراع نوعی بیضی‌نگار در فروردین ۱۳۳۱ شمسی اشاره کرد.

این استاد فرزانه در دوم شهریورماه ۱۳۳۲ در سن ۷۲ سالگی بدروود حیات گفت و در این بابویه شهرری آرام گرفت. زنده‌یاد موسی نثری معدود غزلیاتی هم داشت که با یکی از آن‌ها این بخش را با درود به روان پاکش به پایان می‌بریم:

کنون کمتر ز اطفال دبستان نیستیم، هستیم
شادمان است که شاگرد دبستان تو شد
گرچه در مجمع دانشکده‌ها استادم

معلم بوده‌ام عمری، ولی در مکتب عشق
آنکه استادی دانشکده‌ها عارش بود
دانش‌آموز دبستان غم عشق توام





ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی
برای دانش آموزان دوره متوسطه ۲

رشد

- دوره بیست و پنجم
- شماره پی در پی ۹۱
- بهمن ۱۳۹۴
- شماره ۵
- ۴۸ صفحه
- ۱۰۰۰۰ ریال

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

مدیر مسئول: محمد ناصری
سر دبیر: حمیدرضا امیری
مدیر داخلی: هوشنگ شرقی
ویراستار ادبی: بهروز راستانی
طراح گرافیک: شاهرخ خره غانی
تصویرگر: میثم موسوی
هیئت تحریریه:
محمد هاشم رستمی،
دکتر ابراهیم ریحانی،
احمد قندهاری،
میرشهرام صدر،
هوشنگ شرقی،
سید محمدرضا هاشمی موسوی،
غلامرضا یاسی پور،
دکتر محرم نژاد ایردموسی،
محمدعلی قربانی،
حسین کریمی،
محمود داورزنی،
احسان یارمحمدی
وبگاه:
www.roshdmag.ir
پیامنگار:
Borhanmotevaseteh2@roshdmag.ir
نشانی وبلاگ مجله:
http://weblog.roshdmag.ir/borhan-
motevasete2
پیام گیر نشریات رشد:
۰۲۱ - ۸۸۳۰۱۴۸۲
پیامک:
۳۰۰۰۸۹۹۵۰۶
نشانی دفتر مجله:
roshdmag: 
تهران، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵/۶۵۸۵
تلفن دفتر مجله:
۰۲۱ - ۸۸۳۰۵۸۶۲
تلفن امور مشترکین:
۰۲۱ - ۷۷۳۳۶۶۵۵
شمارگان:
۱۲۰۰۰ نسخه
چاپ:
شرکت افست (سهامی عام)

حرف اول / تجزیه و تحلیل و عملکرد خوب / سردبیر ۲

- آموزشی / مشتق گیری ضمنی از روابطی که تابع نیستند / سیمین افروزان ۳**
کاربرد لگاریتم در حل مسائل شیمی / حسین میرزایی، سیدمحمد حسینی ۶
ساده ترین اثبات قضیه فیثاغورس! / غلامرضا یاسی پور ۱۱
دیگر نگران رسم نمودارهای ریاضی در Word نباشید / محمد مهدوی ۱۴
آموزش ترجمه متون ریاضی / حمیدرضا امیری ۱۷
ریاضیات در چند دقیقه / غلامرضا یاسی پور ۲۴
پای تخته / دکتر محرم نژاد ایردموسی ۲۶
قضیه تقسیم / محمود داورزنی ۳۰
از روابط طولی در دایره ها بیشتر بدانیم / هوشنگ شرقی ۳۲
هندسه ۱ - کاربردی از تشابه در واسطه های هندسی و توافقی / حسین کریمی ۳۶
روشی برای محاسبه سینوس / سعدالله قصابی ۴۰
ریاضیات در سینمای جهان / آدای احترام به اوایلر / احسان یارمحمدی ۸
ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی / ایستگاه اول: بازی و ریاضی (معماهای لایبرنت) / هوشنگ شرقی ۱۲
ایستگاه دوم: چند معمای زیبا از جزیره پرسشگران! / ۲۹
ایستگاه سوم: لطیفه های ریاضی ۳۹
گفت و گو / مصاحبه با استاد جعفر نیوشا، معلم پیشکسوت درس هندسه ۱۸
معرفی کتاب / علم در عمل / غلامرضا یاسی پور ۲۲
مسائل برای حل / آمادگی برای آزمون های مستمر ۴۲
پرسش های پیکار جو! / ۱۱-۲۳-۳۵-۳۸-۴۴
پاسخ ها / راهنمای حل مسائل، آمادگی برای آزمون های مستمر / ۴۵
پاسخ معماهای ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی ۴۷
پاسخ پرسش های پیکار جو! / ۴۸

مجله رشد برهان متوسطه ۲، از همه دبیران ریاضی و دانش آموزان عزیز، در این زمینه ها دعوت به همکاری می کند:
○ نگارش مقاله های کمک درسی (شرح و بسط و رفع مشکلات کتاب های ریاضی دوره متوسطه ۲)
○ طرح مسائل کلیدی به همراه حل آن ها برای دانش آموزان ○ طرح مسائل مسابقه ای به همراه حل آن ها برای دانش آموزان
○ طرح معماهای ریاضی ○ نگارش یا ترجمه مقاله های عمومی ریاضی مانند تاریخ ریاضیات، زندگی نامه علمی و اجتماعی ریاضی دانان، نکته های تازه و لطیف ریاضیات، آموزش رایانه، اخبار ریاضی مربوط به شهر یا مدرسه شما و ...

- مجله در حک، اصلاح، حذف و اضافه مقاله ها آزاد است. ● مقاله های دریافتی، باید خوانا و تا حد امکان، کوتاه باشد.
- مقاله های رسیده، مسترد نمی شود. ● استفاده از مطالب مجله در کتاب ها یا مجله های دیگر، با ذکر دقیق مأخذ مانعی ندارد.
- مقالاتی که از طریق پیام نگار مجله ارسال می نمایند به صورت فایل pdf ارسال کنید. ● در انتهای مقاله های ارسالی شماره تلفن تماس و نشانی پستی و نشانی الکترونیکی (E-mail) خود را حتما درج نمایید و در ابتدای مقاله نام و نام خانوادگی و نام شهرستان و سمت خود را قید فرمائید.

خوانندگان رشد برهان ۲:



شما می توانید قصه ها، شعرها، نقاشی ها و مطالب خود را به مرکز بررسی آثار مجلات رشد به نشانی زیر بفرستید:

✉ نشانی: تهران، صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۶۵۶۷

☎ تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۰۵۷۷۲

تجزیه و تحلیل عملکرد خوب

در آستانه آغاز نیمسال دوم هستیم. همیشه نیمسال دوم در هر سال تحصیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شما در این نیمسال که در نهایت به امتحانات پایان سال منتهی خواهد شد، با تجربه‌ای که کسب کرده‌اید و با توجه به شناختی که از خودتان و درس‌هایتان پیدا کرده‌اید، خیلی بهتر و شفاف‌تر می‌توانید به حرکت و راه خود ادامه دهید.

وقتی امتحانات مستمر برگزار می‌شدند، برای آزمون پایان نیمسال آماده می‌شدید و زمانی که در آزمون پایان نیمسال اول شرکت کردید، در هر درس و پس از اعلام نتیجه، به نقاط قوت و ضعف خود پی برده‌اید و الآن می‌دانید در کدام درس و کدام مبحث وضعیت خوبی دارید و در چه مباحثی نیاز دارید که مطالعه و تمرکز بیشتری داشته باشید.

توجه دارید که نیمسال دوم مشابه نیمه دوم بازی فوتبال است که مربیان با توجه به بازی بازیکنان در نیمه اول و شناختی که از تیم حریف به‌دست آورده‌اند، برای بازی در نیمه دوم راهبرد دقیق‌تر و شفاف‌تری را تعریف می‌کنند. شما در وضعیتی قرار گرفته‌اید که به وضوح می‌دانید در کدام مبحث از ریاضی عملکرد خوبی داشته‌اید و دلیل این عملکرد خوب را نیز می‌دانید و به راحتی می‌توانید این دلایل و موفقیت‌ها را به مباحث و درس‌های دیگر تعمیم دهید. کافی است با دقت بیشتری به نتایج امتحانات خود نگاه کنید و روش مطالعه و حضور در کلاس را برای هر درس در نیمسال اول تجزیه و تحلیل کنید!

مؤید و پیروز باشید
سردبیر



مشتق‌گیری ضمنی از روابطی که تابع نیستند

مقدمه

مقدمه ورود به حساب دیفرانسیل و انتگرال، تابع‌ها هستند که در کتاب حسابان به آن‌ها پرداخته شده است. شناسایی تابع‌ها مبحث مهمی در این کتاب است و در این زمینه سؤالات و تست‌های متنوعی طراحی شده‌اند. در کتاب‌های «حسابان» و «حساب دیفرانسیل و انتگرال»، روند کار برای رسیدن به یکی از اهداف درس چنین است: شناخت تابع‌ها، به دست آوردن حد تابع‌ها، محاسبه مشتق آن‌ها به عنوان نوع خاصی از حد و کاربرد مشتق در مسائل بهینه‌سازی تابع‌هایی که در مسائل مختلف اقتصاد، فیزیک، هندسه و غیره مطرح می‌شوند. بنابراین شناخت تابع‌های حقیقی یک متغیره که موضوع مباحث مذکور هستند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال روابطی در مبحث مشتق‌گیری ضمنی مطرح شده‌اند که هیچ کدام تابع نیستند. این درس سؤالات و ابهامات بسیاری را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند. چه‌طور از روابطی که تابع نیستند، مشتق می‌گیریم؟ برخی از این گونه روابط مانند دایره را نمی‌توان حتی در قسمتی از دامنه‌شان تابع در نظر گرفت. آیا همان‌طور که در کتاب دیفرانسیل ذکر شده است، می‌توانیم همواره در معادله داده شده y را به طور ضمنی تابع مشتق‌پذیری از x فرض کنیم و در هر نقطه دلخواه مشتق بگیریم؟ چرا بحث مشتق‌گیری ضمنی که نتیجه قاعده زنجیره‌ای است و تنها به این گونه رابطه‌ها اختصاص ندارد، در این مبحث مطرح شده است؟ چگونه و با چه مجوزی می‌توان از این رابطه‌ها مشتق گرفت؟

قاعده زنجیره‌ای و مشتق تابع‌های ضمنی

معادله یک تابع حقیقی به شکل $y=f(x)$ در صفحه xy ، معادله‌ای است که به‌طور صریح رابطه y را بر حسب متغیرش (x) بیان می‌کند. این معادله را می‌توان به شکل ضمنی $F(x, f(x))=F(x, y)=y-f(x)=0$ نیز بیان کرد. همچنین تابع‌هایی وجود دارند که نمی‌توان و یا به سختی می‌توان آن‌ها را به‌طور صریح بر حسب متغیر بیان کرد. برای به‌دست آوردن مشتق توابعی که به‌صورت ضمنی $F(x, y)=0$ بیان می‌شود، باید از طرفین تساوی مشتق بگیریم و برای مشتق ترکیبات y ، چون y تابعی از x است، از قاعده زنجیره‌ای استفاده کنیم.

$$(y^n)' = ny^{n-1}y', (\sin y)' = y' \cos y, \sin^n y = ny' \cos y \sin^{n-1} y, \left(\frac{1}{y}\right)' = -\frac{y'}{y^2}, \dots$$

مشتق‌گیری ضمنی از تابع‌های ضمنی مطلبی است که بهتر است به‌عنوان مثال‌هایی برای قاعده زنجیره‌ای در کتاب حسابان مطرح شود تا تکلیف مشتق تابع‌هایی که نمی‌توان و یا به سختی می‌توان y را بر حسب x نوشت، مشخص شود. از قاعده زنجیره‌ای می‌توان برای محاسبه

مشتق تمام معادلاتی که یک تابع را معرفی می‌کنند، استفاده کرد.

● **مثال ۱.** مشتق تابع $y-x^2=2x$ عبارت است از:

$$y' - 2x = 2 \rightarrow y' = 2x + 2$$

● **مثال ۲.** مشتق تابع $y^3 + y - 3x^2 = 0$ عبارت است از:

$$3y^2 y' + y' - 6x = 0 \rightarrow y'(3y^2 + 1) = 6x \rightarrow y' = \frac{6x}{3y^2 + 1}$$

● **مثال ۳.** مشتق تابع $xy + 5x^2 = 1$ عبارت است از:

$$y + xy' + 10x = 0 \rightarrow y' = -\frac{y + 10x}{x}$$

به‌عنوان مثالی برای کاربرد مشتق‌گیری ضمنی از توابع ضمنی، می‌توان به‌دست آوردن مشتق تابع وارون را ذکر کرد. اگر دو تابع f و g معکوس یکدیگر باشند، ترکیب آن‌ها در زیرمجموعه‌ای از دامنه g ، تابع همانی است:

$$f \circ g(x) = x \rightarrow g'(x)f'(g(x)) = 1$$

مشتق روابط ضمنی که تابع نیستند

رابطه ضمنی $F(x,y)=0$ همواره شامل یک تابع یک متغیره نیست که به طور غیر صریح تعریف شده است. برای مثال، رابطه $F(x,y)=x^2+y^2-4=0$ معادله دایره‌ای به مرکز مبدأ مختصات و شعاع ۲ است. این رابطه به هر x در دامنه $(-2 \leq x \leq 2)$ دو y ، $y = \pm\sqrt{4-x^2}$ را متناظر می‌کند. به‌طور کلی، معادله $F(x,y)=0$ منحنی مسطح در صفحه را مشخص می‌کند. هر چند این منحنی ممکن است تابع نباشد، ولی وجود مماس در نقاط هموار آن امری بدیهی و انکارناپذیر است و وجود مماس غیرعمودی به معنی مشتق‌پذیری در آن نقاط است. برای محاسبه شیب مماس در این نقاط لازم است مشتق تابع‌هایی را بیابیم که در این گونه روابط نهفته‌اند و وجود چنین مماس‌هایی را تضمین می‌کنند.

حالت خاص قضیه تابع ضمنی در کتاب‌های آنالیز دانشگاهی شرایطی را بیان می‌کند که تحت آن شرایط می‌توان رابطه $F(x,y)=0$ را به‌طور موضعی به صورت یک تابع یکتای مشتق‌پذیر توصیف کرد. چون ابزارهای لازم در دبیرستان برای بیان این قضیه وجود ندارد، به علت نیاز به مشتق‌گیری از این روابط، به‌خصوص در مبحث مقاطع مخروطی، لازم است به بیان شهودی این قضیه اکتفا کنیم تا به سؤالات و ابهامات به‌وجود آمده پاسخ بگوییم.

معادله دایره $F(x,y)=x^2+y^2-4=0$ را در نظر بگیرید. این معادله، یک تابع نیست و حتی اگر محدوده خاصی برای x در دامنه $D=\{x \in \mathbb{R} | -2 \leq x \leq 2\}$ - در نظر بگیریم، y های متناظر، تابعی از x نخواهند بود. دایره منحنی مسطح همواری است که در هر نقطه دلخواه آن می‌توان یک خط مماس رسم کرد. دایره در تمام نقاطش غیر از دو نقطه از آن که خط مماس موازی محور y ها است، مشتق‌پذیر است.

تغییر نگرش و نگاه موضعی به رابطه دایره

وقتی به دایره $F(x,y)=x^2+y^2-4=0$ به‌عنوان رابطه‌ای برحسب متغیر x نگاه کنیم، $y^2=4-x^2$ که $D=\{x \in \mathbb{R} | -2 \leq x \leq 2\}$ ، حتی در زیر مجموعه‌ای از دامنه، یک تابع نخواهیم داشت. اگر بخواهیم از مشتق‌پذیری و شیب مماس در یک نقطه از دایره صحبت کنیم، باید معادله دایره را به‌صورت یک رابطه دو متغیره ببینیم. در

$$\rightarrow g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} (*)$$

بنابراین، به‌عنوان مثال، مشتق تابع نمایی طبیعی را می‌توان پس از محاسبه مشتق تابع لگاریتم طبیعی با استفاده از تعریف مشتق، به کمک فرمول $(*)$ به‌دست آورد. اگر: $f(x)=\ln x$ و $g(x)=e^x$ ، در این صورت:

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} \xrightarrow{f'(x)=\frac{1}{x}} g'(x) = \frac{1}{\frac{1}{g(x)}} = g(x) = e^x$$


همچنین با استفاده مستقیم از قاعده زنجیره‌ای داریم:

$$(y = e^x)' = ? \xrightarrow{y=e^x \Leftrightarrow x=\ln y} (x = \ln y)' = ? \\ \rightarrow 1 = \frac{y'}{y} \rightarrow y' = y = e^x$$


یا برعکس، با استفاده از تعریف مشتق، ابتدا می‌توان مشتق تابع نمایی طبیعی را به‌دست آورد و سپس به کمک فرمول $(*)$ مشتق تابع لگاریتمی طبیعی را محاسبه کرد. همچنین، بدون استفاده از فرمول مذکور با مشتق‌گیری ضمنی داریم:

$$(y = \ln x)' = ? \xrightarrow{y=\ln x \Leftrightarrow x=e^y} (x = e^y)' = ? \\ \rightarrow 1 = y'e^y \rightarrow y' = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}$$






اما حول بقیه نقاط دامنه، مانند نقطه $(\frac{4}{3}, \frac{8}{3})$ ، متضمن یک تابع یکتای مشتق پذیر است.




● **مثال ۳.** فرض کنید: $F(x,y)=x^2-y^3=0$.



این معادله به عنوان یک رابطه یک متغیره بر حسب x معادله یک تابع است و همچنین به عنوان یک رابطه دو متغیره در مجاورت هر نقطه دلخواه در دامنه، یک تابع یکتا را توصیف می کند، اما در مبدأ مشتق پذیر نیست. توابعی که در برخی از نقاط دامنه شان مشتق پذیر نیستند، اگر به صورت ضمنی بیان شوند، مثال های نقض دیگری بر این مطلب هستند که: «همواره معادله داده شده y را به طور ضمنی بر حسب تابعی مشتق پذیر از x تعریف می کند.» (کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال سال چهارم، مبحث مشتق گیری ضمنی).


این صورت، دامنه $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}|-2\leq x\leq 2, -2\leq y\leq 2\}$ خواهد بود. با محدود کردن دامنه حول یک نقطه از آن می توان به طور موضعی از رابطه دایره به تابعی از x رسید. در واقع، هم x و هم y را محدود می کنیم تا قسمتی از دایره را به عنوان یک تابع یک متغیره در مجاورت یک نقطه معرفی کنیم.



به طور کلی، معادله دو متغیره $F(x,y)=0$ معادله یک منحنی مسطح است و وجود مماس در نقطه هموار (x,y) از دامنه آن ایجاب می کند که بخش مناسبی از منحنی را که حول نقطه مذکور قرار دارد، به عنوان تابعی از x (یا y) جدا کنیم و نگاهی موضعی به معادله داشته باشیم.

لازم به ذکر است که بر خلاف آنچه در کتاب «حساب دیفرانسیل و انتگرال» سال چهارم ذکر شده است، در معادلات ضمنی همواره نمی توانیم در معادله داده شده y را به طور ضمنی تابع مشتق پذیری از x فرض کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

● **مثال ۱.** معادله $x^2+y^2-4=0$ در مجاورت نقطه $(2,0)$ حاوی یک تابع یکتای مشتق پذیر نیست.



● **مثال ۲.** یک جواب معادله $x^3+y^3-6xy=0$ ، $(0,0)$ (منحنی برگی دکارت) است. این رابطه در مجاورت مبدأ حاوی یک تابع یکتا نیست.

کاربرد لگاریتم در حل مسائل شیمی



حسین میرزایی،
دبیر ریاضی شهرستان
پلدختر



سید محمد حسینی،
دانشجوی دکترای شیمی
تجزیه و دبیر شیمی
شهرستان پلدختر

چکیده

اختراع لگاریتم در دنیا شگفتی کاملی بوده است. هیچ یک از کارهای پژوهشی قبلی به کشف لگاریتم کمک نکرده و یا ورود آن را پیش‌بینی نکرده بودند. لگاریتم بدون آنکه از کارهای دیگر اندیشمندان بهره گیرد، یا آنکه مسیرهای شناخته‌شده تفکر ریاضی را دنبال کند، به تنهایی افکار انسان را به صورت ناگهانی متوجه خود ساخت. برای لگاریتم کاربردهای فراوانی وجود دارد، اما باید گفت پرکاربردترین علمی که از لگاریتم استفاده می‌کند، شیمی تجزیه است.

کلیدواژه‌ها: لگاریتم، عرصه دانش، تفکر ریاضی، شیمی تجزیه

مقدمه

در این مقاله برای بیان چند کاربرد لگاریتم در شیمی به تشریح توابعی مانند pH و pK_a و مسائل مربوط به آن خواهیم پرداخت. در سؤالات مربوط به توابع مذکور، مانند گذشته مقادیر لگاریتم‌هایی که روند نیستند، در اختیار دانش‌آموزان قرار نمی‌گیرند و آن‌ها در درس‌های ریاضیات اصول محاسبات را می‌آموزند. از دانش‌آموزان انتظار می‌رود که بتوانند به خوبی عمل لگاریتم‌گیری را انجام دهند.

pH معیاری برای تعیین میزان اسیدی یا قلیایی بودن یک محلول است که برای محاسبه آن از این رابطه لگاریتمی استفاده می‌شود: $pH = -\log_{10} [H_3O^+]$ به عبارت دیگر، برای محاسبه pH باید از غلظت مولی یون هیدرونیوم لگاریتم گرفته شود.

با توجه به اینکه pH در دمای $25^\circ C$ در گستره ۰ تا ۱۴ تغییر می‌کند، پس محدوده غلظتی یون هیدرونیوم از 10^{-14} تا 10^{-1} مولار متغیر است. اگر به گستره غلظتی یون هیدرونیوم و اعداد بسیار کوچک آن دقت کنیم، به خوبی ارزش فرایند لگاریتم‌گیری را برای محدود کردن این گستره غلظتی وسیع درک خواهیم کرد.

بی‌شک محاسبه لگاریتمی بسیاری از اعداد، بدون ماشین حساب برای ما مقدور نیست. لیکن در سؤالات مربوط به توابع لگاریتمی در درس شیمی، سؤالات به گونه‌ای طراحی می‌شوند که با دانستن لگاریتم دو عدد ۲ و ۳ ($\log_{10} 2 \approx 0.3$ و $\log_{10} 3 \approx 0.47$) و با استفاده از قواعد

شاید برای بیان ارزش علم ریاضیات اشاره به جمله به یادماندنی **لئوناردو داوینچی** خالی از لطف نباشد: «هیچ دانسته بشری را نمی‌توان علم نامید، مگر اینکه از طریق ریاضیات توضیح داده و اثبات شود.»

با کشف نظریه‌های ریاضی آن‌ها هستی پیدا می‌کنند، اما دیر یا زود کاربرد خود را در زندگی و سایر دانش‌ها می‌یابند. شاید در حدود چهار قرن پیش کسی فکر نمی‌کرد لگاریتم که در رابطه با نیاز محاسبات علمی کشف شده است، در آینده کاربردهای وسیعی پیدا کند؛ به‌طوری‌که **لاپلاس** گفته است: «لگاریتم طول زندگی اخترشناسان را چند برابر و طول محاسبات را کم کرده است.»

لگاریتم از واژه یونانی «لوگوس» به معنای «نسبت» و «آرتیوس» به معنای «عدد» گرفته شده است. بی‌تردید هیچ علمی به اندازه شیمی تجزیه از لگاریتم استفاده نمی‌کند، زیرا در این علم به کرات با عمل لگاریتم‌گیری مواجه می‌شویم. از جمله می‌توان به استفاده از لگاریتم در اندازه‌گیری pH، pK_a ، pK_b و p_c (غلظت گونه) و غیره اشاره کرد.

فرایند لگاریتم‌گیری درک و تجزیه و تحلیل اعداد و رسم نمودارهای آماری را آسان‌تر می‌کند و باعث می‌شود که کار با اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچک، محدودتر و قابل دسترس‌تر شود.

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log_1 5 \times 10^{-2} = -(\log_1 5 + \log_1 10^{-2}) \\ &= -(\log_1 \frac{10}{2} + \log_1 10^{-2}) \\ &= -(\log_1 10 - \log_1 2 - 2\log_1 10) \\ &= -(1 - 0.3 - 2) = -(-1.3) = 1.3 \end{aligned}$$

● **مثال ۳.** pH یک محلول اسید HCl برابر ۲/۷ است. غلظت یون هیدرونیوم را در این محلول به دست آورید.
پاسخ: طبق رابطه لگاریتمی داریم: $[H_3O^+] = 10^{-\text{pH}}$
 و می توان نوشت: $[H_3O^+] = 10^{-2.7}$

ظاهر این عدد به گونه ای است که ممکن است تصور شود فقط با ماشین حساب قابل محاسبه است، حال آنکه با دانستن لگاریتم عدد ۲ و یک قاعده لگاریتمی می توان آن را بدون ماشین حساب به دست آورد.

قاعده لگاریتمی: $10^{\log_1 a}$ برابر با عدد a است.

بنابراین به جای عدد ۲/۷- ما عبارت جایگزین $(-3 + 0.3)$ را می نویسیم:

$$\begin{aligned} [H_3O^+] &= 10^{-2.7} = 10^{-(3+0.3)} = (10^{-3}) \times (10^{-0.3}) \\ &= (10^{-3}) \times 10^{\log_1 2} = 10^{-3} \times 2 = 0.002 \text{ M} \end{aligned}$$

● **مثال ۴.** در یک محلول بافری با $\text{pH} = 3.76$ و $\text{pK}_a = 4.76$ ، غلظت A^- در محلول چند برابر غلظت اسید HA است؟

پاسخ: برای محاسبه pH یک محلول بافر داریم:

$$\begin{aligned} \text{pH} &= \text{pK}_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]} \\ 3.76 &= 4.76 + \log_1 \frac{[A^-]}{[HA]} \rightarrow -1 = \log_1 \frac{[A^-]}{[HA]} \end{aligned}$$

اگر نسبت $\frac{[A^-]}{[HA]}$ را برابر X در نظر بگیریم، داریم:
 $-1 = \log_1 x \rightarrow x = 10^{-1} = \frac{1}{10} \rightarrow x = \frac{[A^-]}{[HA]} = \frac{1}{10}$
 یعنی $[A^-]$ برابر $\frac{1}{10}$ غلظت اسید HA است.

نتیجه گیری

لگاریتم می تواند درک و تفسیر داده ها را در شیمی آسان تر کند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در آموزش ریاضیات دبیرستان تأکید زیادی روی یادگیری اصول و قواعد آن شده است، با کاربرد این اصول و قواعد در علوم شیمی و فیزیک دوره متوسطه، درک و یادگیری آن ها برای دانش آموزان جذاب تر می شود و به نوعی درمی یابند که ریاضیات در توسعه علوم گوناگون نقشی حیاتی و کلیدی دارد.



لگاریتم گیری محاسبات به سادگی انجام می گیرند.

از طرف دیگر، طبق قاعده لگاریتمی: $\log_1 x = a$ ، می توان برای محاسبه تابع x نوشت: $x = 10^a$.

لذا با داشتن pH برای محاسبه غلظت مولی یون هیدرونیوم می توان بیان کرد: $[H_3O^+] = 10^{-\text{pH}}$.

برای درک بهتر موضوع به بررسی و حل چند مسئله می پردازیم:

● **مثال ۱.** غلظت یون هیدرونیوم در یک محلول حاوی اسید HCl برابر $2 \times 10^{-3} \text{ M}$ است. pH این محلول را به دست آورید؟

پاسخ: در این مسئله با توجه به اینکه غلظت یون هیدرونیوم به صورت عدد 2×10^{-3} آمده است و بین دو عدد ۲ و 10^{-3} علامت ضرب قرار دارد، طبق قواعد لگاریتم گیری (در لگاریتم، جمع به ضرب تبدیل می شود) می توان نوشت:

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log 2 \times 10^{-3} = -(\log_1 2 + \log_1 10^{-3}) \\ &\text{طبق نکته گفته شده، می دانیم که لگاریتم عدد ۲ برابر با } 0.3 \text{ و همچنین لگاریتم } 10^{-3} \text{ برابر } (-3) \text{ است.} \end{aligned}$$

$$\text{پس: } \text{pH} = -\left(\frac{3}{10} - 3\right) = -\left(-\frac{27}{10}\right) = 2.7$$

● **مثال ۲.** غلظت یون هیدرونیوم در محلول اسید HBr برابر 5×10^{-2} است. pH این محلول را بیابید.

پاسخ: برای محاسبه لگاریتم عدد ۵ می توان آن را به صورت $\log_1 \frac{10}{2}$ نوشت:

طبق قواعد لگاریتم (در لگاریتم، تقسیم به تفریق تبدیل می شود) داریم:

لگاریتم از واژه یونانی «لوگوس» به معنای «نسبت» و «ارتیوس» به معنای «عدد» گرفته شده است

* منابع

۱. دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی (۱۳۹۱). شیمی ۳ و آزمایشگاه.
۲. مصحفی، عبدالحسین (۱۳۹۰). تصاعد و لگاریتم. انتشارات فاطمی. تهران. چاپ چهاردهم.
۳. مندلسون، الیوت (۱۳۷۴). مسائل اساسی ریاضی. ترجمه عادل ارشقی. تهران. نشر نی.
۴. شهریار، پرویز (۱۳۸۵). تاریخ ریاضیات. انتشارات فاطمی. تهران.

اولر به ادای احترام

■ نام فیلم: ادای احترام به اولر^۱ ■ براساس سخنرانی ویلیام دانهم در مرکز علوم دانشگاه هاروارد^۲
■ تحت حمایت و نظارت: مرکز مؤسسه ریاضیات کلی^۳ ■ مدت فیلم: ۵۵ دقیقه

- Dunham, William (1990). Journey Through Genius: The Great Theorems of Mathematics (1st ed.). John Wiley and Sons. ISBN 0-471-50030-5.
- Dunham, William (1994). The Mathematical Universe (1st ed.). John Wiley and Sons. ISBN 0-471-53656-3.
- Dunham, William (1999). Euler: The Master of Us All (1st ed.). Mathematical Association of America. ISBN 0-88385-328-0.
- Dunham, William (2007). "Euler and the Fundamental Theorem of Algebra" in The Genius of Euler: Reflections on his Life and Work. Mathematical Association of America. ISBN 0-88385-558-5.
- Dunham, William (2008). The Calculus Gallery (1st ed.). Princeton University Press. ISBN 0-691-13626-2.
- Dunham, William (2010). Great Thinkers, Great Theorems (Video Lecture Series). The Teaching Company. ISBN 159803690-4.

در ابتدای این فیلم ویدیویی، به نقل از ویلیام دانهم به تفصیل می‌شنویم و می‌بینیم که لئونارد اولر:


- در سال ۱۷۰۷ در بازل چشم به جهان گشود.
- در سال ۱۷۲۰ به مطالعه با یوهان برنولی^{۱۴} پرداخت.
- در سال ۱۷۲۷ از دانشگاه بازل فارغ التحصیل شد.
- در سال ۱۷۲۷ به «آکادمی علوم

ویلیام وید دانهم^۴ ریاضیدانی آمریکایی است که مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۹۶۹ از «دانشگاه پیتزبورگ»^۵ و مدارک کارشناسی ارشد و دکترای خود را به ترتیب در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۴ از دانشگاه ایالتی آهایو^۶ دریافت کرده است. اساساً موضوع اصلی تحقیقات ویلیام دانهم، «توپولوژی»^۷ بوده است، اما وی بعد از مدتی به «تاریخ ریاضیات»^۸ و به‌ویژه کارها و دستاوردهای ریاضی‌دان برجسته سوئیسی، لئونارد اولر^۹ (۱۷۸۳-۱۷۰۷) علاقه‌مند شد و توانست در این زمینه کتاب‌های ارزنده‌ای را به جامعه جهانی ریاضیات عرضه کند. او چند جایزه ارزنده ریاضی، مانند «جایزه جورج پولیا»^{۱۰} (۱۹۹۲)، «جایزه ترور ایونس»^{۱۱} (۱۹۹۷)، «جایزه لستر آر.فورد»^{۱۲} (۲۰۰۶) و «پاداش یک‌نباخ»^{۱۳} (۲۰۰۸) را در زمینه تألیف و تدریس تاریخ ریاضیات از آن خود کرد.

در صحنه‌های نخستین فیلم ویدیویی ادای احترام به اولر، صحنه‌ای وجود دارد که به معرفی آثار ویلیام دانهم می‌پردازد. بنابراین در ادامه نام و مشخصات آثار او را به زبان انگلیسی تقدیم می‌کنیم تا علاقه‌مندان به پژوهش در زمینه تاریخ ریاضیات، به منابع جدید و ارزنده‌ای دسترسی داشته باشند و نیز مترجمان زبردست و علاقه‌مند نیز با آگاهی از این کتاب‌ها دست به ترجمه آن‌ها بزنند تا جامعه ریاضیات ایران نیز از این آثار بهره‌مند شوند:

دستور چندوجهی اویلر (۱۷۵۲)

$$V + F = E + 2$$



V = تعداد رأس‌ها

F = تعداد وجه‌ها

E = تعداد یال‌ها



چاپ رسیدند. در ضمن اگر بخواهیم او را با ریاضی‌دانان برجسته دیگری مانند کارل فردریش گاوس^{۱۷} و اگوستین لوئی کوشی^{۱۸} که برای وارد کردن نمادها و عبارت‌های ریاضی جزو سرامدان هستند، مقایسه کنیم، باز هم لئونارد اویلر با ارائه ۹۶ نماد و عبارت، در مقابل ۷۰ نماد و عبارت گاوس و نیز ۳۳ نماد و عبارت ریاضی کوشی در مقام نخست قرار دارد!

در ادامه این فیلم به چند دستاورد برجسته لئونارد اویلر در آن روزگار پرداخته می‌شود که از این قرارند:

• عدد e (۱۷۴۸):

$$1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{1 \times 2 \times 3 \times 4} + \dots \approx 2.718281828459045$$

• اتحاد اویلر (۱۷۴۸):

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad \text{و} \quad i = \sqrt{-1}$$

• رابطه چندوجهی اویلر (۱۷۵۲):

در هر چندوجهی محدب با تعداد رأس‌های $|V|$ ، تعداد یال‌های $|E|$ و تعداد وجه‌های $|F|$ همواره رابطه زیر برقرار است:

$$|V| + |F| = |E| + 2$$

• مسئله بازل:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right)$$

مسئله بازل نخستین‌بار در سال ۱۶۴۴ توسط

سن‌پترزبورگ^{۱۵} رفت.

• در سال ۱۷۴۱ به آکادمی علوم برلین رفت.

• در سال ۱۷۶۶ مجدداً به آکادمی علوم

سن‌پترزبورگ برگشت.

• در سال ۱۷۸۳ چشم از جهان فرو بست.

در این فیلم خواهید دید که لئونارد اویلر دارای زندگی شخصی و علمی بسیار عجیب و متفاوتی نسبت به سایر دانشمندان و ریاضی‌دانان بوده است. برای مثال، او با کاترینا سل^{۱۶} ازدواج می‌کند و این دو صاحب ۱۳ فرزند می‌شوند. در این بین، اویلر حتی با اینکه مشغله‌های کاری بسیار داشته است، اما برای تربیت فرزندان و بودن در کنار خانواده نیز وقت بسیاری صرف کرده است. در ضمن ملاحظه خواهید کرد که اویلر حافظه‌ای خارق‌العاده و از آن مهم‌تر پشتکار فراوانی داشته است. او گرچه در سال ۱۷۳۰ بینایی یکی از چشمانش و در سال ۱۷۷۱ بینایی چشم دیگرش را نیز از دست می‌دهد و به صورت کامل نابینا می‌شود، هیچ‌گاه از انجام پژوهش و کارهای علمی دست برنمی‌دارد.

لئونارد اویلر بین تمامی ریاضی‌دانان به‌عنوان پرکارترین ریاضی‌دان در موضوع‌های گوناگون ریاضی شناخته می‌شود، به گونه‌ای که مقالات و مطالب او، هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت، از جایگاه برجسته‌ای برخوردارند. برای مثال، مطالب ارائه شده توسط اویلر تا اندازه‌ای زیاد بودند که ۲۲۸ مقاله او بعد از مرگش به

در مورد دیگر دستاوردهای لئونارد اویلر، مانند خط اویلر، پی بردن به بیشتر از ۵۸ جفت از اعداد دوست (متحابه)، نمودار اویلر (نمودار ون) و افزاز اعداد نیز مطالب ارزنده‌ای ارائه می‌شوند که شما ریاضی‌آموزان را به مشاهده و ملاحظه این موارد هم تشویق می‌کنیم.

در ضمن در قسمتی از این فیلم ویدیویی یک مسئله جالب توجه در مورد تجزیه چندجمله‌ای‌ها وجود دارد که توسط نیکلاس برنولی^{۲۰} ارائه شده و از نظر وی غیرقابل تجزیه بوده، اما اویلر با مهارت تمام آن را تجزیه کرده است. بنابراین از آنجا که مبحث تجزیه یکی از موارد پراهمیت ریاضیات دوره آموزش متوسطه است، این مسئله را به همراه پاسخ آن در ادامه بیان می‌کنیم تا مورد استفاده ریاضی‌آموزان باشد.

$$x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 4x + 4 = [x^2 - (2 + \sqrt{4 + 2\sqrt{7}})x + (1 + \sqrt{4 + 2\sqrt{7}})][x^2 - (2 - \sqrt{4 + 2\sqrt{7}})x + (1 - \sqrt{4 + 2\sqrt{7}} + \sqrt{7})]$$

* پی‌نوشت‌ها


1. A Tribute to Euler
2. Harvard University
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دانشگاه به تارنمای آن به نشانی: <http://www.harvard.edu> مراجعه کنید.
3. Clay Mathematics institute
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این مؤسسه به تارنمای آن به نشانی: <http://www.claymath.org> مراجعه کنید.
4. William Wade Dunham
5. University of Pittsburgh
6. Ohio State
7. Topology
8. History of Mathematics
9. Leonhard Euler
10. George Polya Award
11. Trevor Evans Award
12. Lester R. Ford Award
13. Beckenbach Prize
14. Johann Bernolli
15. Saint Petersburg Academy of Sciences
16. Katharina Gsell
17. Carl Friedrich Gauss
18. Augustin-Louis Cauchy
19. Pietro Mengoli
20. Nicholas Bernolli



ریاضی‌دان ایتالیایی، پی‌ترو منگولی^{۱۹} (۱۶۲۶-۱۶۸۶) مطرح شد و لئونارد اویلر برای نخستین مرتبه در سال ۱۷۳۴ آن را حل کرد و با قرائت آن در سال ۱۷۳۵ در آکادمی علوم سن پترزبورگ، برای این مسئله راه‌حلی مستدل ارائه کرد.

* مسئله پل‌های کونیگسبرگ (۱۷۳۶):

در قرن هیجدهم میلادی شهر کونیگسبرگ از دو ساحل یک رودخانه و دو جزیره (داخل رودخانه) تشکیل شده بود. در آن زمان هفت پل این چهار منطقه را به هم وصل می‌کردند. این مسئله که: «آیا امکان دارد با آغاز از یکی از این مناطق در شهر گشتی زد، از هر پل یک بار و تنها یک بار گذشت، و به مکان نخست بازگشت؟» سال‌های زیادی ذهن اهالی شهر را متوجه خود ساخته بود.



لئونارد اویلر با حل این مسئله در سال ۱۷۳۶، شاخه نظریه گراف را در ریاضیات پایه‌ریزی کرد. البته در ادامه فیلم ویدیویی (ادای احترام به اویلر)



غلامرضا یاسی پور



ساده ترین اثبات قضیه فیثاغورس!

لژی قضیه بطلمیوس فیثاغورس

نتیجه: اگر $ABCD$ محاطی نباشد، داریم:
 $OC < OB + BC$ و در نتیجه: $xy < ac + bd$


یعنی در هر چهارضلعی غیرمحاطی حاصل ضرب دو قطر از مجموع حاصل ضرب های اضلاع مقابل آن کمتر است. و در نتیجه معلوم می شود که هرگاه در یک چهارضلعی رابطه $xy = ac + bd$ برقرار باشد، آن چهارضلعی محاطی است. (عکس قضیه بطلمیوس) زیرا اگر محاطی نباشد، باید داشته باشیم: $xy < ac + bd$ که خلاف فرض است.

حال با توجه به قضیه بطلمیوس درستی قضیه فیثاغورس واضح است. رابطه قضیه بطلمیوس را در مستطیل به ابعاد b و c و قطر a که یک چهارضلعی محاطی است، بنویسید!

نخست قضیه زیر را که به «قضیه بطلمیوس» معروف است، اثبات می کنیم:

صورت قضیه بطلمیوس: در هر چهارضلعی محاطی، حاصل ضرب دو قطر برابر است با مجموع حاصل ضرب اضلاع روبه روی آن. اثبات: اگر $ABCD$ چهارضلعی محاطی باشد، فرض می کنیم:

$AB=a$ و $BC=b$ و $CD=c$ و $DA=d$ و $AC=x$ و $BD=y$



از A خط m را طوری رسم می کنیم که قرینه ضلع AD نسبت به نیم سازه زاویه BAC باشد و BC را امتداد می دهیم تا m را در O قطع کند و زاویه OBA مساوی زاویه ADC می باشد (چرا؟) دو مثلث AOB و ACD متشابه اند و داریم:

$$AO:AC=AB:AD=OB:CD \quad (1)$$

همچنین، دو مثلث OAC و BAD متشابه اند، زیرا:
 $\angle OAC = \angle BAD$ و اضلاع این دو مثلث متناسب اند و در نتیجه:
 $OC:BD=AC:AD \quad (2)$

از روابط (1) و (2) داریم:

$$OB=ac: d \text{ و } OC=xy: d$$

با جایگذاری این مقادیر در رابطه $OC=OB+BC$

نتیجه می شود:

$$xy=ac+bd$$


* پی نوشت
۱. کتاب قضایا و مسائل
هندسه، غلامرضا
یاسی پور، ۱۳۴۸.

پرسش های پیکار جو!




مثلی با اضلاع به طول های ۱۰ و ۸ و ۴ واحد را حول کوچک ترین ضلع آن دوران می دهیم. حجم حاصل چه قدر است؟

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| الف) 66π | ب) 77π | ج) 72π |
| د) $\frac{101\pi}{3}$ | ه) $\frac{233\pi}{4}$ | |



خانه‌هایی از جدول که در آن‌ها دایره‌ها قرار دارند، خانه‌های خالی هستند. اما عددهای درون آن‌ها چه می‌گویند؟ بله، این عددها سرخ‌های حل معمایی ما هستند! در واقع هر یک از این عددها به ما می‌گویند که با حرکت از این خانه، به چهار طرف آن (بالا، پایین، چپ و راست) بدون واسطه، چند خانه خالی (غیر از خود آن خانه) وجود دارد. اما خانه‌های غیر خالی (پر) چه خانه‌هایی هستند؟ آن‌ها خانه‌هایی هستند که باید سیاه شوند و در واقع دیوارهای لایبرنت ما را می‌سازند و بدیهی است که با توجه به عددهای درون دایره‌ها می‌توان جای آن‌ها را پیدا کرد. بنابراین ما باید با توجه به این عددها، خانه‌های خالی را پیدا کنیم و آن‌ها را با علامت دایره (و یا علائم دیگر) مشخص کنیم و خانه‌های توپر را هم سیاه کنیم تا لایبرنت ما شکل بگیرد. مسیر ورود و خروج نیز به این ترتیب پیدا می‌شود و آن معمایی دیگر است! حالا به پاسخ معمایی فوق توجه کنید!



دوستان سلام! بیایید با «لایبرنت»‌ها شروع کنیم! احتمالاً با اصطلاح لایبرنت آشنایی دارید. لایبرنت که در زبان فارسی، گاهی به آن «هزار تو» گفته می‌شود، به مسیرهای تودرتوی مرتبط با هم گفته می‌شود که انسان‌ها در آن گم می‌شدند و برای خارج شدن از آن، باید معمایی آن را حل می‌کردند. لایبرنت‌ها تاریخ مفصلی دارند که علاقه‌مندان را به مطالعه آن تشویق می‌کنم!

اما امروزه از ایده لایبرنت‌ها برای طرح معماهایی برای تفریح و سرگرمی بسیار استفاده می‌شود. البته آنچه که ما در اینجا داریم، با همه آن‌هایی که تا به حال دیده‌اید متفاوت است! حل معمایی ما به ایجاد یک لایبرنت منجر می‌شود! به جای هر توضیحی، ترجیح می‌دهم که مستقیماً شما را به اصل مطلب ببرم. به جدول ۱ دقت کنید:



حتماً می‌پرسید ایده این کار و یافتن راه‌حل چه بوده است؟ کمی راهنمایی می‌کنم. به همان جدول ۱ برگردیم و این بار با دقت بیشتری آن را ببینیم:

	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	
A											A
B		۶		۴		۲			۲		B
C				۲				۲			C
D				۵	۶				۲		D
E		۴							۱		E
F			۳		۵						F
G				۴			۵				G

جدول ۳

عدد ۱ در خانه E۹ به ما چه می‌گوید؟ بله، فقط یک خانه خالی در اطراف این خانه هست، و آن همان خانه D۹ (خانه بالایی) است که در آن دایره‌ای با عدد ۳ قرار دارد (زیرا همان‌طور که گفتیم، این خانه‌ها که دایره عددی دارند، خانه خالی هستند). پس دو خانه E۸ و F۹ باید سیاه شوند. علاوه بر آن‌ها، خانه C۹ هم باید سیاه شود، زیرا در مسیر بالای خانه E۹ قرار دارد. به این ترتیب سه خانه سیاه را یافتیم. حالا به خانه B۹ دقت کنید! عدد ۳ درون آن نشان می‌دهد که سه خانه خالی در مجاورت آن وجود دارد. از سمت راست و بالا و پایین که راه بسته است! پس باید سه خانه سفید در سمت چپ آن باشد. آن‌ها را با دایره مشخص می‌کنیم و خانه بعدی را سیاه می‌کنیم (خانه B۵). اگر این مسیر را ادامه دهید، لایبرنت کامل می‌شود و بقیه کار را به خودتان واگذار می‌کنیم.

اکنون به عنوان تفریح و سرگرمی این لایبرنت‌ها را خودتان کامل کنید و مسیر خروجی را هم مشخص کنید:



جدول ۴

برای شماره بعد، برایتان باز هم از این معماهای لایبرنت داریم!

* پی‌نوشت

۱. برای مطالعه بیشتر در مورد موضوع لایبرنت‌ها، به مقاله‌ای از نگارنده با عنوان «لایبرنت‌ها و مازها در گذرگاه تاریخ» در مجله دانش و مردم شماره فروردین ۱۳۸۳، و یا به سایت www.ensani.ir که همین مقاله در آن موجود است، مراجعه کنید.

دیگر نگران رسم نمودارهای ریاضی در Word نباشید

کلیدواژه‌ها: Word، Efofex FX Graph، رسم نمودار معادلات و توابع ریاضی، راهنمای استفاده از نرم‌افزار

مقدمه




محمد مهدوی*
دبیر ریاضی دبیرستان‌های
شهرستان میانه

شاید بارها اتفاق افتاده باشد که هنگام تایپ مسئله‌های امتحان ریاضی، برای رسم دستگاه مختصات یا یک نمودار ریاضی با مشکل مواجه شده یا حداقل اعداد محورهای مختصات را با دست وارد کرده باشید. شاید این سؤال برایتان پیش آمده باشد که نمودارهای کتاب‌های ریاضی را چگونه رسم کرده‌اند. شاید از نرم‌افزاری استفاده کرده باشید که بعد از رسم نمودار، آن را به شکل تصویر ذخیره کرده‌اید و سپس در داخل مطالب تایپ شده خود قرار داده باشید که موجب به هم ریختن و یا کیفیت نامطلوب نمودار شده است. یا در صورتی که بعداً خواسته باشید، شکل یا اندازه نمودار را عوض کنید، برای شما مشکل و یا کسل‌کننده شده باشد. از این به بعد با همه مشکلات تایپ مطالب ریاضی خداحافظی کنید. چرا که بعد از خواندن این مقاله شما قادر خواهید بود هر نمودار دلخواه را در داخل مطالبتان وارد کنید و هرگاه که خواستید، با یک کلیک، اندازه و یا حتی شکل نمودار را تغییر دهید.



تصویر ۱



تصویر ۲

یکی از نرم‌افزارهای فوق‌العاده مفید «FX Graph 4» است که برای رسم تمامی نمودارهای دوبعدی کاربرد دارد. البته برای وارد کردن ضابطه توابع باید چند نکته را رعایت کنید که این نکات را بیان خواهیم کرد.

ابتدا برای دانلود این نرم‌افزار عبارت «دانلود نرم‌افزار Efofex FX Graph4.004.4» را در موتور جست‌وجو بزنید و به ورژن نوشته شده دقت کنید. البته کار با ورژن‌های بالاتر نیز دقیقاً مشابه همین ورژن است.


این نرم‌افزار بعد از نصب به‌طور خودکار در نوار ابزار «word» قرار خواهد گرفت. دقت کنید که در مراحل نصب، نوع word را انتخاب کنید. ضمناً نگارنده با word2007 کار کرده‌ام. (به دو تصویر ۱ و ۲ نگاه کنید).

بعد از کلیک روی Efofex یا Add-ins و انتخاب نرم افزار وارد محیط نرم افزار می شویم (تصویر ۳)



تصویر ۳

برای وارد کردن ضابطه یک یا چند تابع، یا می توانید در صفحه سفید، کنار دستگاه مختصات کلیک راست کنید و یا روی $y =$ کلیک کنید تا پنجره ای باز شود که قسمتی از آن را در تصویر ۴ می بینید. در ادامه مطالب به شرح هر کدام از قسمت های آن می پردازیم.



تصویر ۴

❖ functions (توابع)

در اینجا می توانید ضابطه توابع را وارد کنید. برای وارد کردن توابع به نکات زیر دقت کنید:

- برای نوشتن توان، شیفت را بگیرید و در صفحه کلید علامت $^$ را بزنید؛ مثل: $y = x^{82}$.

- اگر علامت توان نزنید، نرم افزار عدد قبل از x را ضرب و عدد بعد از آن را توان حساب می کند. در اعداد کسری از پرانتز استفاده کنید.


- برای نوشتن \sqrt{u} باید بنویسید: $\text{sqrt}(u)$ و یا برای نوشتن $\sqrt[n]{u^m}$ باید بنویسید: $u \wedge (\frac{m}{n})$.

- برای وارد کردن $y = \log_n u$ ابتدا باید \log را و بدون فاصله مبنا را بنویسید و سپس یک فاصله بدهید و u را داخل پرانتز وارد کنید. مثلاً برای وارد کردن $y = \log_2(x+1)$ باید بنویسید: $y = \log_2(x+1)$.

- در صورتی که مبنای لگاریتم کسری باشد، احتمالاً نرم افزار قبول نکند. در این صورت مثلاً برای وارد کردن $y = \log_2(x+1)$ باید شکل دیگر آن، یعنی $y = (\frac{2}{3})^{x+1}$ را وارد کنید.

- برای رسم توابع مثلثاتی کافی است کمان را داخل پرانتز بنویسید. مثلاً: $y = \sin(x+1)$.

- البته برای رسم توابع مثلثاتی باید در قسمت «Quick Entry» روی کلیک کنید. و سپس در قسمت



درجه (Degree) یا رادیان

(Radian) را انتخاب کنید.

- برای رسم توابع چندضابطه ای، ضابطه ها را زیر هم و بازه هر تابع را جلوی آن بنویسید.

- برای وارد کردن توابع جز صحیح، مثل $y = [x+1]$ باید آن را به شکل $y = \text{gint}(x+1)$ وارد کنید.


- پرانتز کمک فراوانی در وارد کردن معادله ها به محیط نرم افزار می کند. مثلاً برای وارد کردن معادله $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ می توانید آن را به شکل $(1/4)x^{82} + (1/9)y^{82} = 1$ وارد کنید.

- در قسمت Axes می توانید تنظیمات مربوط به محورها از جمله شکل، رنگ، فونت و ضخامت محورها را تغییر دهید. مثلاً با انتخاب ۲pt یا ۵pt ضخامت محورها تغییر می کند. البته بعضی از تنظیمات به صورت پیش فرض فعال اند و گاهی نیاز به تغییر نیست. با امتحان هر قسمت می توانید عملکرد آن را ببینید.

- برای نوشتن π باید بنویسید pi. مثلاً برای نوشتن $y = \sin \pi x$ باید آن را به شکل $y = \sin(\text{pix})$ وارد کنید.

❖ Scale (مقیاس)

بعد از کلیک روی این قسمت صفحه ای باز می شود که قسمتی از آن را در تصویر ۵ می بینیم.




تصویر ۵

ابتدا ☒ Equal Aspect را انتخاب کنید و در قسمت x Axis و y Axis همه تیک ها بردارید و مقادیر حداقل و حداکثر روی محورها را بنویسید. همچنین، در قسمت Major و Minor اعداد مربوط به تقسیم بندی

دستگاه مختصات به شکل شطرنجی را به صورت زیر بنویسید:

● اگر همه قسمت‌ها را صفر قرار دهید، یک دستگاه مختصات ساده بدون شماره‌گذاری خواهید داشت.

● اگر همه قسمت‌ها را یک قرار دهید، یک دستگاه مختصات با شماره‌گذاری به اندازه یک واحد خواهید داشت و با انتخاب اعداد بزرگ‌تر این شماره‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت که برای ۱، ۰ و ۲ به صورت تصویر ۶ خواهد بود.




تصویر ۶

بعد از این تنظیمات، قسمت روبه‌رو را

انتخاب کنید و با تغییر دادن عدد، اندازه 8 mm = 1 x unit تصویر نمودار را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر کنید و اندازه مناسب نوشته خود را انتخاب کنید.

❖ Grde (شطرنجی)



این قسمت مربوط به همان کادرهای شطرنجی شکل و تنظیمات خطوط آن است که با انتخاب ☒ Show Grid می‌شوند و با برداشتن تیک، دستگاه مختصات به شکل ساده نشان داده می‌شود. در قسمت پایین آن ضخامت و رنگ‌های خطوط را نیز می‌توان تغییر داد که در تصویر ۷ دو حالت متفاوت نمایش داده شده است.



تصویر ۷


حال با کلیک روی قسمت «Function properties» (ویژگی توابع) صفحه‌ای باز می‌شود که می‌توانید توابع دلخواه خود را در قسمت مربوطه بنویسید. البته برای نوشتن تابع بعدی، اگر با زدن «کلید اینتر» نمی‌توانید به سطر بعدی بروید، کافی است نشانگر موشواره را به سطر بعدی ببرید و چپ کلیک کنید. همچنین برای تنظیمات هر تابع، روی ضابطه آن کلیک و تنظیمات مربوطه را اعمال کنید. مثلاً ممکن است بخواهید ضخامت نموداری بیشتر باشد یا

نموداری به صورت نقطه‌چین باشد یا برای هر نموداری رنگ دلخواه انتخاب کنید (تصویر ۸).



تصویر ۸

در قسمت‌های پایینی آن، با قرار دادن و برداشتن تیک تغییرات جزئی در نمودار اعمال می‌شود که خودتان می‌توانید به سادگی امتحان کنید. در تصویر ۹ انواع توابع با ساختارهای متفاوت را مشاهده می‌کنید.



تصویر ۹

برای نوشتن نام تابع، روی نمودار تابع کلیک راست کنید و سپس در کادر باز شده «Add annotation» (افزودن یادداشت) را انتخاب کنید تا صفحه‌ای باز شود. در صفحه باز شده می‌توانید فونت نوشته‌ها و ضخامت و رنگ مستطیل‌ها را تغییر دهید و یا «Add blank annotation» را انتخاب کنید و با توجه به قسمت قبلی، ضابطه تابع یا توضیحات دلخواه خود را بنویسید. البته توضیحات باید به زبان انگلیسی باشد. سرانجام، برای اینکه راحت بتوانید نمودار و یا عکس‌ها را داخل نوشته‌ها جابه‌جا کنید، ابتدا روی نمودار چپ کلیک کنید و سپس از نمودار ابزار word، قسمت «page layout» را انتخاب کنید و از قسمت باز شده، «text warpping» را برگزینید. اکنون از زبانه‌های باز شده نحوه قرار گرفتن عکس و نوشته را انتخاب کنید (مثلاً in front of یعنی در مقابل). در این صورت به راحتی می‌توان عکس و نمودار را بدون به هم ریختن مطالب جابه‌جا کرد.

* math24@chmail.ir

لغات و اصطلاحات جدید

1. Prime number	عدد اول
2. Counting number	عدد شمارشی
3. Odd	فرد
4. Negative	منفی
5. Continuous functions	تابع‌های پیوسته
6. Interval	بازه
7. Differentiable functions	تابع‌های مشتق‌پذیر
8. Consider	در نظر گرفتن
9. Claim	ادعا

آموزش ترجمه متون ریاضی

EXAMPLE 1. Let $A = \{\text{all odd counting numbers larger than } 2\}$ and $B = \{\text{all prime numbers larger than } 2\}$. Are these two sets equal?

Proof. The answer is: no.

We have already seen that all prime numbers larger than 2 are odd. Therefore $B \subseteq A$.

Are all odd numbers larger than 2 prime numbers? The answer is negative, because the number 9 is odd, but it is not prime. Therefore, $A \not\subseteq B$. Thus, the two sets are not equal. ■

EXAMPLE 2. Let $C = \{\text{all continuous functions on the interval } [-1, 1]\}$ and $D = \{\text{all differentiable functions on the interval } [-1, 1]\}$. Are these two sets equal?

Proof. The answer is: no.

All differentiable functions are continuous (a Calculus book might be helpful for checking this claim), but not all continuous functions are differentiable.

Consider the function $f(x) = |x|$. This is continuous, but it is not differentiable at $x = 0$. ■

شما ترجمه کنید

EXAMPLE 1. Let $A \subset U$ and $B \subset U$. Then $(A \cap B)' = A' \cup B'$.

(This is known as one of De Morgan's laws. The proof of the other law, namely $(A \cup B)' = A' \cap B'$, is left as an exercise. August De Morgan [1806-1871] was one of the first mathematicians to use letters and symbols in abstract mathematics).

Proof

Part 1. $(A \cap B)' \subseteq A' \cup B'$

Let $x \in (A \cap B)'$. This implies that $x \notin (A \cap B)$. Therefore, either $x \notin A$ or $x \notin B$. Indeed, if x was an element of both A and B , Then it would be an element of their intersection. But we cannot exclude that x belongs to one of the two sets. Therefore, either $x \in A'$ or $x \in B'$. This implies that $x \in A' \cup B'$.

Part 2. $A' \cup B' \subseteq (A \cap B)'$

Let $x \in A' \cup B'$. Then either $x \in A'$ or $x \in B'$. Then either $x \notin A$ or $x \notin B$. This implies that x is not a common element of A and B ; that is, $x \notin (A \cap B)$. Thus, we can conclude that $x \in (A \cap B)'$.

As both inclusions are true, the two sets are equal. ■

مثال ۱. فرض کنیم:

$A = \{\text{همه اعداد شمارشی فرد بزرگتر از } 2\}$

و

$B = \{\text{همه اعداد اول بزرگتر از } 2\}$

آیا این دو مجموعه مساوی‌اند؟

برهان: پاسخ خیر است. ما قبلاً دیده‌ایم که همه اعداد اول بزرگتر از ۲ فرد هستند. بنابراین: $B \subseteq A$. آیا همه اعداد فرد بزرگتر از ۲، اول هستند؟ پاسخ منفی است، زیرا عدد ۹ فرد است ولی اول نیست. بنابراین: $A \not\subseteq B$. پس دو مجموعه برابر نیستند. ■

مثال ۲. فرض کنیم:

$C = \{\text{همه توابع پیوسته روی بازه } [-1, 1]\}$

و

$D = \{\text{همه توابع مشتق‌پذیر روی بازه } [-1, 1]\}$

آیا این دو مجموعه مساوی‌اند؟

برهان: پاسخ خیر است. تمام تابع‌های مشتق‌پذیر، پیوسته هستند (کتاب حسابان ممکن است برای بررسی این ادعا مفید باشد)، اما همه توابع پیوسته مشتق‌پذیر نیستند. تابع $f(x) = |x|$ را در نظر بگیرید. این (تابع) پیوسته است، ولی در نقطه $x = 0$ مشتق‌پذیر نیست. ■



مصاحبه با استاد جعفر نیوشا
معلم پیشکسوت درس هندسه

معلم باید شخصیت به خصوصی داشته باشد

مقدمه

جعفر نیوشا متولد سال ۱۳۱۰ در تبریز است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهر به پایان رساند و برای ادامه تحصیل به تهران آمد. پس از فارغ التحصیل شدن از دانش‌سرای عالی در رشته ریاضی، از سال ۱۳۳۴ به شغل شریف معلمی ریاضی مشغول شد و برای خدمت به زادگاهش بازگشت. ۹ سال بعد، وی به تهران منتقل شد و در «دبیرستان مروی» به تدریس ریاضیات و به خصوص هندسه پرداخت. در سال ۱۳۶۱ نیز بازنشسته شد. اما فعالیت‌های استاد در اینجا متوقف نشد و او به کار معلمی و تحقیق و تألیف ادامه داد.

در سال‌های بعد نیوشا به عضویت دفتر تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش درآمد و جزو مؤلفان کتاب‌های هندسه نظام جدید آموزشی بود. وی همچنین در «دبیرستان فرزنانگان» تهران به تدریس درس هندسه پرداخت و در آنجا معلم و راهنمای بسیاری از نخبگان و المپیادها بود که از جمله می‌توان به خانم‌ها مریم میرزاخانی و رؤیا بهشتی‌زواره اشاره کرد. استاد نیوشا همچنین از ابتدای تأسیس گروه المپیادهای وزارت آموزش و پرورش و بعدها باشگاه دانش‌پژوهان جوان، به عضویت آن‌ها درآمد و در سال ۱۹۹۱، به عنوان سرپرست تیم المپیاد ریاضی ایران به کشور سوئد اعزام شد.

استاد نیوشا هم‌اکنون در سن ۸۴ سالگی همچنان به کار تألیف و تحقیق مشغول است و آخرین کتاب ایشان، با عنوان «مسائلی در هندسه مسطحه»، در سال ۱۳۹۳ توسط «انتشارات فاطمی» به چاپ رسید. پیشینه درخشان استاد نیوشا بهانه‌ای کافی برای انجام گفت‌وگویی با ایشان بود. بنابراین از مدت‌ها قبل ایشان را برای مصاحبه برگزیده بودیم تا اینکه در مردادماه امسال فرصت این کار فراهم شد و استاد برای گفت‌وگو به دفتر مجله آمد. در این گفت‌وگوی صمیمی، آقایان هوشنگ شرقی و حمیدرضا امیری، مدیر داخلی و سردبیر مجله برهان، محمدهاشم رستمی، عضو هیئت تحریریه مجله، حسین کریمی، عضو هیئت تحریریه مجله، و ابراهیم دارابی، دبیر پیشکسوت هندسه، مؤلف کتاب‌های کمک‌درسی متعدد در ریاضیات و عضو سابق هیئت تحریریه «مجله رشد ریاضی» و دفتر تألیف کتب درسی نیز در گفت‌وگو شرکت داشتند. مشروح این گفت‌وگو را با هم بخوانیم.

رضوی، دکتر کرم‌زاده و جناب‌عالی. می‌خواستم از شما بپرسم که چه‌طور شد به عنوان سرپرست آن تیم برگزیده شدید و اگر از آن دوره خاطره‌ای هم دارید، بفرمایید.

استاد نیوشا: کمیته المپیاد ریاضی در سال ۱۳۶۶ تأسیس شد و من از سال ۱۳۶۷ عضو آن بودم. سه چهار نفر بودیم، آقای دکتر نجفی بود که بعداً وزیر آموزش و پرورش شدند، آقای دکتر کرم‌زاده بود که از اهواز می‌آمد، آقای دکتر حداد عادل بود و من بودم. بعدها هم چند نفر دیگر اضافه شدند؛ از جمله آقایان

رشدبرهان: اجازه بدهید صحبت‌مان را از ۲۴

سال پیش شروع کنیم. در المپیاد ریاضی سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰ خورشیدی)، تیم المپیاد ریاضی ایران برای شرکت در این رقابت‌ها به شهر «سیگتونا» یی سوئد اعزام شد. این تیم برای نخستین بار توانست به مدال طلا برسد و در مجموع هم درخشش خوبی داشت. دو نفر از اعضای تیم، آقایان بهرنگ نوحی و پیمان کسایی موفق به کسب مدال طلا شدند و تیم کشورمان در مجموع به مقام هشتم رسید. این تیم سه سرپرست داشت که عبارت بودند از آقایان دکتر

دکتر رضوی، دکتر تابش، دکتر جلالی و... معمولاً هر سال دو نفر به عنوان سرپرست انتخاب می شدند که یکی از آنها از طرف کمیته برگزاری مسابقه به اتاق سؤالات برده می شد و به مدت یک هفته در قرنطینه بود.

آن سال که من اعزام شدم، تصمیم گرفته شد که یک نفر دیگر هم به عنوان همراه برده شود. چون یک نفر که به اتاق سؤالات می رفت و نفر دوم هم به جلسات دعوت می شد و در نتیجه بچه های تیم تنها می شدند. برای آنکه بچه ها تنها نباشند و سرپرستی داشته باشند، قرعه به نام من افتاد و همراه تیم به شهر سیگتونا رفتیم. سیگتونا قبل از «استکهلم»، پایتخت قدیم سوئد بوده است و شهر بسیار کوچک و زیبایی است. محل مسابقات در دانشگاهی بود که حالا اسم آن به خاطرم نیست. در آن مسابقات همان طور که گفتید، بچه های ما دو مدال طلا و دو مدال نقره و دو مدال برنز آوردند. من در سال ۱۹۹۸ که به آمریکا رفته بودم، بهرنگ نوحی و پیمان کسایی هر دو در دانشگاه MIT و در دوره دکترای ریاضی تحصیل می کردند و وقتی فهمیدند که من آنجا هستم، استقبال بسیار خوبی هم از من کردند و چند روزی مهمان آنان بودم.

**کمیته المپیاد
ریاضی در سال
۱۳۶۶ تأسیس
شد و من از سال
۱۳۶۷ عضو آن
بودم**

رشدبرهان: آیا شما با گروهی از المپیادی ها که خانم مریم میرزاخانی هم جزو آنها بود، تدریس هندسه داشتید؟

استاد نیوشا: خیر من به آنها تدریس نکردم. در زمان آنها روش تدریس عوض شده بود و آنها در دانشگاه صنعتی شریف و توسط استادان آنجا آموزش دیدند. ولی من در دبیرستان فرزندگان معلم هندسه کلاسی بودم که خانم میرزاخانی و رویا بهشتی زواره در آن بودند. یکبار در برخوردی که با آقای دکتر محمودیان داشتم، ایشان گفتند که ما در تابستان در دانشگاه کلاسی برای دانش آموزان



در کنار اعضای تیم المپیاد ریاضی ایران (سوئد - ۱۳۷۰)



همراه با اعضای تیم المپیاد ریاضی ایران در مقابل ساختمان سفارت ایران در سوئد. بعضی از کارکنان سفارتخانه نیز در عکس حضور دارند.



**مجله یکان تأثیرات
مهم در پیشبرد
اطلاعات ریاضی
بچه‌ها داشت.
بچه‌ها همیشه
سراغ آن را
می‌گرفتند و هر ماه
منتظر انتشار آن
بودند**

آن شده‌اند.
حُب اگر از آن زمان سه دهه به عقب برگردیم،
می‌رسیم به دههٔ چهارم شمسی که شما تازه کارتان را
به‌عنوان معلم هندسه در تهران و در دبیرستان مروی
شروع کرده بودید. در «مجلهٔ ریاضی یکان» هم که
آن زمان زنده‌یاد عبدالحسین مصحفی منتشر
می‌کرد، چند جا اسم شما هست و شاگردانتان
مسئله‌های طرح‌شدهٔ شما را به مجله می‌فرستادند.
آیا این‌ها را می‌دیدید، و اصولاً نظرتان دربارهٔ مجلهٔ
یکان و تأثیر آن در ترویج ریاضیات بین دانش‌آموزان
آن دوره چیست؟

استاد نیوشا: بله آقای مصحفی، خدا رحمتشان
کند. هم‌دوره‌ای ما بود و جزو ۳۰ نفری بود که آن
موقع برای تحصیل به تهران آمده بودند. دو نفر
از هم‌دوره‌ای‌های ما بسیار شاخص بودند. یکی
آقای دکتر محمدعلی قینی، معلم ریاضی بود که
بعداً ادامهٔ تحصیل داد و جزو شاگردان ممتاز دکتر
افضلی‌پور بود و دانشیار دکتر افضلی‌پور و دستیار
ایشان شد و به استادی دانشگاه تهران رسید.
دیگری هم آقای مصحفی بود که مجلهٔ یکان را
درآورد که ما هم آن را می‌خواندیم و مسائلی را برای
آن می‌فرستادیم و دوره‌هایی از آن را هم داشتیم.
مجلهٔ یکان تأثیرات مهم در پیشبرد اطلاعات ریاضی
بچه‌ها داشت. بچه‌ها همیشه سراغ آن را می‌گرفتند
و هر ماه منتظر انتشار آن بودند تا قبل از آنکه تمام
شود، آن را بخرند.

شرقی: من خودم خاطره‌ای دارم از آقای دکتر
تابش که می‌گفت در سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ که
در دبیرستان هدف تحصیل می‌کردیم، به محض
اینکه زنگ تفریح ساعت نهار می‌خورد، می‌دویدیم

مستعد مدارس داشتیم و تعدادی دانش‌آموز از
دبیرستان فرزندگان بودند که یکی از آن‌ها که اسمش
مریم بود، استعداد فوق‌العاده‌ای دارد و به من توصیه
کرد که مراقب او باشم تا استعدادش شکوفا شود.
بعد از پرس‌وجویی که کردم، متوجه شدم که این
دانش‌آموز مریم میرزاخانی است که می‌خواست به
اصرار پدرش به رشتهٔ تجربی برود و من مانع شدم و
او را به رشتهٔ ریاضی هدایت کردم!

امیری: ببینید تأثیر یک توصیهٔ معلم چه قدر و تا
کجا می‌تواند باشد! البته اگر ایشان به رشتهٔ تجربی
می‌رفت، قطعاً باز هم موفق بود و مثلاً می‌توانست
پزشک موفق شود، ولی مسلماً دیگر «مدال فیلدز»
را نمی‌گرفت!

استاد نیوشا: بله همین‌طور است. به هر حال
آن‌ها- مریم میرزاخانی و رؤیا بهشتی- هر دو به
رشتهٔ ریاضی رفتند و کلاس دوم که بودند، من معلم
هندسه‌شان بودم و آن‌ها را از بقیه جدا می‌کردم و
به آن‌ها مسئله‌های خاص می‌دادم تا روی آن‌ها کار
کنند. دیگر به آن‌ها تکلیف‌های معمولی نمی‌دادم.
اینها چون المپیادی شده بودند، کلاس‌های سوم و
چهارم را دیگر به مدرسه نیامدند.

رشدبرهان: بله، خانم میرزاخانی در المپیادهای
ریاضی سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ دو دوره پیاپی
عضو تیم المپیاد ریاضی ایران بود و در هر دو دوره
مدال طلا گرفت. جالب اینجا بود که در سال ۱۹۹۴
که ایشان سال سوم بود، امتیاز ۴۱ (از ۴۲) و در
سال ۱۹۹۵ امتیاز کامل (۴۲) را گرفت و در واقع
مدال طلای برتر - Supergold - را دریافت کرد که
از ایرانی‌ها فقط سه نفر تاکنون موفق به دریافت



**در دانشکدهٔ
علوم دانشگاه
تهران، آقایان
دکتر هشترویدی،
دکتر آل بویه،
دکتر افضل‌پور،
پروفسور فاطمی
و... طوری
تدریس کردند که
دانشجویان علاوه
بر درس ریاضی،
از این‌ها درس
زندگی و اخلاق
هم می‌گرفتند**

به این درجه از محبوبیت رسیده است و من چگونه می‌توانم به پای او برسم. شخصیت آن‌ها روی شاگردانشان که معلم‌های بعدی بودند، تأثیر بسیاری داشت. از معلمان، مثلاً از آقای غیور نام بردید. خب غیور یک دریا بود. نه تنها ریاضی‌دان، بلکه شاعر و ادیب بود. اخلاق خوبی داشت وقتی با آن متانت با انسان حرف می‌زد، مخاطب لذت می‌برد.

رشدبر/ان: بله در مصاحبه‌ای که با آقای دکتر پاشا داشتیم، از ایشان یاد کردیم. دکتر پاشا می‌گفت که در حین صحبت با استاد غیور، انسان محو شخصیت او می‌شد.

امیری: به نکتهٔ بسیار مهمی اشاره کردید. همان‌طور که فرموده‌اید استادانی که روی شاگردانشان تأثیرگذار بودند، همین تأثیر را از طریق معلمانی که پروردهٔ آن‌ها بودند، به دانش‌آموزان منتقل می‌کردند. این موضوع حلقهٔ مفقودهٔ امروز ماست. وقتی امروز چنان معلم‌هایی نداریم، طبیعی است که دانش‌آموزان ما هم آن‌گونه نخواهند شد. راه چاره چیست؟

استاد نیوشا: دو مسئله هست: یکی اینکه باید بپذیریم که سواد عمومی دانش‌آموزان امروز (به دلیل دسترسی بیشتر به اطلاعات) بیشتر از دانش‌آموزان آن موقع است، اما اخلاق، منش و شخصیت دانش‌آموزان نسبت به گذشته و آن احترام و ارتباط اخلاقی بین دانش‌آموز و معلم نسبت به آن زمان خیلی دگرگون شده است. معلم باید شخصیت به‌خصوصی داشته باشد. من نمی‌گویم که معلم نباید بخندد و همیشه عبوس باشد، ولی باید دانش‌آموزان به لحاظ اخلاقی از معلمشان حساب ببرند و تحت تأثیر او باشند.

به طرف دکهٔ روزنامه‌فروشی تا ببینیم مجلهٔ یکان درآمده است یا نه.

استاد نیوشا: کاملاً درست است. مسائل خوبی می‌نوشت، مقاله‌های خوبی داشت و روی دانش‌آموزان واقعاً تأثیر می‌گذاشت.

رشدبر/ان: غیر از دانش‌آموزان، یک نسل معلم‌ها هم بودند که یک تفاوت عمده با معلم‌های این دوره داشتند. کسانی همچون زنده‌یادان مصحفی، غیور، شهریار، باقر امامی، غلامرضا عسجدی و... که ویژگی‌های منحصر به فردی داشتند و به معنی واقعی کلمه فرهیخته بودند. فرهیختگی به این معنی که یک نفر خودش را وقف معلمی کند، به‌خاطر کارش، به‌خاطر ترویج علم، و به‌خاطر کمک به جوانان کشور، فداکاری کند و از کارش لذت ببرد. کسی مانند مرحوم مصحفی که تمام زندگی‌اش را وقف انتشار مجله یکان کرد. او اصلاً به فکر مادیات نبود و به ترویج ریاضی پرداخت. متأسفانه امروزه دیگر این روحیات را کمتر می‌بینیم. به‌عنوان کسی که متعلق به آن نسل بوده‌اید و آن دوره را تجربه کرده‌اید، نظرتان چیست؟ چه تفاوتی باعث این موضوع شده است؟

استاد نیوشا: سؤال جالب و عجیبی است. من فکر می‌کنم تربیت دانشگاه‌ها، آن زمان، آن‌ها را آن‌گونه بارآورده بود. مثلاً استادان خود ما در دانشکدهٔ علوم دانشگاه تهران، آقایان دکتر هشترویدی، دکتر آل بویه، دکتر افضل‌پور، پروفسور فاطمی و... طوری تدریس کردند که دانشجویان علاوه بر درس ریاضی، از این‌ها درس زندگی و اخلاق هم می‌گرفتند. من خودم همیشه می‌خواستم به دکتر افضل‌پور برسم و از خودم می‌پرسیدم که چرا و چگونه دکتر افضل‌پور

◀◀ (ادامه در شماره آینده)

علم در عمل

• نویسنده: جان لینهان
• مترجم: منیژه مدبر
• ناشر: مازیار

در کتاب و در فصل «حماقت و غرور» آن چنین آمده است که:

در پیشگفتار کتاب این نکته جالب آمده است که: «علم برخلاف ورزش، سیاست، ادبیات یا نمایش به قدرت مردم را به هیجان می آورد. یک دلیلش این است که دانشمندان از رسانه‌ها واهمه دارند و راضی نیستند که دیدگاهشان بیش از حد بزرگ جلوه داده شود یا اینکه به صورت مسئله‌ای پیش پا افتاده مطرح شود. اغلب دانشمندان از رسانه‌ها روی گردانند و مسلم است که ما نمی‌توانیم آن‌ها را به زور به همکاری وادار کنیم، اما اگر گهگاه رسانه‌ها خود را به آنان نزدیک کنند، نتیجه بسیار جذاب می‌شود.»

تمام فصل‌های کتاب جالب و جذاب‌اند. در کتاب با مطالبی آشنا می‌شویم که کمتر با آن‌ها مواجه بوده‌ایم، و در اینجا تنها به ذکر پاره‌ای از مطالب فصل حساب و موضوعاتی از آن بسنده می‌کنیم. این فصل چنین آغاز می‌شود:

«دو تا عدد دلخواه بنویسید. آن دو را با هم جمع کنید و جواب را به عنوان عدد سوم بنویسید. بعد عدد سوم را با دوم جمع کنید و به همین ترتیب مدتی این کار را ادامه دهید. همین طور که این رشته اعداد ادامه می‌یابد، نسبت اعداد متوالی به مقدار معینی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. این مقدار به تقریب $\frac{1}{6}$ (یا به تدقیق $\frac{1}{6/18.03398...}$) می‌شود. حدود سال ۱۲۰۰ میلادی، ساده‌ترین شکل این رشته با استفاده از اعداد

۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ...

هر کسی با یک قلم و ماشین حساب جیبی به راحتی می‌تواند رشته‌ای از تصادف‌های خارق‌العاده به دست آورد. حاصل تقسیم تعداد روزها در سال منجمان ۳۶۵/۲۴۲ بر مربع عدد π ، ۳۷ است - و این دمای بدن در مقیاس سانتی‌گراد است. درازای دریاچه «لاخنس» ۲۲/۷۵ مایل یا ۴۰۰۴۰ یارد است که نشان می‌دهد ۱۰ هیولا از آغاز آفرینش در آنجا وجود داشته‌اند. اگر به هر حرف انگلیسی بنا بر جایی که در حروف الفبا دارد، عددی نسبت دهیم و سپس این مقادیر را برای حروف موجود در «Archbishop Ussher» (خادم سراسقف)، «Peter Lemesurier» (پیتر لمه‌سوریر) و «Inverness-Shire Monster» (هیولای استان اینورنس) جمع کنیم، عدد ۶۶۶ حاصل می‌شود که نشان می‌دهد، حیوان بارکشی - شاید هم دجالی - اعماق دریاچه لاختنس را اشغال کرده است. سفرهای خارجی پرهزینه است؛ بهتر است تحقیق درباره خردمندی پیشینیان نزدیک کشور ادامه یابد!

فصل‌های کتاب عبارت‌اند از:

- چرا چیزها کار می‌کنند؟
- تاریخ، علم و جامعه
- زمین، خورشید و ستارگان
- حساب و موضوعاتی از این دست
- دنیای زندگان
- آدم‌ها
- حماقت و غرور



کتاب از نداشتن ویراستار رنج می‌برد، و اگر چه مطالعه آن برای همه، به خصوص دانش‌آموزان رشته ریاضی، سودمند است، رواست که در چاپ بعدی، این اثر به ویراستاری نیرومند سپرده شود.

* پی‌نوشت
1. John Lenihan

برای ریاضی‌دان بزرگ سده میانه، لئوناردو پیزایی، آشنا بود. گاهی این رشته را فیبوناتچی نامیده‌اند که طبق معمول پس از درگذشت او به این نام خوانده شده است. کتاب «چرتکه فیبوناتچی» اولین کتاب درسی طرفدار استفاده از اعداد عربی بود که امروزه برایمان آشناست. پیش از این نوآوری بنیادین، علم حساب کار توان‌فرسایی بود. ضرب کردن XIX (۱۹) در VII (۷) را امتحان کنید! فیبوناتچی عالمان اروپایی را با ایده‌های هندوها و اعراب (مسلمانان) آشنا و تحصیل جبر را پایه‌گذاری کرد.

در مورد ریاضی‌دان‌ها نیز چنین می‌گوید:


«برخی ریاضی‌دان‌ها وقت خود را صرف موضوع‌هایی می‌کنند که مفید بودن آن‌ها از ابتدا معلوم است. آنان با به‌کار گرفتن نمادها و ایده‌های انتزاعی مدل‌هایی براساس واقعیت می‌سازند و نتایجی به‌دست می‌آورند که دارای ارزش علمی در علوم و مهندسی است. عده‌ای دیگر موضوع‌هایی را برمی‌گزینند که الزاماً در رابطه با عالم محسوس نیست و به‌عنوان شاخه‌ای از منطق تلقی می‌شود. معدودی نیز خود را وقف موضوع‌هایی به‌ظاهر بی‌اهمیت، اما در واقع کاملاً پرمحتوا می‌کنند؛ یعنی کار روی خواص خود اعداد.»

آیا تمام ریاضیات کاربرد عملی دارند؟ پاسخ این سؤال منفی است. کتاب در این مورد می‌گوید: «استاد فیزیکی که اخیراً از انجمن تحقیقات علمی کمک ۲۵۰ هزار پوندی دریافت کرد، با صداقت مخصوص به خود اظهار داشت که آزمایش‌هایی که این کمک مالی را جذب کرده‌اند، هیچ استفاده عملی ندارند.

اینکه قضاوت او از روی غرور بود یا تواضع، صرف آن اظهارنظر چیزی را معلوم نمی‌کند. با وجود این، نهادهای علمی به نتیجه‌گیری او آفرین گفتند؛ و حق هم داشتند. چون علم، به معنی دقیق کلمه، به خودی خود بی‌فایده است. فناوری که اغلب علم را همراهی می‌کند یا منبع الهام آن است (و گاه جداگانه پیشرفت می‌کند)، داستان دیگری است.

طبعاً، به درد نخور بودن درجاتی دارد که گاه حتی حامیان گشاده‌دست را هم به مرز تردید و ناباوری می‌کشاند. دانشمندان وقتی تحت فشار شدید قرار بگیرند، گاهی اذعان می‌کنند که کارشان می‌تواند در شرایط به‌خصوصی، آن هم تاحدودی، به‌کار کسی بیاید.»

پرسش‌های پیکارجو!




در نمودار مقابل، می‌خواهیم در دایره‌ها عددهای حقیقی را به‌گونه‌ای قرار دهیم که اولاً هر عدد با مجموع دو عدد زیرین آن برابر باشد، ثانیاً مجموع اعداد هر سطر با مجموع اعداد سطر زیرین آن برابر باشد، برای این کار باید حداقل چند عدد صفر در دایره‌ها قرار دهیم؟

- الف) ۰ ب) ۱ ج) ۲ د) ۳ ه) ۴

آموزشی

تألیف: پال گلندینینگ
مترجم: غلامرضا یاسی پور



یک

عدد یک همراه با صفر در قلب کل حساب قرار دارد. «یک» صفت یک شیء منفرد است؛ یعنی، با جمع یا تفریق مکرر این عدد، جمیع «اعداد تمام»، چه مثبت و چه منفی، یعنی اعداد «صحیح» (integers) را می توان ایجاد کرد. این عمل پایه و اساس محاسبات، و شاید قدیمی ترین دستگاه شمارش بود که مبدأش را می توان تا

دوران پیش از تاریخ پی گرفت. «یک» نقشی ویژه در ضرب نیز دارد: ضرب هر عدد معلوم در «یک»، صرفاً عدد نخستین را به دست می دهد. این ویژگی با استفاده از «همانی ضربی» (multiplicative identity) بیان می شود.

عدد یک دارای ویژگی های یگانه ای است، به این معنی که به طرق غیر معمول رفتار می کند. این عدد عامل جمیع اعداد تمام دیگر، اولین عدد ناصفر و اولین عدد فرد است. همچنین استاندارد مفید در مقایسه اندازه گیری ها به دست می دهد، به طوری که بسیاری از محاسبات در ریاضیات و علوم برای اینکه پاسخ های بین صفر و یک را به دست دهند، تحت قاعده و قانون در آمده اند.




صفر

صفر مفهومی پیچیده است، و برای مدتی طولانی اکراه فلسفی قابل ملاحظه‌ای برای شناختن و قرار دادن نامی بر آن وجود داشت. قدیمی‌ترین نمادهای صفر تنها بین ارقام دیگر، مشخص‌کننده غایب بودن به حساب می‌آمدند. به عنوان نمونه، دستگاه عددی بابلی‌ها، برای صفر زمانی که بین ارقام دیگر قرار می‌گرفت، اما نه در آخر یک عدد، از یک جانگه‌دار استفاده می‌کرد. قدیمی‌ترین کاربرد قطعی صفر به عنوان عددی مشابه هر عدد دیگر، از طریق ریاضی‌دان‌های هندی در حدود قرن نهم مطرح شده است.




غیر از نگرانی‌های فلسفی، ریاضی‌دان‌های اولیه نیز برای پذیرش صفر اکراه داشتند، چرا که این شیء همیشه مانند اعداد دیگر رفتار نمی‌کرد. برای مثال، تقسیم بر صفر عملی بی‌معنی است، و ضرب هر عدد در صفر صرفاً صفر را به دست می‌دهد. اما صفر در جمع همان نقشی را ایفا می‌کند که یک در ضرب دارد. صفر به عنوان «همانی جمعی» (additive identity) شناخته می‌شود، زیرا جمع هر عدد با صفر به عدد اصلی منجر می‌شود.

بی‌نهایت



بی‌نهایت (که از لحاظ ریاضی با ∞ نمایش داده می‌شود)، صرفاً مفهوم بی‌پایان است. یک شیء بی‌نهایت، شیئی نامحدود است. اعمال ریاضی بدون برخورد با صورت‌های گوناگون بی‌نهایت، مشکل است. بسیاری از استدلال‌های ریاضیات و فنون یا شامل انتخاب چیزی از یک فهرست بی‌نهایت است، یا قرار است تشخیص دهد که اگر فرایندی مجاز به میل به بی‌نهایت باشد، یعنی به‌طور مداوم به طرف حد نامتناهی خویش ادامه دهد، چه اتفاقی می‌افتد. گردآیه‌های نامتناهی اعداد یا اشیای دیگر، موسوم به مجموعه‌های نامتناهی یا بی‌نهایت، بخشی کلیدی از ریاضیات‌اند. توصیف ریاضی مجموعه‌هایی چنین، به این نتیجه زیبا منجر می‌شود که بیش از یک نوع مجموعه نامتناهی وجود دارد، و از این نظر انواع متفاوتی از بی‌نهایت موجود می‌شوند.

در واقع، بی‌نهایت نوع، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر، از مجموعه‌های نامتناهی وجود دارند، و این موضوع در حالی که ممکن است ضدشهود به نظر برسد، از منطق تعاریف ریاضیات به دست می‌آید.



اشاره

«پای تخته» عنوان بخش ثابتی در «ماهنامه برهان» است که از دو بخش داخلی مسئله‌ها و راه‌حل‌ها تشکیل شده است. در هر شماره از ماهنامه، ۱۰ مسئله جدید مطرح می‌شود که همه خوانندگان را به چالش می‌طلبد. توصیه می‌کنیم که به‌طور فعال به حل آن‌ها بپردازید و راه‌حل‌های خود را برای انعکاس در ماهنامه برایمان بفرستید تا با نام خودتان در شماره‌های بعد چاپ شود. از طراحان مسائل ریاضی نیز می‌خواهیم که مسائل جدید خود را برای طرح در بخش مسئله‌ها برایمان بفرستند. توجه داشته باشید که مسائل جدید باید همراه با حل (یا راه‌حل‌های) آن‌ها و در صورت امکان با ذکر مأخذ باشد.

مسائل و راه‌حل‌های خود را می‌توانید یا از طریق پستی (به آدرس ماهنامه) و یا از طریق پست الکترونیکی، برایمان بفرستید که طریقه دوم سریع‌تر و بهتر خواهد بود. در صورتی که خواستید از طریق پست الکترونیکی اقدام کنید، صفحات نوشته‌های خود را اسکن (با وضوح حداقل ۱۵۰ dpi) و یا تایپ کنید و بفرستید. در پایان هر سال اسامی نفرات برتر در ماهنامه درج خواهد شد و به بهترین‌ها جوایز نفیسی اهدا می‌شود. نکته آخر اینکه در چند شماره اول، سهم مسئله‌ها بیشتر است و با دریافت پاسخ‌های شما، بخش راه‌حل‌ها به تدریج پر بارتر خواهد شد. منتظر راه‌حل‌های ارسالی شما هستیم.

■ بخش اول: مسئله‌ها

۱۷۵. ثابت کنید به ازای هر عدد طبیعی $n \geq 3$.

یک n ضلعی محدب وجود دارد که دقیقاً سه زاویه حاده دارد.

۱۷۶. ثابت کنید نمی‌توان پنج خط راست در صفحه

رسم کرد، به‌طوری که دقیقاً سه نقطه تقاطع داشته باشند.

۱۷۷. ثابت کنید $1 + 3^{1394} \mid 3^{1395}$ بخش‌پذیر است.

۱۷۸. خانه‌های جدولی $m \times n$ را با اعداد حقیقی طوری

پر کرده‌ایم که مجموع اعداد هر سطر و همچنین مجموع اعداد هر ستون برابر با ۱ شده است. ثابت کنید: $m=n$.

۱۷۹. ثابت کنید: $4^{80} < 3^{100} + 3^{100} < 4^{79}$

۱۸۰. کدام عدد بزرگ‌تر است: 123456785^2 یا

$123456789 \times 123456781$

۱۷۱. درون چهارضلعی محدب ABCD، نقطه‌ای پیدا

کنید که مجموع فاصله‌هایش از رؤس، کمترین مقدار ممکن باشد.

۱۷۲. ثابت کنید فاصله دو نقطه دلخواه درون هر مثلث

از نصف محیط این مثلث بزرگ‌تر نیست.

۱۷۳. دو بازیکن به نوبت سکه‌های هزار ریالی (هم‌اندازه)

را روی میزی گرد می‌گذارند، بی‌آنکه هیچ سکه‌ای روی دیگری قرار گیرد. بازیکنی که نتواند دیگر سکه‌ای روی میز بگذارد بازنده است. چه کسی راهبرد برد دارد؟

۱۷۴. آیا درست است که در میان هر ۱۰ پاره‌خط

همیشه ۳ پاره‌خط وجود دارند که می‌توان با آن‌ها یک مثلث رسم کرد؟

بخش دوم: راه حل‌ها

۱۴۱. برای هر عدد طبیعی n ثابت کنید:

$$[\sqrt{n} + \sqrt{n+1}] = [\sqrt{4n+1}] = [\sqrt{4n+2}] = [\sqrt{4n+3}]$$

به راحتی می‌توان ثابت کرد:

$$\sqrt{n} + \sqrt{n+1} < \sqrt{4n+2} \quad (\text{به توان برسانید و ساده کنید}).$$

$$[\sqrt{n} + \sqrt{n+1}] \leq [\sqrt{4n+2}].$$

فرض کنید این دو عدد برابر نباشند. در نتیجه عدد

طبیعی q به‌طوری وجود دارد که:

$$\sqrt{n} + \sqrt{n+1} < q \leq \sqrt{4n+2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{4n^2 + 4n} < q^2 - 2n - 1 \leq 2n + 1$$

$$\Rightarrow 4n^2 + 4n < (q^2 - 2n - 1)^2 \leq (2n + 1)^2$$

اما $4n^2 + 4n < (2n + 1)^2$ دو عدد صحیح متوالی

هستند. پس:

$$q^2 - 2n - 1 = 2n + 1 \Rightarrow q^2 = 4n + 2$$

اما مربع هر عدد طبیعی در تقسیم بر ۴ نمی‌تواند

باقی‌مانده ۲ داشته باشد (چرا؟) که تناقض است. پس:

$$[\sqrt{n} + \sqrt{n+1}] = [\sqrt{4n+2}]$$

$$. [\sqrt{4n+1}] = [\sqrt{4n+2}] = [\sqrt{4n+3}]$$

اگر: $m = [\sqrt{4n+1}] < m+1 = [\sqrt{4n+2}]$, آن‌گاه:

$$m \leq \sqrt{4n+1} < m+1 \leq \sqrt{4n+2}$$

در نتیجه: $m^2 \leq 4n+1 < (m+1)^2 \leq 4n+2$.

اما $4n+1$ و $4n+2$ دو عدد طبیعی متوالی هستند،

در نتیجه: $(m+1)^2 = 4n+2$ که تناقض است. پس:

$$[\sqrt{4n+1}] = [\sqrt{4n+2}]$$

$$. [\sqrt{4n+2}] = [\sqrt{4n+3}]$$

۱۴۲. عبارت‌های زیر را تجزیه کنید:

$$A = (x+y)^5 - (x^5 + y^5)$$

$$B = (x+y)^5 - (x^5 + y^5)$$

$$(x+y)^5 - (x^5 + y^5) = 5xy(x+y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$(x+y)^5 - (x^5 + y^5) = 5xy(x+y)(x^2 + xy + y^2)$$

۱۴۳. x, y, z سه عدد حقیقی هستند و $x \neq y$ است،

به‌طوری که داریم: $x^2(y+z) = y^2(x+z) = z^2(x+y)$

مطلوب است مقدار عددی $z^2(x+y)$.

داریم:

$$0 = x^2(y+z) - y^2(x+z) = xy(x-y) + (x^2 - y^2)z$$

$$= (x-y)(xy + yz + zx)$$

چون: $x \neq y$, پس: $xy + yz + zx = 0$. در نتیجه:

$$(x-z)(xy + yz + zx) = 0 \Rightarrow x^2(y+z) = z^2(x+y)$$

$$\Rightarrow z^2(x+y) = 2$$

۱۴۴. اگر $\{a_n\}$ یک دنباله حسابی باشد، بررسی

کنید که کدام یک از دنباله‌های زیر حسابی

است:

$$b_n = a_{n+1}^2 - a_n^2 \quad (\text{الف})$$

$$c_n = aa_{n+1} + b \quad (\text{ب})$$

$$d_n = a_n^2 \quad (\text{ج})$$

$$b_{n+1} - b_n = (a_{n+2}^2 - a_{n+1}^2) - (a_{n+1}^2 - a_n^2) \quad (\text{الف})$$

$$= (a_{n+2} - a_{n+1})(a_{n+2} + a_{n+1}) - (a_{n+1} - a_n)(a_{n+1} + a_n)$$

$$= d(a_{n+2} + a_{n+1} - a_{n+1} - a_n) = 2d^2$$

$\Rightarrow \{b_n\}$ یک دنباله حسابی است

$$c_{n+1} - c_n = aa_{n+2} + b - aa_{n+1} - b = ad \quad (\text{ب})$$

$\Rightarrow \{c_n\}$ یک دنباله حسابی است

$$d_{n+1} - d_n = a_{n+1}^2 - a_n^2 = d(a_{n+1} + a_n) \quad (\text{ج})$$

$$= d(2a_1 + (2n-1)d)$$

بنابراین این دنباله حسابی نیست.

۱۴۵. ثابت کنید دنباله $\{a_n\}$ یک دنباله حسابی

است، اگر و تنها اگر اعداد حقیقی

A و B موجود باشند؛ به‌طوری‌که:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = An^2 + Bn$$

اگر $\{a_n\}$ یک دنباله حسابی باشد، آن‌گاه:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \times n$$

$$= \frac{d}{2} n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$$

همچنین اگر $S_n = An^2 + Bn$ ، آن گاه:

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = An^2 + Bn - (A(n-1)^2 + B(n-1)) \\ &= A(2n-1) + B = (A+B) + 2A(n-1) \\ &= a_1 + 2A(n-1) \end{aligned}$$

در نتیجه $\{a_n\}$ دنباله‌ای حسابی با قدرنسبت $2A$ است.

۱۴۶. اگر $\{a_n\}$ دنباله‌ای حسابی با جملات مثبت باشد، ثابت کنید:

$$\sqrt{a_1 a_n} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_n}{2}$$

به کمک نامساوی واسطه‌ها داریم:

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} &\leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \\ &= \frac{1}{n} \times \frac{a_1 + a_n}{2} \times n = \frac{a_1 + a_n}{2} \end{aligned}$$

برای اثبات نامساوی دیگر از تساوی زیر استفاده

می‌کنیم:

$$\frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \dots + \frac{1}{a_{n-1} a_n} = \frac{n-1}{a_1 a_n}$$

داریم:

$$a_1 a_2 = \frac{n-1}{\frac{1}{a_1 a_2} + \dots + \frac{1}{a_{n-1} a_n}} \leq n \sqrt[n]{(a_1 a_2)(a_2 a_3) \dots (a_{n-1} a_n)}$$

در نتیجه: $(a_1 a_n)^{n-1} \leq (a_1 a_2 \dots a_{n-1})^2 a_n$
بنابراین:

$$(a_1 a_n)^n \leq (a_1 a_2 \dots a_n)^2 \Rightarrow \sqrt{a_1 a_n} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

۱۴۷. فرض کنید S_n مجموع همه اعداد طبیعی بین 2^n و 2^{n+1} باشد. ثابت کنید S_n مضرب ۳ است.

اعداد بین 2^n و 2^{n+1} یک دنباله حسابی هستند با جمله اول $2^n + 1$ و قدرنسبت ۱. در نتیجه مجموعشان برابر است با:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{2^n + 1 + 2^{n+1} - 1}{2} \times (2^{n+1} - 1 - 2^n) \\ &= 3 \times 2^{n-1} (2^n - 1) \end{aligned}$$

۱۴۸. خانه‌های جدول زیر را با اعداد طبیعی پر کنید که اعداد هر سطر و اعداد هر ستون یک تصاعد حسابی باشند.

	۷۴			
				۱۸۶
		۱۰۳		
۰				

فرض کنید a_{ij} عددی است که در سطر i ام و ستون j ام قرار دارد. عدد سمت راست صفر را x و عدد بالای صفر را x_1 می‌نامیم. در نتیجه اعداد سطر آخر x ، $2x$ ، $3x$ و $4x$ هستند و اعداد ستون اول برابر x_1 ، $2x_1$ ، $3x_1$ و $4x_1$ هستند. سعی کنید به کمک اعداد نوشته شده در جدول نتیجه بگیرید: $x_1 + x = 113$ و $4x - 3x_1 = 161$. با حل این دو معادله نتیجه می‌شود: $x_1 = 13$ و $x = 50$.

۱۴۹. تصاعد هندسی $\{a_n\}$ را بیابید، به طوری که برای هر $n \geq 1$ داشته باشیم:

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= a_{n+1} + a_n \\ a_n r^{n+1} &= a_n r^n + a_n r^{n-1} \end{aligned}$$

با فرض $a_n = a_1 r^{n-1}$ داریم:

چون $a_n \neq 0$ و $r \neq 0$ در نتیجه: $r^2 = r + 1$ بنابراین: $r = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

۱۵۰. برای هر عدد طبیعی $n \leq 2$ ثابت کنید:

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < \frac{3}{4}$$

یک نامساوی قوی‌تر را با استقرا ثابت می‌کنیم:

$$S_n = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \leq \frac{3}{4} - \frac{1}{n}$$

برای $n=2$ حکم برقرار است، چون: $\frac{1}{4} \leq \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
با فرض درستی حکم برای $n=k$ ثابت می‌کنیم حکم برای $n=k+1$ نیز برقرار است:

$$\begin{aligned} S_{k+1} &= S_k + \frac{1}{(k+1)^2} \leq \frac{3}{4} - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} \\ &= \frac{3}{4} - \frac{(k+1)^2 - k}{k(k+1)^2} = \frac{3}{4} - \frac{1}{k+1} \times \frac{k^2 + k + 1}{k^2 + 1} < \frac{3}{4} - \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$



ایستگاه دوم:

چند معمای زیبا از جزیره پرشگران!

یکی از دوستان من چندی پیش برای سیاحت و گردش به جزیره پرشگران رفته بود! همانجا که بود با من تماس گرفت و از زیبایی‌های آنجا برایم گفت و اضافه کرد: حتماً باید بیایی و اینجا را ببینی. به جز جاذبه‌های گردشگری مردم عجیبی هم دارد! آن‌ها فقط سؤال می‌کنند و به‌جز این چیز دیگری نمی‌گویند، و به همین ترتیب هم با هم ارتباط برقرار می‌کنند! عجیب آنکه آن‌ها دو نوع مختلف هم هستند: نوع A و نوع B. وقتی از دوستانم خواستم در مورد این دو نوع توضیح دهد، گفت: آن‌ها که نوع A هستند، فقط سؤال‌هایی می‌پرسند که پاسخ آن بله باشد و آن‌ها که نوع B هستند، فقط سؤال‌هایی می‌پرسند که پاسخ آن خیر باشد. مثلاً اگر کسی از شما بپرسد: «آیا آب مایع است؟» می‌فهمید که از نوع A است. اما اگر کسی از شما بپرسد: «آیا ۲ به اضافه ۲ می‌شود ۵؟» و یا بپرسد: «آیا ۲ به اضافه ۲ می‌شود ۶؟» می‌فهمید که او از نوع B است، زیرا پاسخ هر دوی این سؤالات خیر است.

گفتم: عجب! جالب است، باید خودم بیایم و ببینم!

معمای اول

دوستانم گفت: بین همین الان یک نفر آمده و به من می‌گوید: «آیا من از نوع B هستم؟» و من مانده‌ام چه بگویم! به نظر تو او از چه نوعی است؟ حالا خواننده عزیز، نظر شما چیست؟ او از چه نوعی است؟!

معمای سوم

به محض ورود به جزیره، یک زوج جوان را ملاحظه کردم که در حال قدم زدن بودند. آقا رو به من کرد و گفت: «آیا من و همسرم هر دو از نوع B هستیم؟» شما بگویید، او و همسرش هر کدام از چه نوعی هستند؟

معمای پنجم

بعد از آن یک زوج دیگر را دیدم. آقا رو به همسرش گفت: «آیا ما از دو نوع متفاوت هستیم؟» درباره نوع این دو نفر چه می‌توانید بگویید؟

معمای ششم

بعد از آن شهروند دیگری را ملاقات کردم. او از من پرسید: «آیا من از نوعی هستم که می‌تواند بپرسد: «آیا من از نوع B هستم؟» این شهروند از چه نوعی بود؟

معمای دوم

دوستانم بعد از توضیح من، حرفش را تصحیح کرد و گفت: بله ببخشید، او از من پرسید: «آیا من از نوع A هستم؟» حالا چه می‌گویید؟ شما بگویید او از چه نوعی است؟

معمای چهارم

کمی بعد به دو برادر برخوردیم. یکی از آن‌ها از دیگری پرسید: «آیا درست است که لااقل یکی از ما از نوع B است؟»

شما بگویید: این دو برادر هر یک از چه نوعی هستند؟

بعد از خداحافظی با دوستانم، هیجان‌زده بودم و می‌خواستم این مردم عجیب و غریب را ببینم. پس فوراً اقدام کردم و با اولین تور مسافرتی خودم را به این جزیره عجیب رساندم.





محمود داورزنی
کارشناس ارشد ریاضی و
دبیر ریاضی شهر ری

قضیه

تقسیم

اشاره

قضیه تقسیم به شکل $a=bq+r$ که در آن $a, b, q \in \mathbb{Z}$ و $r \in \mathbb{N}$ و $0 \leq r < |b|$ ، در بسیاری از مسائل دیده می‌شود و تقریباً برای حل تمامی این مسائل باید درباره پارامترهای این قضیه شناخت کافی داشت. در این مقاله ابتدا این قضیه را اثبات می‌کنیم و سپس چند مسئله برای درک بیشتر آورده می‌شود.

از تقسیم یک عدد طبیعی بر عدد طبیعی دیگر و تعیین خارج قسمت و باقی‌مانده، هر دانش‌آموزی در محاسبات خود بارها استفاده می‌کند. البته می‌توانیم یک عدد صحیح منفی را نیز بر یک عدد ناصفر دیگر تقسیم کنیم. قضیه مشهور زیر که به قضیه یا الگوریتم تقسیم معروف است، این ادعا را ثابت می‌کند.

قضیه تقسیم: فرض کنید a و b دو عدد صحیح باشند و $b \neq 0$. در این صورت اعداد صحیح و یکتای r و q وجود دارند، به طوری که: $a=bq+r$ ؛ $0 \leq r < |b|$.

اثبات: دنباله زیر از اعداد صحیح را در نظر بگیرید:

$$\dots, -2|b|, -|b|, 0, |b|, 2|b|, \dots$$

عدد صحیح a بین دو عضو متوالی این دنباله قرار دارد. به عبارت دیگر، عدد صحیح q وجود دارد به طوری که:

$$q|b| \leq a < (q+1)|b| \quad (1)$$

قرار دهید: $r=a-q|b|$ ، بنابراین طبق نامساوی (۱): $0 \leq r < |b|$. اگر: $b > 0$ ، سپس: $a=bq+r$ و $0 \leq r < b$ و اگر $b < 0$ ، آن‌گاه: $a=b(-q)+r$ و $0 \leq r < |b|$ بنابراین وجود r و

q اثبات می‌شود.

برای اثبات یکتایی q و r ، فرض کنید q' و r' دو عدد صحیح باشند که:

$$a=bq'+r'; 0 \leq r' < |b|$$

از مقایسه این تساوی با تساوی بالا داریم:

$$\begin{cases} a=bq+r \\ a=bq'+r' \end{cases} \Rightarrow bq+r=bq'+r' \Rightarrow b(q-q')=r'-r \\ \Rightarrow |b||q-q'|=|r-r'| \quad (2)$$

با توجه به اینکه: $0 \leq r' < |b|$ و $0 \leq r < |b|$ ، پس: $|r-r'| < |b|$. بنابراین تساوی (۲) به صورت زیر درمی‌آید:

$$|b||q-q'|=|r-r'| < |b| \Rightarrow |q-q'| < 1$$

و چون q و q' اعداد صحیح‌اند، باید: $q=q'$ و در ادامه داریم: $r=a-bq=a-bq'=r'$ ، بنابراین r و q یکتا هستند.

نکته: با توجه به قضیه تقسیم، خارج قسمت تقسیم عدد صحیح a بر عدد طبیعی b عبارت است از q که:

$$a=bq+r \Rightarrow \frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$$

$$\Rightarrow \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor = \left\lfloor q + \frac{r}{b} \right\rfloor = q + \left\lfloor \frac{r}{b} \right\rfloor = q + 0 = q, (0 \leq \frac{r}{b} < 1)$$

مسئله ۱: اگر $a=-20$ و $b=3$ ، خارج قسمت و باقی‌مانده تقسیم a را بر b پیدا کنید.

حل: ابتدا خارج قسمت را از نکته بالا پیدا

$$q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{-20}{3} \right\rfloor = -7$$

و سپس باقی‌مانده را از فرمول $a=bq+r$ محاسبه می‌کنیم: $-20=3(-7)+r \Rightarrow r=1$.

مسئله ۲: در تقسیم عدد a بر عدد طبیعی b ، باقی‌مانده ۱۷ و خارج قسمت ۲۵ است. اگر a مضرب ۶ باشد، کمترین مقدار ممکن برای a را به دست آورید.

حل: شکل مسئله را از قضیه تقسیم

می‌نویسیم:

$$a=bq+r \Rightarrow a=25b+17; 0 \leq 17 < b$$

بنابراین برای تعیین مقادیر a می‌توانیم مقادیر b را از نامساوی بالا به ترتیب قرار دهیم: $b=18, 19, 20, \dots$ برای اینکه a کوچک‌ترین عدد مضرب ۶ باشد، کافی است قرار دهیم: $b=19$ و از آنجا داریم: $a=25(19)+17=492$.

مسئله ۲: در تقسیم عدد a بر ۵۹ باقی مانده برابر ۱۵ است. اگر ۵۰ واحد به مقسوم اضافه کنیم، باقی مانده و خارج قسمت چه تغییری می کنند؟

حل: شکل مسئله را قبل و بعد از انجام تغییرات، از قضیه تقسیم می نویسیم:

$$\begin{cases} a = 59q + 15 \\ a + 50 = 59q + 15 + 50 = 59q + 65 \end{cases}$$

با توجه به اینکه ۶۵ نمی تواند باقی مانده تقسیم عدد $a + 50$ بر ۵۹ باشد، از عدد ۶۵ ، ۵۹ واحد کم می کنیم:

$$\begin{aligned} a + 50 = 59q + 65 &= 59q + 59 + 6 = 59(q+1) + 6 = 59q' + 6 \\ \text{و چون: } 0 \leq 6 < 59, &\text{ پس تساوی بالا یعنی} \\ a + 50 = 59q' + 6 &\text{ می تواند شکلی از قضیه تقسیم} \\ \text{باشد. بنابراین خارج قسمت یک واحد اضافه شده و} & \\ \text{باقی مانده } ۹ \text{ واحد کم شده است.} & \end{aligned}$$

مسئله ۴: باقی مانده تقسیم a و b بر ۱۵ به ترتیب ۷ و ۴ است. باقی مانده تقسیم $3a - 7b$ بر ۱۵ را به دست آورید.

حل:

$$\begin{cases} a = 15q_1 + 7 \\ b = 15q_2 + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} 3a - 7b &= 3(15q_1 + 7) - 7(15q_2 + 4) \\ &= 15(3q_1 - 7q_2) - 7 = 15q_3 - 7 \end{aligned}$$

تساوی $3a - 7b = 15q_3 - 7$ نمی تواند باقی مانده را از قضیه تقسیم به دست آورد، زیرا باقی مانده هیچ گاه منفی نیست. برای اینکه باقی مانده مثبت شود، به عدد -7 مضارب ۱۵ را اضافه و کم می کنیم:

$$\begin{aligned} 3a - 7b = 15q_3 - 7 &= 15q_3 - 15 + 15 - 7 \\ &= 15(q_3 - 1) + 8 = 15q_4 + 8 \end{aligned}$$

پس باقی مانده $3a - 7b$ بر ۱۵ برابر ۸ است.

مسئله ۵: در تقسیم a بر b باقی مانده ۶۵ و خارج قسمت ۱۷ است. حداکثر چند واحد می توانید به مقسوم علیه اضافه کنید بدون آنکه مقسوم و خارج قسمت تغییر کنند؟

حل: صورت مسئله را قبل و بعد از تغییرات به شکل قضیه تقسیم می نویسیم:

$$\begin{cases} a = 17b + 65 \\ a = 17(b+x) + r \end{cases}$$

اکنون باید بیشترین مقدار ممکن برای x را

به دست آوریم. از اختلاف این دو تساوی داریم:

$$\begin{aligned} 0 &= 17x + r - 65 \Rightarrow r = 65 - 17x \Rightarrow 65 - 17x \geq 0 \\ &\Rightarrow x \leq \frac{65}{17} \end{aligned}$$

و بنابراین بیشترین مقدار x برابر است با: $x=3$.

مسئله ۶: باقی مانده تقسیم a بر ۵ و ۳ به ترتیب برابر ۴ و ۱ است. باقی مانده تقسیم a بر ۱۵ را به دست آورید.

حل: شکل قضیه تقسیم را برای تقسیم a بر ۵ و ۳ می نویسیم:

$$\begin{cases} a = 5q + 4 \Rightarrow 3a = 15q + 12 \\ a = 3q' + 1 \Rightarrow 5a = 15q' + 5 \end{cases} \Rightarrow 5a - 3a = 15(q' - q) - 7 \\ \Rightarrow 2a = 15q'' - 7$$

برای رسیدن به جواب با کمک قضیه تقسیم، باید در تساوی بالا $2a$ را به a تبدیل کنیم.

برای این کار ابتدا -7 را به یک عدد زوج تبدیل می کنیم:

$$\begin{aligned} 2a = 15q'' - 7 &= 15q'' - 15 + 8 = 15(q'' - 1) + 8 \\ \Rightarrow 2a &= 15q_1 + 8 \end{aligned}$$

در تساوی بالا، $2a$ و ۸ زوج هستند، پس $15q_1$ و در نتیجه q_1 باید زوج باشد:

$$\begin{aligned} 2a = 15(2k) + 8 &= 30k + 8 \Rightarrow a = 15k + 4 \\ \text{یعنی باقی مانده تقسیم } a \text{ بر } ۱۵, ۴ \text{ است.} \end{aligned}$$

مسئله ۷: در تقسیم عدد طبیعی سه رقمی a بر عدد طبیعی b ، خارج قسمت ۲۱ و باقی مانده ۳۷ است. چند عضو از مجموعه جواب های a مضرب ۵ است؟

حل: مسئله را به شکل قضیه تقسیم می نویسیم:

$$a = 21b + 37; 37 < b$$

با توجه به اینکه $a < 1000$ داریم:

$$21b + 37 < 1000 \Rightarrow 21b < 963 \Rightarrow b < \frac{963}{21} \Rightarrow b < 45 \frac{6}{7}$$

پس: $37 < b < 45 \frac{6}{7}$. اکنون باید تمام مقادیر ممکن

برای b را در تساوی $a = 21b + 37$ قرار داد تا همه اعداد

مضرب ۵ برای a به دست آید. البته با توجه به اینکه:

$$a = (20+1)b + 37 = 20b + b + 37$$

باشد (رقم یکان a باید مضرب ۵ باشد) و از نامساوی

$$37 < b < 45 \frac{6}{7}$$

فقط دو عدد ۳۸ و ۴۳ به شکل $5k+3$ هستند.

از روابط طولی در دایره‌ها بیشتر بدانیم

اشاره


در کتاب درسی هندسه ۲ به تعدادی از رابطه‌های طولی در دایره اشاره شده است که مربوط به طول‌های قطعه‌ها و مماس‌ها در دایره می‌شوند. اما برخی رابطه‌های طولی دیگر در ارتباط با مثلث‌ها در دایره وجود دارند که به‌طور غیرمستقیم به بعضی از آن‌ها اشاره‌هایی شده است. چون آگاهی بیشتر از این رابطه‌ها، در حل بسیاری از مسائل به ما یاری می‌رساند، بر آن شدیم که به این رابطه‌ها اشاره‌هایی داشته باشیم. توصیه می‌کنیم که در حل تمرین‌های متن، قدم به قدم با ما همراه شوید تا در انتهای کار، به نتیجه مطلوب مقاله برسید.

الف) شعاع دایره محیطی مثلث

می‌دانیم که از سه رأس هر مثلث، یک و فقط یک دایره می‌گذرد، به‌طوری‌که مثلث در آن محاط شود و آن را دایره محیطی مثلث می‌گوییم. (سؤال: مرکز این دایره چگونه به‌دست می‌آید؟) حال اگر قطر گذرنده از یک رأس دلخواه (مثلاً B) را رسم کنیم (قطر BD) و D را به C وصل کنیم، مطابق شکل داریم:

$$\text{چرا؟} \quad \hat{D} = \hat{A} \quad \text{و} \quad \sin D = \frac{BC}{BD} \Rightarrow \Delta BDC : \hat{C} = 90^\circ \text{ (چرا؟)}$$

$$\Rightarrow \sin A = \frac{a}{2R} \Rightarrow a = 2R \sin A$$




سؤال:

اگر زاویه A منفرجه باشد، آیا استدلال فوق دچار اشکال نمی‌شود؟ با رسم یک شکل مشابه و استدلالی دیگر نشان دهید که در این حالت هم همین حکم برقرار است.
رابطه بالا که به «قضیه سینوس‌ها» هم معروف است، بین اضلاع و زاویه‌های یک مثلث رابطه‌ای مستقیم برقرار می‌سازد.

است؟) از آنجا که شعاع دایره بر مماس بر آن در نقطه تماس عمود می‌شود، لذا در شکل بالا داریم:

$$OH = OH' = OH'' = r$$



برای محاسبه اندازه شعاع این دایره، از O به A، B و C وصل می‌کنیم. به کمک مساحت‌ها داریم:

$$\begin{aligned} S_{ABC} &= S_{AOB} + S_{AOC} + S_{BOC} \\ \Rightarrow S &= \frac{1}{2} OH'' \cdot AB + \frac{1}{2} OH' \cdot AC + \frac{1}{2} OH \cdot BC \\ &= \frac{1}{2} c \cdot r + \frac{1}{2} b \cdot r + \frac{1}{2} a \cdot r = \frac{1}{2} (a + b + c) r \end{aligned}$$

و با فرض $a+b+c=2P$ نتیجه می‌شود: $S=Pr$

$$r = \frac{S}{P}$$

یعنی: «اندازه شعاع دایره محاطی داخلی هر مثلث برابر است با حاصل تقسیم مساحت مثلث بر نصف محیط آن.»

● **مثال ۳.** طول شعاع دایره محاطی داخلی مثلث قائم‌الزاویه‌ای را بیابید که طول‌های اضلاع زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی‌متر باشد.

حل: $b=3$ و $c=4$. به کمک قضیه فیثاغورس ($a^2 = b^2 + c^2$) وتر مثلث را به‌دست می‌آوریم: $a=5$ بنابراین:

$$2P = a + b + c = 12, P = 6$$

$$S = \frac{bc}{2} = 6 \Rightarrow r = \frac{S}{P} = 1$$

● **مثال ۴.** طول شعاع دایره محاطی داخلی مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a را بر حسب a به‌دست آورید.

حل: می‌دانیم: $S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$, $2P = a + a + a$

$$\begin{aligned} P &= \frac{3a}{2} \text{ و در نتیجه:} \\ r = \frac{S}{P} &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{4} a^2}{\frac{3a}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{6} a \end{aligned}$$

● **مثال ۱.** در مثلث ABC داریم: $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C$. این مثلث چه نوع است؟

حل: به کمک قضیه سینوس‌ها داریم:

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

و با توجه به فرض مسئله نتیجه می‌شود:

$$\frac{a^2}{4R^2} = \frac{b^2}{4R^2} + \frac{c^2}{4R^2} \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

یعنی مثلث در رأس A قائم‌الزاویه است.

● **مثال ۲.** در مثلث ABC، $a=8$ و $\hat{A} = 60^\circ$ مساحت دایره محاطی مثلث چه‌قدر است؟

حل:

$$2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{8}{\sin 60^\circ} = \frac{8}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{16}{\sqrt{3}} \Rightarrow R = \frac{8}{\sqrt{3}}$$

$$S = \pi R^2 = \frac{64\pi}{3}$$

■ **تمرین ۱.** اگر در مثلث ABC بین $BC=a$ و $AC=b$ رابطه $a^2 = 2bc \cos C$ برقرار باشد، نشان دهید که مثلث در رأس A متساوی‌الساقین است. (راهنمایی: a و b را به $\sin A$ و $\sin B$ و سمت راست رابطه حاصل را به مجموع تبدیل کنید.)

■ **تمرین ۲.** می‌دانیم که مساحت هر مثلث برابر است با نصف حاصل‌ضرب هر دو ضلع مثلث در سینوس زاویه بین آن‌ها. با توجه به این موضوع نشان دهید شعاع دایره محاطی هر مثلث از دستور $R = \frac{abc}{4S}$ نیز به‌دست می‌آید.

■ **تمرین ۳.** به کمک دستور تمرین ۲، شعاع دایره محاطی مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a را بر حسب a به‌دست آورید.


ب) دایره‌های محاطی مثلث و روابط طولی آن‌ها
۱. **دایره محاطی داخلی**

می‌دانیم که در هر مثلث، یک و تنها یک دایره قابل محاط شدن است و این دایره بر اضلاع مثلث در سه نقطه مماس می‌شود. (سؤال: مرکز این دایره چه نقطه‌ای

این نتیجه را به روش هندسی هم می‌توان به دست آورد (با رسم شکل امتحان کنید)، اما مسلماً این روش آسان‌تر است.

■ **تمرین ۴.** در مثلث متساوی‌الساقینی که طول قاعده آن ۱۲ واحد و طول ساق‌های آن ۱۰ واحد است، طول شعاع دایره محاطی را به دست آورید.

در ادامه یک ویژگی مهم دیگر دایره محاطی داخلی مثلث را شرح می‌دهیم. با توجه به ویژگی برابری مماس‌هایی که از هر نقطه خارج از دایره بر آن رسم می‌شوند، در شکل زیر داریم:



$$AM = AN, CN = CT, BT = BM$$

با جمع کردن طرفین این تساوی‌ها به ترتیب زیر نتیجه می‌شود:


$$\begin{aligned} AN + CN + BM &= AM + CT + BT \\ \Rightarrow AC + BM &= AM + BC \Rightarrow AM = AC + BM - BC \\ &= AC + AB - AM - BC \Rightarrow 2AM = AB + AC - BC \\ \Rightarrow 2AM &= (AB + AC + BC) - 2BC = 2P - 2a \\ \Rightarrow AM &= AN = P - a \end{aligned}$$

■ **نتیجه:** در هر مثلث، طول‌های قطعات مماس بر دایره محاطی مثلث برابر است با نصف محیط مثلث منهای ضلع مقابل به هر قطعه؛ یعنی داریم:

$$AM = AN = P - a, CN = CT = P - c, BM = BT = P - b$$


● **مثال ۵.** ثابت کنید مساحت هر مثلث قائم‌الزاویه با وتر a و نصف محیط p برابر است با: $S = P(P - a)$.

■ **حل:** مطابق شکل، دایره $C(O, r)$ در مثلث قائم‌الزاویه ABC محاط شده است. چون داریم: $\hat{A} = \hat{M} = \hat{N} = 90^\circ$ و $AM = AN$ و $OM = ON$ ، پس $ANOM$ مربع است و $ON = AN$. بنابراین: $r = p - a$ و از آنجا: $\frac{S}{p} = p - a$ و $S = P(P - a)$.



● **مثال ۶.** نقطه P را درون مثلث ABC اختیار می‌کنیم. خطوط راست BP و CP اضلاع روبه‌رو را به ترتیب در B_1 و C_1 قطع می‌کنند. اگر بدانیم هم مساحت‌ها و هم محیط‌های دو مثلث PBC_1 و PBC_1 با هم برابرند، ثابت کنید P روی نیم‌ساز درونی A قرار دارد (المپیاد ریاضی ایران - ۱۳۷۲).

■ **حل:** اگر محیط و مساحت مثلث PCB_1 را با $2P$ و S و محیط و مساحت مثلث PBC_1 را با $2P'$ و S' نمایش دهیم، طبق فرض: $S = S'$ و $P = P'$.



در نتیجه: $\frac{S}{P} = \frac{S'}{P'}$ و لذا: $r = r'$ با فرض اینکه O مرکز دایره محاطی مثلث PBC_1 و O' مرکز دایره محاطی داخلی مثلث PC_1B باشد، چون O و O' نقطه هم‌رسی نیم‌سازهای زوایای داخلی دو مثلث‌اند، پس PO و PO' نیم‌سازهای دو زاویه متقابل به رأس و روی یک خط هستند. لذا: $\angle OPH = \angle O'PH'$ و چون $r = r'$ پس: $OH = O'H'$. در نتیجه مثلث‌های OHP و $O'H'P$

با تکمیل راه حل، درستی رابطه زیر را نتیجه بگیرید:

$$r_a = \frac{S}{P-a}$$

به طریقه مشابه داریم: $r_b = \frac{S}{P-b}$ و $r_c = \frac{S}{P-c}$

■ **تمرین ۵.** دوائر محاطی خارجی متناظر با رأس‌های A، B و C را در یک شکل رسم کنید.

ویژگی مهم دیگری نیز در شکل فوق قابل تشخیص است. با توجه به برابری مماس‌ها داریم:

$$\left. \begin{aligned} AH &= AC + CH, CH = CH' \\ AH'' &= AB + BH'', BH'' = BH' \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} AH = AC + CH' \\ AH'' = AB + BH' \end{cases}$$

$$AH = AH'' \Rightarrow 2AH = AB + AC + BC = 2P$$

$$\Rightarrow AH = AH'' = P$$

یعنی: «مماس‌های رسم شده بر دایره محاطی خارجی هر رأس برابر با نصف محیط مثلث است.»

نتیجه: با تغییر مکان H' روی کمان HH'' و تغییر طول BC و جای B و C، محیط مثلث ABC تغییر نمی‌کند و ثابت می‌ماند. (چرا؟)

هم‌نهشت‌اند (ض‌ض) و: $PH=PH'$. اما طبق آنچه که در مورد طول‌های مماس‌ها گفتیم (به دایره‌های محاطی مثلث‌های PBC_1 و PCB_1 که رسم نشده‌اند و در نقاط H و H' بر PC و PB مماس هستند، دقت کنید) داریم:

$$P-B_1C = P'-BC_1, P = P' \Rightarrow B_1C = BC_1$$


حال اگر ارتفاع‌های رأس P دو مثلث را h' و h بنامیم، نتیجه می‌شود:

$$S = S' \Rightarrow \frac{1}{2} B_1C \cdot h = \frac{1}{2} BC_1 \cdot h' \Rightarrow h = h'$$

یعنی P از AB و AC به یک فاصله و در نتیجه روی نیم‌ساز زاویه A است.

۲. دایره محاطی خارجی

در هر مثلث، نیم‌سازهای هر دو زاویه خارجی و نیم‌ساز زاویه داخلی سوم، در یک نقطه هم‌رس‌اند. مثلاً در شکل روبه‌رو، نیم‌ساز زاویه A و دو نیم‌ساز زوایای خارجی B و C در یک نقطه هم‌رس‌اند (چرا؟) با توجه به ویژگی نیم‌سازها (هر نقطه روی نیم‌ساز زاویه، از دو ضلع زاویه به یک فاصله است)، اگر نقطه هم‌رسی این سه نیم‌ساز O باشد، داریم: $OH=OH'$ و $OH=OH''$ و لذا: $OH=OH'=OH''$



پس دایره‌ای به مرکز O و به شعاع OH، در نقاط H و H' بر امتدادهای AB و AC و بر مماس BC مماس است. این دایره را دایره محاطی خارجی رأس A می‌نامیم (این دایره بر BC مماس است و روبه‌رو به رأس A است) و شعاع آن را با r_a نمایش می‌دهیم. برای محاسبه r_a به کمک مساحت‌ها می‌نویسیم:

$$S_{ABC} = S_{OAB} + S_{OAC} - S_{OBC}$$

پرسش‌های پیکارجو!



همه سه‌تایی‌های صحیح (x, y, z) که در معادله $2^x + 2^y = 2^z$ صدق می‌کنند، روی کدام صفحه زیر واقع‌اند؟

(الف) $x+y=z$ (ب) $x+y=2z-1$ (ج) $x+y=2z-2$

(د) $x+2y=2z-1$ (ه) $x+2y=3z-3$



حسین کریمی
دبیر ریاضی شهر تهران


هندسه ۱

کاربردی از تشابه در واسطه‌های هندسی و توافقی

ب) اندازه هر ضلع در مثلث قائم‌الزاویه، واسطه هندسی است بین اندازه وتر و تصویر قائم آن ضلع روی وتر: $AB^2 = BH \times BC$ و $AC^2 = CH \times BC$.

اکنون به طرح و حل چند مسئله هندسی درباره واسطه هندسی می‌پردازیم.

مسئله ۱. در مثلث قائم‌الزاویه‌ای اندازه‌های دو پاره خطی که ارتفاع نظیر رأس قائمه بر وتر جدا می‌کند، m^2a و $(1-m^2)a$ هستند ($|m| < 1$). اندازه‌های سه ضلع مثلث و ارتفاع وارد بر وتر را بر حسب m و a به دست آورید.



حل:

$$BC = BH + HC = m^2a + (1-m^2)a = a$$

$$AH^2 = BH \times HC = m^2a^2(1-m^2)$$


$$\Rightarrow AH = ma\sqrt{1-m^2}$$

$$AB^2 = BH \times BC = m^2a \times a \Rightarrow AB = ma$$

$$AC^2 = CH \times BC = (1-m^2)a \times a$$


$$\Rightarrow AC = a\sqrt{1-m^2}$$

مسئله ۲. زاویه $\angle XOY$ را در نظر بگیرید. نقاط دلخواه A و B را روی OX انتخاب و از آن نقاط دو خط موازی رسم کنید تا OY را به ترتیب در نقاط M و N قطع کنند. از N به موازات MB ، خطی رسم کنید تا OX را در C قطع کند، ثابت کنید OB واسطه هندسی است بین OA و OC : $OB^2 = OA \times OC$.



در کتاب درسی با واسطه هندسی آشنا شدیم و دیدیم که x را واسطه هندسی بین دو عدد a و b گویند، هرگاه داشته باشیم: $x^2 = a \times b$. با استفاده از تشابه، کاربردهایی از واسطه هندسی را در مسئله‌های ۱۲ و ۱۵ صفحه ۶۵ کتاب درسی هندسه ۱ مشاهده کردیم که در آن‌ها داشتیم:

الف) ارتفاع وارد بر وتر در مثلث قائم‌الزاویه، واسطه هندسی است بین دو قطعه‌ای که آن ارتفاع روی وتر جدا می‌کند: $AH^2 = BH \times HC$.



حل:

$$\triangle OBN (AM \parallel BN) \Rightarrow \frac{OA}{OB} = \frac{OM}{ON} \quad (1)$$

$$\triangle OCN (BM \parallel NC) \Rightarrow \frac{OB}{OC} = \frac{OM}{ON} \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow \frac{OA}{OB} = \frac{OB}{OC} \Rightarrow OB^2 = OA \times OC$$

حل:

$$\triangle AMB : \hat{M}_1 = \hat{B} + \hat{C}, \triangle ACN : \hat{N}_1 = \hat{B} + \hat{C}$$

$$\Rightarrow \hat{M}_1 = \hat{N}_1 \Rightarrow AM = AN \quad (1)$$

$$\triangle AMB \sim \triangle ANC \Rightarrow \frac{AM}{MB} = \frac{NC}{AN}$$

$$\Rightarrow AM \cdot AN = BM \cdot CN \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow AN^2 = AM^2 = BM \cdot CN$$

اکنون با واسطه دیگری به نام «واسطه توافقی» آشنا

می‌شویم: عدد x را واسطه توافقی بین a و b گویند.

$$\text{هرگاه: } \frac{2}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

مسئله ۵: واسطه توافقی بین دو عدد ۳ و ۷ را بیابید.

حل:


$$\frac{2}{x} = \frac{1}{3} + \frac{1}{7} \Rightarrow \frac{2}{x} = \frac{10}{21} \Rightarrow x = \frac{42}{10} = 4 \frac{2}{5}$$

مسئله ۶: در دوزنقه ABCD، از نقطه P محل تلاقی

اقطار، خطی به موازات AB و CD رسم می‌کنیم

تا ساق‌ها را در نقاط E و F قطع کند. ثابت کنید:

$$\frac{2}{EF} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{CD}$$



حل:

$$\triangle ABP \sim \triangle PCD \Rightarrow \frac{AP}{PC} = \frac{BP}{PD} = \frac{AB}{CD} \quad (1),$$

$$\frac{CP}{CA} = \frac{DP}{DB} \quad (2)$$

$$\triangle ABC (PF \parallel AB) \Rightarrow \frac{CP}{CA} = \frac{PF}{AB} \quad (3)$$

$$\triangle ABD (PE \parallel AB) \Rightarrow \frac{DP}{DB} = \frac{PE}{AB} \quad (4)$$

$$(2), (3), (4) \Rightarrow PE = PF \quad (5)$$

$$(4) \Rightarrow \frac{AB}{PE} = \frac{BD}{PD} \Rightarrow \frac{AB}{PE} = \frac{PD + PB}{PD}$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{PE} = 1 + \frac{PB}{PD} \stackrel{(1)}{\Rightarrow} \frac{AB}{PE} = 1 + \frac{AB}{CD}$$

حل:

$$\triangle AMD \sim \triangle BMN \Rightarrow \frac{AM}{MN} = \frac{MD}{MB} \quad (1)$$

$$\triangle AMB \sim \triangle DML \Rightarrow \frac{MD}{MB} = \frac{ML}{AM} \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow \frac{AM}{MN} = \frac{ML}{AM} \Rightarrow AM^2 = MN \cdot ML$$


مسئله ۴: در مثلث ABC، زاویه A از دو زاویه B و

C بزرگ‌تر است. بر ضلع BC نقاط M و N را چنان

اختیار می‌کنیم که AM و AN به ترتیب با اضلاع AB

و AC زاویه‌های مساوی B و C تشکیل دهند. ثابت

کنید: $AN^2 = AM^2 = BM \cdot CN$



حل:

$$\triangle ABM \sim \triangle MDL \Rightarrow \frac{BM}{MD} = \frac{AB}{DL}$$

$$\frac{AB=CD}{\Rightarrow} \frac{BM}{MD} = \frac{CD}{DL} \quad (1)$$

$$CN \parallel AD \Rightarrow \frac{CD}{DL} = \frac{AN}{AL} \Rightarrow \frac{BM}{MD} = \frac{AN}{AL} \quad (2)$$

$$\triangle AMD \sim \triangle BMN \Rightarrow \frac{BM}{MD} = \frac{MN}{AM} \Rightarrow \frac{MN}{AM} = \frac{AN}{AL}$$


$$\Rightarrow 1 + \frac{MN}{AM} = 1 + \frac{AN}{AL} \Rightarrow \frac{AN}{AM} = 1 + \frac{AN}{AL}$$

که با تقسیم طرفین تساوی بر AN داریم:

$$\frac{1}{AM} = \frac{1}{AN} + \frac{1}{AL} \quad \text{و چون: } AK = 2 \times AM \text{ پس:}$$

$$\frac{2}{AK} = \frac{1}{AN} + \frac{1}{AL}$$

توجه داشته باشید که اگر CK را امتداد دهیم تا امتداد AB را در F قطع کند، BFGD متوازی الاضلاع خواهد بود و: BF=CD، یعنی AB=BF. پس در مثلث AFK، B، وسط AF و BM||FK که نشان می‌دهد M وسط AK است.



حال با تقسیم طرفین تساوی بر AB داریم:


$$\frac{1}{PE} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} \quad \text{که با توجه به (5)، داریم: } PE = \frac{1}{2} EF$$

$$\text{بنابراین: } \frac{2}{EF} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{CD}$$

تذکر: در واقع اندازه پاره خط گذرا از محل تلاقی قطرهای دوزنقه و موازی با دو قاعده و محدود به ساق‌ها، واسطه توافقی است بین اندازه دو قاعده دوزنقه.

مسئله ۷. در متوازی‌الاضلاع ABCD از نقطه A

خطی رسم می‌کنیم تا قطر BD و خطوط BC و CD (و یا امتداد آن‌ها) را به ترتیب در نقاط M، N و L قطع کند (تا اینجا همان مشخصات مسئله ۳ بیان شد). از C به موازات BD خطی رسم می‌کنیم تا AL را در K قطع کند. ثابت کنید AK واسطه توافقی بین AN و AL است.



پرسش‌های
پیکار جو!



عدد ۳۰۰۳۰ را به چند طریق می‌توان به صورت حاصل ضرب سه عدد طبیعی بزرگ‌تر از ۱ نوشت؟

الف) ۱۲۰ ب) ۹۰ ج) ۱۰۰ د) ۱۸۰ ه) ۴۵

مسئله‌ها،

رگ‌هایی هستند که به بدن
ریاضیات خون می‌رسانند.

زنده‌یاد دکتر محسن هشتروری



لطیفه سوم

در یک مسابقه تلویزیونی از یک ریاضی دان پرسیدند: «فرض کنید در یک خیابان در حال حرکت هستید و ناگهان می بینید که خانه آن طرف خیابان در حال سوختن در آتش است و ماشین آتش نشانی بدون راننده و سرنشین در سمت مقابل متوقف است و شیلنگ شیر آب آن در همان نزدیکی جدا از مخزن روی زمین افتاده است. چه می کنید؟»

ریاضی دان گفت: «شیلنگ را به سرعت به مخزن آب وصل می کنم و با فشار آب، آتش را مهار می کنم.»
مجری گفت: «بسیار خوب، حالا فرض کنیم در همان خیابان در حال عبور هستید، همان ماشین همان جاست. شیلنگ آب در جای خود وصل است و خانه مقابل هم در حال سوختن در آتش نیست. حالا چه می کنید؟»

ریاضی دان گفت: «شیلنگ را از جای خود درمی آورم و خانه را آتش می زنم. حالا مسئله ما، همان مسئله قبلی است!»

لطیفه اول

در یکی از شهرهای انگلستان و در یکی از مدارس ابتدایی، خانم معلم از یکی از دانش آموزان پرسید: نصف عدد هشت چه عددی می شود؟ و دانش آموز گفت: ببخشید خانم، افقی یا عمودی؟!
معلم با تعجب گفت: منظورت چیه؟ و دانش آموز گفت: اگر منظور تان نصف افقی باشد، جواب صفر است، ولی اگر منظور تان نصف عمودی باشد، جواب ۳ است!



لطیفه دوم

اما در همان کلاس درس، خانم معلم که از پاسخ آن دانش آموز حیرت زده بود، یکی دیگر از بچه ها را پای تخته برد و برای آنکه مفهوم عدد و محاسبه را به دانش آموزان یاد بدهد، به او گفت: ببین عزیزم، این یک سبد خالی است. حالا بگو ببینم چند تا تخم مرغ می توانیم توی آن بگذاریم؟ و دانش آموز گفت: یکی! معلم با تعجب گفت: فقط یکی، چرا؟ و دانش آموز گفت: آخر بعد از اینکه یک تخم مرغ توی آن گذاشتیم، دیگر سبد خالی نیست!






سعدالله قصابی
دبیر ریاضی شهرستان بانه

روش‌های برای محاسبه سینوس

اشاره

در این مقاله روشی برای محاسبه سینوس زوایای دلخواه ارائه می‌شود که به کمک آن می‌توان سایر نسبت‌های مثلثاتی را نیز به دست آورد.

با توجه به شکل ۲ داریم: $\sin 15^\circ = \frac{BC}{AB}$



شکل ۲

BC را به اندازه خودش تا نقطه D امتداد می‌دهیم و سپس D را به A وصل می‌کنیم. در این صورت دو مثلث همنهشت ABC و ADC و زاویه BAD مساوی ۳۰ درجه به دست می‌آید. عمود BE را بر AD فرود می‌آوریم؛ مثلث قائم‌الزاویه BAE با زاویه ۳۰ درجه (زاویه BAE) به دست می‌آید و بنابراین $BE = \frac{AB}{2}$ می‌شود.

حال AE را از مثلث ABE طبق رابطه فیثاغورث به دست می‌آوریم:


$$(AE)^2 = (AB)^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}(AB)^2$$

$$AE = \frac{AB}{2} \sqrt{3} \approx 0.866AB$$

$$\Rightarrow ED = AD - AE \approx AB - 0.866AB \approx 0.134AB$$

سینوس یک زاویه حاده چیست؟ در مثلث قائم‌الزاویه، سینوس زاویه حاده برابر است با: نسبت ضلع روبه‌رو به این زاویه به وتر. یک روش محاسبه برای زاویه‌های خیلی کوچک این است که نسبت قوس را به شعاع حساب کنیم. مثلاً برای زاویه ۱ درجه داریم:

$$\sin 1^\circ \approx \frac{\widehat{BD}}{AB} \quad / \quad (\text{شکل ۱})$$



شکل ۱

که داریم: $\widehat{BD} = \frac{2\pi R}{360}$ و در آن: $\pi = 3.14159...$ و $AB=R$

$$\sin 1^\circ \approx \frac{2\pi R}{360 \cdot R} = \frac{\pi}{180} \approx 0.0175$$

و به همین ترتیب می‌توان به دست آورد:

$$\sin 2^\circ \approx 0.0349 \quad \sin 3^\circ \approx 0.0524$$

$$\sin 4^\circ \approx 0.0698 \quad \sin 5^\circ \approx 0.0873$$

حال اگر سینوس ۳۰ درجه را با روش فوق محاسبه کنیم، عدد 0.524 را به جای 0.500 به دست می‌آوریم که خطای حاصل $\frac{24}{500}$ ، یعنی نزدیک ۵ درصد خواهد بود و این بیش از اندازه زیاد است. برای اینکه بتوانیم مرزی برای روش فوق پیدا کنیم، سینوس زاویه ۱۵ درجه را با دقت محاسبه می‌کنیم:

$$\sin 45^\circ - \sin 30^\circ \approx 0.707 - 0.5 = 0.207$$

$$\rightarrow \frac{0.207}{15} = 0.014$$

اگر این مقدار را مرتباً به سینوس ۳۰ درجه اضافه کنیم به دست می‌آید:

$$\sin 31^\circ \approx 0.5 + 0.014 = 0.51$$

$$\sin 32^\circ \approx 0.5 + 0.028 = 0.53$$


.

.

$$\sin 40^\circ \approx 0.5 + 0.14 = 0.64$$

حال به محاسبه سینوس زاویه‌های حاده بزرگ‌تر از ۴۵ درجه می‌پردازیم. به این منظور می‌توان از قضیه فیثاغورث استفاده کرد.

فرض می‌کنیم که بخواهیم سینوس زاویه ۵۳ درجه را محاسبه کنیم. باید نسبت $\frac{BC}{AB}$ را به دست آوریم (شکل ۳).



شکل ۳

چون داریم: $\hat{B} = 37^\circ$ ، پس می‌توان سینوس آن را به روش قبل محاسبه کرد:

$$\sin 37^\circ \approx 0.5 + (7 \times 0.014) \approx 0.6$$

از طرف دیگر داریم: $\sin \hat{B} = \frac{AC}{AB}$

بنابراین: $AC \approx 0.6AB$ و لذا داریم:

$$\begin{aligned} (AB)^2 &= (AC)^2 + (BC)^2 \\ \Rightarrow BC &= \sqrt{(AB)^2 - (AC)^2} \approx \sqrt{(AB)^2 - (0.6AB)^2} \\ &\approx AB\sqrt{1 - 0.36} \approx 0.8AB \\ \Rightarrow \sin 53^\circ &= \frac{BC}{AB} \approx \frac{0.8AB}{AB} \approx 0.8 \end{aligned}$$

حال در مثلث BED طول BD را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} (BD)^2 &= (BE)^2 + (ED)^2 \approx \left(\frac{AB}{2}\right)^2 + (0.124AB)^2 \\ &\approx 0.268(AB)^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow BD \approx \sqrt{0.268(AB)^2} \approx 0.518AB$$

$$\Rightarrow BC = \frac{BD}{2} \approx \frac{0.518AB}{2} \approx 0.259AB$$

$$\sin 15^\circ = \frac{BC}{AB} \approx \frac{0.259AB}{AB} \approx 0.259$$

اگر به سه رقم اعشار اکتفا کرده باشیم، این عدد همان عددی است که در جدول‌ها برای $\sin 15^\circ$ ثبت شده است. حالا اگر مقدار آن را با روش نسبت قوس بر شعاع محاسبه کنیم، به عدد ۰/۲۶۲ می‌رسیم. با مقایسه دو عدد ۰/۲۶۲ و ۰/۲۵۹ می‌بینیم که اگر هر دو را تا دو رقم اعشار گرد کنیم، به عدد ۰/۲۶ می‌رسیم. خطای حاصل از تبدیل مقدار دقیق‌تر ۰/۲۵۹ به ۰/۲۶ مساوی $\frac{1}{1000}$ است؛ یعنی قریب ۰/۴ درصد که این مقدار خطا برای محاسبه‌های عادی مانعی ندارد.

برای زاویه‌های بین ۱۵ درجه و ۳۰ درجه می‌توانیم از تناسب استفاده کنیم. به این ترتیب استدلال می‌کنیم که اختلاف بین $\sin 30^\circ$ و $\sin 15^\circ$ برابر است با:

$$0.50 - 0.26 = 0.24$$

با اضافه شدن یک درجه به زاویه، سینوس آن به اندازه $\frac{1}{15}$ این اختلاف، یعنی به اندازه ۰/۰۱۶ $= \frac{0.24}{15}$ زیاد می‌شود. خطای این روش $\frac{1}{1000}$ است که در محاسبات تقریبی خود از آن صرف‌نظر می‌کنیم.

به این ترتیب با اضافه کردن ۰/۰۱۶ به سینوس ۱۵ درجه به‌طور متوالی سینوس زاویه‌های ۱۶ درجه، ۱۷ درجه و غیره به دست می‌آید:

$$\sin 16^\circ \approx 0.26 + 0.016 = 0.28$$

$$\sin 17^\circ \approx 0.26 + 0.032 = 0.29$$


$$\sin 25^\circ \approx 0.26 + 0.16 = 0.42$$

به همین ترتیب می‌توان سینوس زاویه‌های بین ۳۰ درجه و ۴۵ درجه را محاسبه کرد.

مسائل برای حل

هوشنگ شرقی، محمدرضا امیری

۳. در شکل زیر داریم: $\hat{M}_1 = \hat{A}$ و N وسط AC است. ثابت کنید:
 $AC^2 = 2MC \cdot BC$



۲

هندسه

۱. مثلث ABC را با داشتن اندازه‌های BC، \hat{A} و S (مساحت) رسم کنید.

۲. دایره‌ای در نقطه M وسط پاره خط AB، بر این پاره خط مماس شده است. از نقطه T روی دایره به A و B وصل کرده‌ایم، به‌طوری‌که TA و TB دایره را در نقاط P و Q قطع کرده‌اند و داریم: $AP = BQ$. ثابت کنید: $\widehat{MP} = \widehat{MQ}$

۳. دایره‌های $C(O, 2)$ و $C'(O', 2\sqrt{2})$ در نقاط A و B متقاطع‌اند. اگر $AB = 2\sqrt{2}$ باشد، مساحت ناحیه محدود به دو دایره را بیابید.

۲

ریاضی

۱. معادله $\log(2^{x+2} - 1) = (x+1) \log 4$ را حل کنید.

۲. فقط با استفاده از دایره مثلثاتی و رسم، مقدار x را از معادله $\sin(x + \frac{\pi}{4}) = -\frac{1}{2}$ در بازه $[0, 2\pi]$ به‌دست آورید.

۳. مقدار عددی A را به‌دست آورید:

$$A = \sin \frac{13\pi}{7} \cdot \cos \frac{9\pi}{14} + \cos \frac{12\pi}{7} \cdot \sin \frac{5\pi}{14}$$




۱

هندسه


۱. مثلث‌های ABC و $A'B'C'$ متشابه‌اند و: $AB > AC$. در مثلث ABC، AD و AH به ترتیب نیم‌ساز و ارتفاع رأس A و در مثلث $A'B'C'$ ، $A'D'$ و $A'H'$ نیم‌ساز و ارتفاع رأس A' هستند. ثابت کنید مثلث‌های AHD و $A'H'D'$ متشابه‌اند.

۲. در شکل زیر دو زاویه N_1 و B مکمل یکدیگرند. اگر $AM = 4\text{cm}$ و $AC = 12\text{cm}$ باشد، مساحت مثلث ABC چند برابر مساحت مثلث AMN است؟




حسابان

۱. عکس تابع کسینوس را تابع سکانت می‌نامیم؛ یعنی: $\sec x = \frac{1}{\cos x}$
در شکل زیر نشان دهید مقدار $\sec x$ از طریق محوری که در امتداد محور کسینوس‌ها در خارج دایره رسم می‌شود، به‌دست می‌آید. سپس با توجه به این موضوع جدول تغییرات تابع سکانت را در یک دوره تناوب رسم کنید.



۲. با استفاده از شکل زیر نشان دهید: $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ و با استفاده از این دستور، مقدارهای $\tan 15^\circ$ و $\tan 22.5^\circ$ را به‌دست آورید.



۳. ثابت کنید:

$$\cos 11\alpha + 3\cos 9\alpha + 3\cos 7\alpha + \cos 5\alpha = 4\cos \alpha \cos^3 \alpha \quad (\text{الف})$$

$$4\cos^3 \alpha \sin^3 \alpha + 4\sin^2 \alpha \cos^3 \alpha = 3\sin^4 \alpha \quad (\text{ب})$$

دیفرانسیل و انتگرال

۱. مشتق‌پذیری تابع f با ضابطه $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}}$ را در مبدأ مختصات بررسی کنید.

۲. اگر خط مماس بر منحنی تابع f ، در نقطه A به عرض ۳ واقع بر آن



با محور x زاویه 60° بسازد و: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x) - g(3)}{x - 3} = -2$ آهنگ لحظه‌ای تغییر تابع g نسبت به x در نقطه A را به‌دست آورید.

۳. اگر تابع f با ضابطه $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c & x \geq 1 \\ \sin \frac{\pi x}{2} & x < 1 \end{cases}$ در \mathbb{R} مشتق‌پذیر از مرتبه دوم باشد، c را به‌دست آورید.

۳

ریاضیات

۱. با توجه به نمودار داده شده، حد هر تابع را در نقاط به طول‌های داده شده بررسی کنید:



۲. اگر $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^3 - 4x^2 + 3x - 2}{\Delta x^2 - 7\Delta x + 2} = a$ و $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x^2 - 16}}{\sqrt{x^2 - 3x - 4}} = b$ حاصل $a+b$ را بیابید.

۳. اگر $\frac{\tan 4x}{2x} \leq f(x) \leq \frac{1 - \cos 2x}{2}$ در این صورت $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ را به‌دست آورید.

ریاضیات گسسته

۱. چه تعداد جواب صحیح و نامنفی برای معادله $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 13$ با شرط‌های $x_1 > 2$ و $x_2 \geq 4$ وجود دارد؟

۲. می‌خواهیم از بین پنج نوع غذا ۱۱ پرس غذا سفارش دهیم. این عمل به چند طریق انجام‌پذیر است. هرگاه بخواهیم از هر نوع غذا حداقل یک پرس سفارش دهیم؟

۳. چند رابطه می‌توان روی مجموعه $\{2, 4, 6\}$ تعریف کرد که انعکاسی نباشند؟

۲. در نمودار تابع با ضابطه $f(x) = x(x-1)(x+2) + 2$ چند نقطه عطف وجود دارد؟

۳. فاصله بین دو مجانب مایل تابع با ضابطه $f(x) = \frac{x^2 + 2|x| + 7}{x}$

را بیابید؟

جبر و احتمال

۱. رابطه R روی مجموعه ۶ عضوی A ، دو کلاس هم‌ارزی پدید آورده است. این رابطه حداکثر چند عضو می‌تواند داشته باشد؟

۲. در مجموعه $A = \{2, 4, 6, \dots, 10\}$ رابطه $R = \{(x, y) | x, y \in A, x|y\}$ تعریف شده است. R را به صورت مجموعه‌ای از زوج‌های مرتب بنویسید و دامنه و برد R را تعیین کنید.

۳. در پرتاب یک تاس، اگر ۶ ظاهر شود، مجاز به پرتاب دوم هستیم. در غیر این صورت دو سکه پرتاب می‌کنیم. فضای نمونه‌ای این آزمایش چند عضو دارد؟

ریاضی عمومی تجربی

۱. ماکزی‌مم و مینی‌مم مطلق تابع با ضابطه $f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$ را در فاصله $[0, \pi]$ پیدا کنید.

هندسه تحلیلی

۱. نقطه $A(x, y)$ با مختصات مثبت در صفحه مختصات چنان حرکت می‌کند که مربع فاصله آن از نقطه $(1, -2)$ ، چهار برابر فاصله آن از محور عرض‌هاست. در مکان هندسی نقطه A بیشترین فاصله دو نقطه از یکدیگر را بیابید.

۲. نقطه $A(2\sqrt{5}, b)$ در ربع اول و مرکز دایره‌ای است که بر دو خط به معادله‌های $y = \frac{1}{4}x$ و $y = 2x$ مماس است. مساحت این دایره را پیدا کنید.

۳. از نقاط واقع بر منحنی به معادله $x^2 + y^2 = 1$ ، مماس‌هایی بر مقطع مخروطی به معادله $x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$ رسم کرده‌ایم.

الف) طول بزرگ‌ترین مماس رسم شده را بیابید.

ب) طول مماس مشترک خارجی این دو دایره را پیدا کنید.

ج) معادله مماس مشترک داخلی این دو دایره را بنویسید.

پرسش‌های پیکار جو!



تابع $f: N \rightarrow R$ مفروض است و داریم:

$f(m+n) = f(m) + f(n) + f(mn)$. مقدار $f(1395)$ کدام است؟


الف) ۱- ب) ۰ ج) ۱ د) ۲ ه) 2×1395

هر ریاضی‌دان وقتی کامل است
که تا اندازه‌ای هم شاعر باشد!

وایر اشتراوس

راهنمای
حل
مسائل

آمادگی برای آزمون‌های مستمر



بنابراین برای یافتن مقدار $\sec\alpha$ ، از انتهای کمان X مماسی بر دایره مثلثاتی رسم می‌کنیم. فاصله نقطه برخورد این مماس و امتداد محور کسینوس‌ها، از مرکز دایره، با در نظر گرفتن جهت، مقدار $\sec\alpha$ را مشخص می‌کند و چون این نقطه همواره در خارج دایره است، لذا همواره داریم: $\sec\alpha \geq 1$ یا $\sec\alpha \leq -1$. این موضوع با توجه به اینکه $1 \leq \cos\alpha \leq -1$ نیز روشن است. جدول تغییرات $\sec\alpha$ نیز با توجه به دایره مثلثاتی به این صورت خواهد بود:

X	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sec x	1	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	1

۲. در مثلث قائم الزاویه AMH، با توجه به ویژگی زاویه محاطی داریم: $\hat{A} = \frac{x}{2}$ اکنون $\tan A$ را از روی تعریف بنویسید و با توجه به تعریف نسبت‌های مثلثاتی زاویه x ، در دایره مثلثاتی، درستی تساوی را نتیجه بگیرید. سپس در اتحاد $\hat{A} = \frac{x}{2}$ ، به جای x مقادیر 30° و 45° را قرار دهید. (جواب: $\tan 22.5^\circ = \sqrt{2} - 1$ و $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$)


٣. الف)

$$\begin{aligned} \text{سمت چپ} &= (\cos \lambda \alpha + \cos \delta \alpha) + r(\cos \lambda \alpha + \cos \gamma \alpha) \\ &= (r \cos \lambda \alpha \cos r \alpha) + r(r \cos \lambda \alpha \cos \alpha) \\ &= r \cos \lambda \alpha (\cos r \alpha + r \cos \alpha) \\ &= r \cos \lambda \alpha (r \cos^r \alpha - r \cos \alpha + r \cos \alpha) \\ &= \lambda \cos \lambda \alpha \cos^r \alpha \end{aligned}$$

(پ)

$$\begin{aligned} \text{سمت } \hat{r} &= r \cos \alpha (r \sin \alpha - r \sin^T \alpha) + r \sin^T \alpha (r \cos^T \alpha \\ &\quad - r \cos \alpha) = 1 r \cos \alpha \sin \alpha (\cos^T \alpha - \sin^T \alpha) \\ &= \rho (r \sin \alpha \cos \alpha) (\cos r \alpha) \\ &= \rho \sin r \alpha \cos r \alpha = r \sin \alpha \end{aligned}$$

مسواوی ۲-۲ است. بنابراین مساحت ناحیه محدود به دو دایره برابر است با:

$$S_1 + S_2 = \frac{\gamma\pi}{2} - 2\sqrt{3} - 2$$



2

ریاضی

$$\begin{aligned} \log(r^{x+y} - 1) &= \log(r^{x+1}) \\ \Rightarrow r^{x+y} - 1 &= r^{x+1} = r^{y+x} = (r^x)^y \times r \\ \Rightarrow r^x \times r &= (r^x)^y \times r \\ r^x &= t \Rightarrow r t - 1 = r t^y \Rightarrow r t^y - r t + 1 = 0 \\ \Rightarrow (r t - 1)^y &= 0 \Rightarrow t = \frac{1}{r} \Rightarrow r^x = \frac{1}{r} = r^{-1} \\ \Rightarrow x &= -1 \end{aligned}$$

۲. روی محور سینوس‌ها به اندازه $\frac{1}{2}$ – جدا و عمودی از آن خارج می‌کنیم. در مثلث‌های قائم‌الزاویه OMH و OMH'، طول OH نصف وترهای OM' و OM است. لذا زوایای M و M' مساوی 30° و در نتیجه، کمان‌های MB' و MB مساوی 60° هستند. حالا کافی است از نقاط M' و M در جهت‌های منفی، به اندازه $\frac{\pi}{4}$ تغییر مکان دهیم تا انتهای کمان‌های مساوی x به‌دست آید (نقاط N و N'). بنابراین:

(نقاط N و N'). بنابراین:
 $x = -75^\circ$ یا $x = 165^\circ$.



$$A = \sin\left(\gamma\pi - \frac{\pi}{\gamma}\right)\cos\left(\frac{\pi}{\gamma} + \frac{\pi}{\gamma}\right) + \cos\left(\gamma\pi - \frac{\pi}{\gamma}\right).$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{\gamma} - \frac{\pi}{\gamma}\right) = (-\sin\frac{\pi}{\gamma})(-\sin\frac{\pi}{\gamma}) + (\cos\frac{\pi}{\gamma})(\cos\frac{\pi}{\gamma})$$

$$= \sin^2\frac{\pi}{\gamma} + \cos^2\frac{\pi}{\gamma} = 1$$

حسابان

$$\Delta OMN : \cos x = \frac{OM}{ON} = \frac{1}{ON}$$
$$\Rightarrow ON = \frac{1}{\cos x} = \sec x > 1$$

هندسه

۱. ابتدا ثابت کنید زاویه بین نیم‌ساز و ارتفاع رأس \hat{A} برابر است با: $\hat{C} - \hat{B}$ و در نتیجه: $D'\hat{A}H = D'\hat{A}H'$

و نیز می‌دانیم که در دو مثلث متشابه، نسبت ارتفاع‌ها و نسبت نیم‌سازها مساوی نسبت تشابه است، پس:

$$\frac{AD}{A'D'} = \frac{AH}{A'H'} = k$$

متشابه‌اند.

۲. چون \hat{N}_1 و \hat{B} مکمل‌اند، پس: $\hat{B} = \hat{A}\hat{N}_1\hat{M}$ و در نتیجه مثلث‌های AMN و ABC دو زاویه برابر دارند و متشابه‌اند. نسبت تشابه آن‌ها برابر است با:

$\frac{AM}{AC} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ و در نتیجه نسبت مساحت مثلث ABC به AMN مساوی ۹ است.

۳. نشان دهید مثلث‌های CMN و ABC متشابه‌اند. از آنجا
نسبت تشابه را بنویسید و با استفاده از $\frac{AC}{CN} = \frac{2}{2}$
حکم را ثابت کنید.

هندسه

۱. با داشتن S و BC، ارتفاع رأس A به دست می‌آید:


$$\frac{rS}{BC} = AH$$

حال برای یافتن A، ابتدا BC را رسم می‌کنیم و سپس دو خط موازی آن به فاصله $\frac{rS}{BC}$ از آن رسم می‌کنیم و کمان درخور زاویه A تحت BC را نیز می‌کشیم. محل برخورد این دو مکان هندسی نقطه A است و از آنجا مثلث ABC رسم می‌شود. (بحث کنید).

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{MB}^T = \mathbf{BQ} \cdot \mathbf{BT} \\ \mathbf{MA}^T = \mathbf{AP} \cdot \mathbf{AT} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{MB=MA} \\ \Rightarrow \end{array}$$

$$\mathbf{BQ} \cdot \mathbf{BT} = \mathbf{AP} \cdot \mathbf{AT}, \mathbf{BQ} = \mathbf{AP} \Rightarrow \mathbf{BT} = \mathbf{AT} \Rightarrow \hat{\mathbf{A}} = \hat{\mathbf{B}}$$

$$\Rightarrow \Delta \mathbf{BMQ} \cong \Delta \mathbf{MAP} \Rightarrow \hat{\mathbf{PMA}} = \hat{\mathbf{QMB}} \Rightarrow \widehat{\mathbf{MP}} = \widehat{\mathbf{MQ}}$$



۳. با توجه به اینکه: $O'A = O'B = AB = 2\sqrt{2}$ پس:
 $\hat{O} = 60^\circ$ و لذا مساحت قطاع $O'AB$ $\frac{1}{6} \times \pi \times (2\sqrt{2})^2$ است و مساحت مثلث C' و مساوی $\frac{1}{2} \times (2\sqrt{2})^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$ نیز مساوی $\frac{\sqrt{3}}{2} \times (2\sqrt{2})^2$ یا $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ است. پس مساحت ناحیه S_1 مساوی $2\sqrt{3} - \frac{4\sqrt{3}}{3}$ خواهد بود. در مثلث OAB نیز داریم: $OA=OB=2$ و $\hat{AOB} = 90^\circ$ پس: $AB = 2\sqrt{2}$
 قطاع AOB مساوی $\frac{1}{4} \times \pi \times (2\sqrt{2})^2$ مساحت دایره C و مساوی

حساب دیفرانسیل و انتگرال

۱. f در مبدأ پیوسته است و:

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1-\sqrt{1-x^2}}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1-\sqrt{1-x^2}} \times \sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}}{x\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1-(1-x^2)}}{x\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^2}}{x\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1-\sqrt{1-x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{x^2}}{x\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}} \\ &= \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

بنابراین: $f'_+(0) \neq f'_-(0) \neq f'(0)$ و f در صفر پیوسته است، اما مشتق پذیر نیست (نقطه زاویه دار).

۲. با توجه به فرض مسئله، مشتق f در $A(f(x)=3)$ مساوی $\tan 60^\circ$ یا $\sqrt{3}$ است، و نیز $g'(3) = -2$. آهنگ لحظه ای تغییر gof نسبت به x همان مشتق آن در A است: $gof'(x) = f'(x) \cdot g'(f(x)) = \sqrt{3} \times g'(3) = -2\sqrt{3}$

۳. با توجه به فرض مسئله، باید تابع f در نقطه مرزی $x=1$ پیوسته و مشتق های اول و دوم راست و چپ آن با هم برابر باشند، بنابراین:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) \\ \Rightarrow a+b+c &= \sin \frac{\pi}{\gamma} = 1 \\ f'_+(1) &= f'_-(1) \Rightarrow \gamma a + b = \frac{\pi}{\gamma} \cos \frac{\pi x}{\gamma}, x=1 \\ \Rightarrow \gamma a + b &= 0 \Rightarrow b = -\gamma a \\ f''_+(1) &= f''_-(1) \Rightarrow \gamma a = \frac{-\pi^2}{\gamma} \sin \frac{\pi x}{\gamma}, x=1 \\ \Rightarrow \gamma a &= -\frac{\pi^2}{\gamma}, a = -\frac{\pi^2}{\lambda} \\ \Rightarrow b &= \frac{\pi^2}{\gamma}, c = 1 - (a+b) = 1 - \frac{\pi^2}{\lambda} \end{aligned}$$

ریاضیات گسسته

۱. راهنمایی: تعداد جواب های صحیح و نامنفی معادله $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ با شرط های $x_1 \geq \beta$ و $x_k \geq \alpha$ مساوی است با جواب های صحیح و نامنفی معادله $(x_1 + x_2 + \dots + x_k = n - (\alpha + 1) - \beta)$

۲. راهنمایی: استفاده از قضیه گل ها، صفحه ۶۷ کتاب درسی.

۳. راهنمایی: تعداد رابطه های انعکاس روی $A(2^{(n-1)})$ را از کل رابطه های روی $A(2^n)$ بردارید.

جبر و احتمال

۱. راهنمایی: بیشترین تعداد عضو برای R وقتی ایجاد می شود که دو کلاس هم ارزی یکی تک عضوی و دیگری (p-1) عضوی باشد.

۲. راهنمایی: همانند تمرین های فصل دوم کتاب درسی در صفحه ۶۴.

۳. راهنمایی: استفاده از اصل ضرب و نمودار درختی، صفحه ۷۶ کتاب درسی.

هندسه تحلیلی

۱. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4x \Rightarrow (x-2)^2 + (y+2)^2 = 8$ مکان هندسی نقطه A دایره ای به مرکز (2, -2) و به شعاع $r = 2\sqrt{2}$ است و بیشترین فاصله دو نقطه این مکان هندسی برابر با قطر دایره یعنی $4\sqrt{2}$ است.

۲. فاصله نقطه A از دو خط برابر است. بنابراین داریم: $\frac{|4\sqrt{5}-b|}{\sqrt{5}} = \frac{|2\sqrt{5}-2b|}{\sqrt{5}} \Rightarrow b = \pm 2\sqrt{5}$ چون A در ربع اول است، پس $b = 2\sqrt{5}$ قابل قبول است. برای محاسبه شعاع دایره کافی است فاصله مرکز دایره یعنی $A(2\sqrt{5}, 2\sqrt{5})$ را از خط به معادله $2x-y=0$ پیدا کنیم.


$r = \frac{|4\sqrt{5}-2\sqrt{5}|}{\sqrt{5}} = 2 \Rightarrow S = \pi(2)^2 = 4\pi$

۳. الف) ابتدا دو دایره رسم می کنیم:

$$\begin{aligned} (C_1): x^2 + y^2 &= 1; S_1(0,0), r_1 = 1 \\ (C_2): x^2 + y^2 - 6y + 5 &= 0; S_2(0,3), r_2 = 2 \end{aligned}$$

با توجه به شکل، بزرگترین مماس از روی دایره C_1 که بر دایره C_2 رسم می شود، از نقطه A است. بنابراین داریم:

$$\begin{aligned} \Delta ABS_2: AB^2 &= AS_2^2 - BS_2^2 = 4^2 - 2^2 = 12 \\ \Rightarrow AB &= 2\sqrt{3} \end{aligned}$$



(ب) طول مماس مشترک خارجی:

$$TT' = \sqrt{S_1S_2^2 - (r_1 - r_2)^2} = \sqrt{3^2 - (1-2)^2} = 2\sqrt{2}$$

(ج) با توجه به شکل، چون دو دایره مماس خارج اند، پس خط $x=1$ معادله مماس مشترک داخلی آن هاست.

ریاضی عمومی تجربی

۱. به این منظور ابتدا نقاط بحرانی تابع را پیدا می کنیم:

$$f'(x) = \frac{\cos x(2 + \cos x) - (-\sin x)\sin x}{(2 + \cos x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1 + 2\cos x}{(2 + \cos x)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 1 + 2\cos x = 0 \Rightarrow \cos x = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} \in (0, \pi) \text{ نقطه بحرانی}$$

$$f'(x) \rightarrow \infty \Rightarrow 2 + \cos x = 0 \text{ امکان ندارد}$$

$$\begin{cases} f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sin \frac{2\pi}{3}}{2 + \cos \frac{2\pi}{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2 + (-\frac{1}{2})} = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ f(0) = 0 \\ f(\pi) = 0 \end{cases}$$

ماکزی-مم مطلق تابع برابر با $\frac{\sqrt{3}}{3}$ و مینی-مم مطلق آن ۰ است.

۲. در تابع $y=f(x)$ ، نقطه $c \in D_f$ نقطه عطف است، هرگاه $f''(x)$ در c تغییر علامت دهد.

$$\begin{aligned} f(x) &= [(x-1)(x+1)][x(x+2)] + 2 \\ \Rightarrow f(x) &= (x^2-1)(x^2+2x) + 2 \\ \Rightarrow f(x) &= x^4 + 2x^3 - x^2 + 2x + 2 \\ \Rightarrow f'(x) &= 4x^3 + 6x^2 - 2x + 2 \\ \Rightarrow f''(x) &= 12x^2 + 12x - 2 = 0 \\ \Rightarrow 6x^2 + 6x - 1 &= 0 \\ \Rightarrow x &= \frac{-3 \pm \sqrt{15}}{6} \end{aligned}$$

چون $f''(x)=0$ دارای دو ریشه ساده است، پس تابع $y=f(x)$ دو نقطه عطف دارد.

۳. چون در این تابع وقتی $x \rightarrow \infty$ ، آن گاه $y \rightarrow \infty$ ، پس مجانب مایل موجود است و داریم:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2x + 2}{x} & x > 0 \\ \frac{x^2 - 2x + 2}{x} & x < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) = x + 2 + \frac{2}{x} & x > 0 \\ f(x) = x - 2 + \frac{2}{x} & x < 0 \end{cases}$$

چنانچه $x \rightarrow \infty$ ، آن گاه $y = x + 2$ مجانب مایل و هرگاه $x \rightarrow -\infty$ ، آن گاه $y = x - 2$ مجانب مایل دیگر است. فاصله بین این دو مجانب مایل، همان فاصله بین دو خط موازی است.

$$d = \frac{|c-c'|}{\sqrt{a^2+b^2}} = 2\sqrt{2}$$


۳

ریاضی

۱. از تعریف حد چپ و راست استفاده کنید و اینکه اگر در یک نقطه حد چپ و حد راست با هم برابر نباشند، تابع در آن نقطه حد ندارد.

۲. برای محاسبه a توجه دارید که مجموع ضرایب چندجمله ای صورت و مخرج صفر است، پس بر (x-1) بخش پذیرند و... برای محاسبه b از اتحادها استفاده کنید و $\sqrt{x-4}$ را از صورت و مخرج حذف کنید و...

۳. با محاسبه $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 4x}{2x}$ و $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$ استفاده از قضیه فشردگی $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ به دست می آید.



در معمای اول دیدیم که هیچ شهروندی نمی‌تواند این سؤال را ببرد. پس پاسخ این سؤال خیر است و لذا این شهروند از نوع B است.

مفتی اعظم پاکستان

۲. ارسال اصل فیش بانکی به همراه برگ تکمیل شدهٔ اشتراک با پست سفارشی یا از طریق دورنگار به شمارهٔ ۷۷۲۳۳۱۹۲. لطفاً کپی فیش را نزد خود نگه دارید.

:lavol


● نشانی: تهران، صندوق پستی ۱۶۵۹۵/۱۱
● تلفن اور مشتری: ۰۲۱-۷۷۳۳۹۷۱۳-۱۴ و ۷۷۳۳۵۱۰
● تلفن اور مشتری: ۰۲۱-۷۷۳۳۶۶۵۶

◆ هزینه اشتراک سالانه مجلات عمومی رشد (هشت شماره): ۳۵۰/۰۰۰ ریال
 ◆ هزینه اشتراک سالانه مجلات تخصصی رشد (سه شماره): ۲۰۰/۰۰۰ ریال

پاسخ‌ها



۱. اولاً با فرض: $a=10$ و $b=8$ و $c=4$ ، روشن است که زاویهٔ روبه‌رو به A منفرجه است. (چرا؟)



حال با توجه به شکل، حجم موردنظر عبارت است از حاصل اختلاف حجم دو مخروط با شعاع قاعدهٔ r و ارتفاع‌های h_1 و h_2 به‌طوری که داشته باشیم:

$$V = V_1 - V_2 = \frac{1}{3}\pi r^2 h_1 - \frac{1}{3}\pi r^2 h_2$$

$$= \frac{1}{3}\pi r^2 (h_1 - h_2) = \frac{1}{3}\pi r^2 \times 4$$

و r ارتفاع وارد بر c در مثلث است که به کمک مساحت مثلث محاسبه می‌شود:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$= \sqrt{11 \times 1 \times 3 \times 7} = \sqrt{231}$$


$$p = \frac{a+b+c}{2} = 11$$

$$\Rightarrow r = \frac{2}{c} \times S = \frac{1}{3} \sqrt{231}$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{3} \pi \times \frac{1}{9} \times 231 \times 4 = 77\pi$$



۲. مثلث بالای این شکل را در نظر بگیرید.




مطابق فرض مسئله باید داشته باشیم:

$$d+e+f=b+c=a, d+e=b, e+f=c$$

و از جمع روابط آخر نتیجه می‌شود:

$$(d+e+f)+e=b+c \Rightarrow e=0$$

حال مثلث درون مثلث اصلی را در نظر بگیرید.



دایرهٔ رأس این مثلث، همان دایره‌ای است که با حرف

e مشخص کردیم و: $e=0$ ، بنابراین داریم:


$$m+n=p+q+r=e=0, p+q=m, q+r=n$$

و با استدلالی مشابه نتیجه می‌شود که: $q=0$. بنابراین

دوتا از خانه‌ها مساوی صفر هستند و بقیهٔ خانه‌ها می‌توانند

صفر نباشند (گزینه ج). با حل سایر معادلات می‌توانید

صورت کلی جواب را هم به شکل زیر به‌دست آورید.



۳. با تقسیم طرفین معادله، بر 2^x نتیجه می‌شود:

$$2^{x-z} + 2^{y-z} = 1$$

که: $x-z=y-z=-1$ در نتیجه: $x=y$ و $z=x+1$ یعنی

بی‌شمار سه‌تایی به‌صورت $(a, a, a+1)$ در این رابطه صدق می‌کنند که همگی روی صفحهٔ $x+y=2z-2$ واقع‌اند (گزینه ج).

$$۴. \text{ داریم: } ۳۰ \times ۳۰ = ۲ \times ۳ \times ۵ \times ۷ \times ۱۱ \times ۱۳$$

اگر این شش عدد را a, b, c, d, e, f بنامیم، حال برای نوشتن این عدد به‌صورت حاصل ضرب سه عدد طبیعی، روش‌های زیر وجود دارند:

$$(ab)(cd)(ef)$$

$$(a)(bc)(def)$$

$$(a)(b)(cdef)$$

و به کمک اصول آنالیز ترکیبی، تعداد راه‌های هر یک

از این روش‌ها برابر است با:

$$n_1 = \frac{\binom{6}{2} \binom{4}{2} \binom{2}{2}}{3!} = ۱۵$$

$$n_2 = \frac{\binom{6}{1} \binom{5}{2} \binom{3}{2}}{3!} = ۶۰$$

$$n_3 = \frac{\binom{6}{1} \binom{5}{1} \binom{4}{2}}{3!} = ۱۵$$

و در نتیجه تعداد همهٔ راه‌ها برابر است با:

$$n_1 + n_2 + n_3 = ۹۰ \text{ (گزینه ب).}$$

۵. با فرض $m=n=2$ داریم:

$$f(4)=f(2)+f(2)+f(4) \Rightarrow 2f(2)=0 \Rightarrow f(2)=0$$

و با فرض $m=1$ و $n=1$ داریم:

$$f(2)=f(1)+f(1)+f(1) \Rightarrow 3f(1)=0 \Rightarrow f(1)=0$$

و با فرض $m=2$ و $n=1$ داریم:

$$f(3)=f(2)+f(1)+f(2)=0$$

و به‌صورت استقرایی حدس می‌زنیم، برای هر عدد

طبیعی $n, n(n)=0$ و به کمک قضیهٔ استقرای ریاضی

درستی این حکم را می‌توان اثبات کرد (اثبات به‌عهدهٔ

خواننده است). بنابراین: $f(۱۳۹۵)=0$ (گزینه ب).

با مجله‌های رشد آشنا شوید

مجله‌های دانش آموزی

به صورت ماهنامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می‌شود:

رشد کودک

برای دانش آموزان پیش دبستانی و پایه اول دورهٔ آموزش ابتدایی

رشد نوجوان

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورهٔ آموزش ابتدایی

رشد دانش آموز

برای دانش آموزان پایه های پنجم و ششم دورهٔ آموزش ابتدایی

مجله‌های دانش آموزی

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می‌شود:

رشد نوجوان

برای دانش آموزان دورهٔ آموزش متوسطه اول

رشد جوان

برای دانش آموزان دورهٔ آموزش متوسطه اول

رشد جوان

برای دانش آموزان دورهٔ آموزش متوسطه دوم

رشد جوان

برای دانش آموزان دورهٔ آموزش متوسطه دوم

مجله‌های بزرگسال عمومی

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می‌شود:

رشد آموزش ابتدایی

رشد آموزش متوسطه اول

رشد آموزش متوسطه دوم

مجله‌های بزرگسال تخصصی:

به صورت فصلنامه و سه شماره در سال تحصیلی منتشر می‌شود:

رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی • رشد آموزش زبان و ادب فارسی

رشد آموزش هنر • رشد آموزش مشاوره مدرسه • رشد آموزش تربیت بدنی

رشد آموزش علوم اجتماعی • رشد آموزش تاریخ • رشد آموزش جغرافیا

رشد آموزش زبان های خارجی • رشد آموزش ریاضی • رشد آموزش فیزیک

رشد آموزش شیمی • رشد آموزش زیست شناسی • رشد آموزش هنر

رشد آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش • رشد آموزش پیش دبستانی

مجله‌های رشد عمومی و تخصصی، برای معلمان، مدیران، مربیان، مشاوران و کارکنان اجرایی مدارس، دانش‌جویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان گروه‌های آموزشی و... تهیه و منتشر می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش، پلاک ۲۶۶.

تلفن و نمابر: ۰۲۱-۸۸۳۰۱۴۷۸


وبگاه: www.roshdmag.ir



دانش‌آموزان عزیز! این مجله‌ها را به‌صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهیم. لطفاً به‌کارگیری کنید.

پارادوکس یا سفسطه؟!!

فرض کنید سه جعبه A، B و C را پیش روی ما گذاشته‌اند و به ما گفته‌اند که فقط در یکی از آن‌ها یک سکه طلا وجود دارد! و ما می‌توانیم با انتخاب یکی از جعبه‌ها شانس خودمان را برای تصاحب سکه امتحان کنیم. اگر یکی از جعبه‌ها را به تصادف انتخاب کنیم، چه قدر احتمال دارد که سکه در آن باشد؟ حتماً می‌گویید $\frac{1}{3}$! ولی به بحث زیر توجه کنید.



اگر کسی به ما بگوید که جعبه B خالی است، در این صورت با انتخاب جعبه A، چه قدر شانس داریم که سکه را ببریم؟ بدیهی است که احتمال این امر، در این صورت مساوی $\frac{1}{2}$ است. حالا فرض کنیم کسی به ما بگوید که جعبه C خالی است، در این صورت با انتخاب جعبه A، چه قدر احتمال دارد، سکه را صاحب شویم؟ روشن است که باز هم پاسخ $\frac{1}{2}$ است. ولی همچنین واضح است که همیشه یکی از دو جعبه B و C خالی است، پس در هر حال احتمال آنکه سکه را ببریم $\frac{1}{2}$ است!!
نظراتان چیست؟ اگر اشکالی در استدلال فوق وجود دارد، کجاست؟ منتظر نظراتتان در این زمینه می‌مانیم.


ریاضیات

در استان

کردستان*

استان کردستان پیشینه فرهنگی غنی دارد و در یک قرن اخیر فعالیت‌های بسیاری نیز در زمینه ریاضیات در آن خطه سرسبز انجام گرفته است. معلمان و استادان فرهیخته ریاضی این استان تاکنون منشأ خدمات بسیاری در این زمینه بوده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به افراد خاصی همچون زنده‌یاد حیدر محبی (متولد ۱۳۹۲ در سنندج، دبیر ریاضی و بازنشسته به سال ۱۳۴۲ و متوفی به سال ۱۳۸۰)، عباس عزتیار (متولد ۱۳۹۹، دبیر ریاضی و مؤلف کتاب‌های ۴۰۰ مسئله حساب و هندسه و حساب عزتیار)، همایون دهقان، پرویز فره‌ودی‌مقدم (متولد ۱۳۱۵ در سنندج، عضو شورای برنامه‌ریزی ریاضی و دفتر تألیف کتاب‌های ریاضی، مؤلف کتاب‌های ریاضی دوره راهنمایی تحصیلی و کتاب‌های کمک‌درسی)، دکتر فرهاد جنتی (متولد ۱۳۲۹ در سنندج، شاگرد مرحوم غلامحسین مصاحب و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، مترجم و مؤلف کتاب‌های ریاضی)، مظفر غربی (دبیر نمونه ریاضی و پژوهشگر فعال استان و مؤلف کتاب‌های ریاضی) و دکتر ارسلان شادمان (متولد ۱۳۱۷ در سنندج، فارغ‌التحصیل دوره دکترای ریاضی از دانشگاه سوربن فرانسه و استاد ممتاز دانشگاه‌های تهران و کردستان، همکار دفتر تألیف کتاب‌های درسی ریاضی، مؤلف و مترجم چند کتاب ریاضی) اشاره کرد. دانش‌آموزان استان کردستان همواره در مسابقات ریاضی کشور و المپیادها فعالانه شرکت کرده‌اند که از آن جمله عضویت دو تن از آنان در تیم‌های المپیاد ریاضی ایران است (افشین عبداللّهی در سال ۱۹۹۳ با کسب مدال نقره و محمد جواهری در سال ۱۹۹۵ با کسب مدال نقره). در سال‌های اخیر دبیران و استادان و علاقه‌مندان ریاضیات در این استان غربی کشور فعالیت‌های زیادی انجام داده‌اند که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:

- برگزاری همایش زیبایی‌های ریاضی در شهرستان پاوه (سال ۱۳۸۹- با سخنرانی دکتر زهرا گویا و آقای مظفر غربی).
- برگزاری جشنوارهٔ دنیای شگفت‌انگیز ریاضی در سروآباد کردستان.
- برگزاری همایش گرامی‌داشت روز ملی ریاضیات در سنندج (سال ۱۳۸۹- با سخنرانی دکتر ارسلان شادمان).
- برگزاری جشنوارهٔ «آشتی با ریاضی» در ناحیهٔ ۱ سنندج (سال ۱۳۹۰)
- برگزاری یادوارهٔ استاد پرویز شه‌ریاری در سال‌روز تولد حکیم عمر خیام در سنندج (سال ۱۳۹۱- با سخنرانی دکتر زهرا گویا و دکتر ارسلان شادمان)
- برگزاری جشنوارهٔ روز جهانی عدد پی توسط انجمن معلمان ریاضی استان کردستان (اسفندماه ۱۳۹۱ و اسفند ۱۳۹۲).



❖ تهیه منابع این مطلب، مرهون همکاری بی‌شائبه دبیر فعال و علاقه‌مند ریاضی شهرستان بانه، آقای فرزاد حمزه‌پور بوده است. پیش از این هم در مجله به‌هان مطالبی از ایشان به چاپ رسیده است.





سایت ویژه ریاضیات www.riazisara.ir

درسنامه ها و جزوه های دروس ریاضیات

دانلود نمونه سوالات امتحانات ریاضی

نمونه سوالات و پاسخنامه کنکور

دانلود نرم افزارهای ریاضیات

...

کانال سایت ریاضی سرا در تلگرام:

<https://telegram.me/riazisara> (@riazisara)