

ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ریاضی فیزیک	سؤالات امتحان نهایی درس: جبر و احتمال
تاریخ امتحان ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲	تعداد صفحه: ۲	سال سوم آموزش متون سطه	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۲
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir			

سؤالات

ردیف

ردیف	سؤالات	ردیف	ردیف
۱	با استفاده از اصل استقرای ریاضی، برای هر عدد طبیعی n ، ثابت کنید: $P(n) : 1+2+ \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$	۱/۵	
۲	در یک کلاس ۳۰ نفری حداقل چند دانش آموز در یک روز هفته متولد شده اند؟ چرا؟	۱/۲۵	
۳	اگر x عددی حقیقی و مثبت باشد، با استفاده از اثبات بازگشتی ثابت کنید:	۱/۲۵	
۴	با استفاده از برهان خلف، نشان دهید اگر n عددی فرد باشد، آنگاه n نیز فرد است.	۱/۵	
۵	مجموعه های $A = \{-1, 0, 2\}$ و $B = \{1, 3\}$ مفروضند: الف) $(A \times B)$ را به صورت زوج های مرتب بنویسید. ب) نمودار $(A \times B)$ را رسم کنید.	۱/۵	
۶	مقادیر x و y را طوری بیابید که دو زوج مرتب $(x^3 - y^3, x^2 - y^2)$ و $(y - x, 15)$ با هم برابر باشند.	۱	
۷	با استفاده از قوانین جبر مجموعه ها، ثابت کنید:	۱/۵	
۸	رابطه R روی \mathbb{R}^2 به صورت زیر تعریف شده است: $(x, y) R (z, t) \Leftrightarrow (y - t) = 3(x - z)$ الف) نشان دهید که R یک رابطه هم ارزی است. ب) کلاس هم ارزی $\{(2, 3)\}$ را مشخص کنید.	۱/۵	
۹	تمام ترکیبات دورقمی بدون تکرار، مجموعه اعداد $\{1, 2, 3\}$ را روی کارت های مختلف نوشته ایم (هر ترکیب روی یک کارت)، یک کارت را به طور تصادفی خارج می کنیم مطلوب است: الف) فضای نمونه ای ب) پیشامد A که در آن عدد روی کارت زوج باشد. ج) پیشامد B که در آن روی کارت عددی اول باشد.	۲	
	ادامه سوالات در صفحه دوم «		

نامه تعالی

سال سوم آموزش متوسطه	رشته‌ی: ریاضی فیزیک	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
تعداد صفحه: ۲	تاریخ امتحان ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲		
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ http://aee.medu.ir			

سوالات

ردیف

ردیف	سوالات	ردیف
۱۰	نقاطه‌ای به تصادف درون مربعی به ضلع ۲ واحد در نظر می‌گیریم، مطلوب است احتمال آن که فاصله آن نقطه از هر راس مربع بیشتر از $\frac{1}{2}$ باشد.	۱/۵
۱۱	تاس سالمی را ۵ بار پرتاب می‌کنیم مطلوب است احتمال آن که ۳ بار عدد زوج بیاید.	۰/۷۵
۱۲	سه دونده A و B و C با هم مسابقه می‌دهند، اگر احتمال برد A با B برابر باشد و احتمال برد هر کدام از آنها ۲ برابر بود C باشد، احتمال آنکه B یا C برنده شود چقدر است؟	۱/۲۵
۱۳	از مجموعه $\{A = 1, 2, \dots, 1000\}$ عددی به تصادف انتخاب می‌کنیم. احتمال این که عدد انتخابی بر ۳ و یا بر ۵ یا بر هر دو بخش پذیر باشد چقدر است؟	۲
۱۴	برای دو پیشامد A و B از فضای نمونه‌ی S اگر $A \subseteq B$ ثابت کنید: $P(B - A) = P(B) - P(A)$	۱/۵
	دانلود نمونه سوالات از سایت ریاضی سرا «موفق باشید»	۲۰ جمع نمره

www.riazisara.ir

دانلود نمونه سوالات از سایت ریاضی سرا

با اسمه تعالی

راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: جبر و احتمال	ساعت شروع: ۱۰ صبح تاریخ امتحان ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲	رشته: ریاضی فیزیک
سال سوم آموزش متوسطه		
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ http://aee.medu.ir		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	$P(1) : 1 = \frac{1(1+1)}{2} \Rightarrow 1 = 1 \quad (0/25)$ $P(K) : 1+2+3+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2} \quad (0/25)$ $P(K+1) : 1+2+3+\dots+k+(k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \quad (0/25)$ $P(K+1) : 1+2+3+\dots+k+(k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \quad (0/25)$	۱/۵
۲	اگر ۳۰ نفر دانش آموز به منزله کبوتران و روزهای هفتہ به منزله لانه ها باشند (۰/۲۵)	۱/۲۵
۳	$\frac{۳۰}{۲} = ۱۵ \quad ۱۵+۱=۱۶ \quad (0/5)$ بنا به اصل لانه کبوتری حداقل ۵ نفر از دانش آموزان در یک روز هفتہ متولد شده اند. (۰/۵)	۱/۲۵
۴	$x + \frac{1}{x} \geq 2 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geq 2x \Rightarrow x^2 - 2x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 \geq 0 \quad (0/5)$ $(0/25) \quad (0/25)$ درستی عبارت بدیهی است. بنابراین تمامی روابط برگشت پذیر است. (۰/۲۵)	۱/۲۵
۵	فرض می کنیم n فرد نباشد پس زوج است (فرض خلف) (۰/۵) $n = 2k \Rightarrow n^2 = 4k^2 \Rightarrow n^2 = 2(2k^2) = 2k' \quad (0/5)$ به تناقض رسیدیم پس فرض خلف باطل و حکم صحیح است. (۰/۵)	۱/۵
	«ادامه در صفحه ی دوم»	

باسمہ تعالیٰ


راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس : ریاضی فیزیک	ساعت شروع : ۱۰ صبح	رشته‌ی: ریاضی فیزیک
تاریخ امتحان ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲		سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پژوهش دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۲	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۲	
http://aee.medu.ir		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
------	---------------	------

۱/۵	<p>الف $A \times B = \{(3, 2)(3, 0)(3, -1)(1, 2)(1, 0)(1, -1)\}$ (. / ۷۵)</p> <p>رسم (. / ۷۵)</p>	۰
۱	$\begin{cases} x^r - y^r = 15 \Rightarrow (x - y)(x + y) = 15 \\ x - y = 3 \end{cases} \Rightarrow 3(x + y) = 15 \Rightarrow x + y = 5 \quad (. / ۵)$ $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 3 \end{cases} \Rightarrow x = 4, y = 1 \quad (. / ۲۵) \quad (. / ۲۵)$	۱
۱/۵	$A - (A \cap B) = A \cap (A \cap B)' = A \cap (A' \cup B') = (A \cap A') \cup (A \cap B') =$ $(. / ۲۵) \quad (. / ۲۵) \quad (. / ۲۵)$ $\Phi \cup (A \cap B') = (A \cap B') = (A - B)$ $(. / ۲۵) \quad (. / ۲۵) \quad (. / ۲۵)$	۷
۱/۵	$(x, y) R (z, t) \Leftrightarrow (y - t) = ۳(x - z)$ $1) (x, y) R (z, t) \Rightarrow (y - t) = ۳(x - z) \quad (. / ۲۵)$ $2) (x, y) R (z, t) \Rightarrow (y - t) = ۳(x - z) \Rightarrow (t - y) = ۳(z - x) \Rightarrow (z, t) R (x, y) \quad (. / ۲۵)$ $3) \left\{ \begin{array}{l} (x, y) R (z, t) \Rightarrow (y - t) = ۳(x - z) \\ (z, e) R (x, f) \Rightarrow (t - f) = ۳(z - e) \end{array} \right\} \Rightarrow y - t + t - f = ۳(x - z) + ۳(z - e) \Rightarrow$ $(y - f) = ۳(x - e) \Rightarrow (x, y) R (e, f)$ <p style="text-align: right;">تعدادی (. / ۲۵)</p> <p style="text-align: right;">پس رابطه R هم ارزی است (. / ۲۵)</p> <p style="text-align: right;">ب</p> $[(2, 3)] = \{(x, y) \in R^r \mid (x, y) R (2, 3)\} = \{(x, y) \mid y - 3 = ۳(x - 2) \Rightarrow y = ۳x - 3\} \quad (. / ۵)$	۸

با اسمه تعالی

راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: جبر و احتمال	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی فیزیک
سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲	
دانش آموزان وزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهر یور ماه سال ۱۳۹۲ http://aee.medu.ir		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۹	<p>(الف) $S = \{12, 13, 21, 31, 23, 32\}$ (۰/۵)</p> <p>(ب) $A = \{12, 32\}$ (۰/۷۵)</p> <p>(ج) $B = \{13, 31, 23\}$ (۰/۷۵)</p>	۲
۱۰	<p>در چهار گوشه مربع چهار ربع دایره به شعاع $\frac{1}{2}$ و به مرکز راس های مربع داریم که دایره ای به شعاع $\frac{1}{2}$ را تشکیل می دهند: (۰/۵)</p>  $a_S = 2 \times 2 = 4 \quad (0/25)$ $a_A = 4 - \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \pi\right) = 4 - \frac{\pi}{4} \quad (0/25)$ $P(A) = \frac{a_A}{a_S} = \frac{4 - \frac{\pi}{4}}{4} = \frac{16 - \pi}{16} \quad (0/5)$	۱/۵
۱۱	$p(A) = \frac{\binom{5}{3}}{2^5} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16} \quad (0/25)$ $(0/5)$	۰/۷۵
۱۲	$P(C) = x$ $p(A) = P(B) = 2x \quad (0/25)$ $P(A) + P(B) + P(C) = 1 \Rightarrow 2x + 2x + x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{5} \Rightarrow P(A) = \frac{2}{5}, P(B) = \frac{2}{5}, P(C) = \frac{1}{5}$ $(0/25)$ $P(B \cup C) = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5} \quad (0/5)$	۱/۲۰
	«ادامه در صفحه چهارم»	

باسمہ تعالیٰ

راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: جبر و احتمال	ساعت شروع: ۱۰ صبح
تاریخ امتحان ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان ازاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۲

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۳	<p>اگر A پیشامد بخش پذیر بودن عدد انتخابی بر ۳ و B پیشامد بخش پذیر بودن عدد انتخابی بر ۵ باشد آنگاه:</p> $\left. \begin{array}{l} P(A) = \frac{333}{1000} \quad (0/5) \\ P(B) = \frac{200}{1000} \quad (0/5) \\ P(A \cap B) = \frac{66}{1000} \quad (0/5) \end{array} \right\} \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (0/25)$ $P(A \cup B) = \frac{333}{1000} + \frac{200}{1000} - \frac{66}{1000} = \frac{467}{1000} \quad (0/25)$	۲
۱۴	<p>می دانیم $(0/25) B = (B - A) \cup A$ $(0/5) A \cap (B - A) = \emptyset$ (دوپیشامد از هم جدا هستند زیرا): بنابراین:</p> $P(B) = P(B - A) + P(A) \quad (0/25) \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A) \quad (0/5)$	۱/۵

مصححین گرامی لطفاً برای راه حل های صحیح دیگر هم به تناسب نمره منظور فرمایید.

www.riazisara.ir

دانلود نمونه سوالات از سایت ریاضی سرا