

ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: فنی و کامپیوتر
تاریخ امتحان: ۱۳۹۲/۲/۳۰		سال سوم فنی و حرفه ای
مرکز سنجش آموزش و پرورش	ttt://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۲

ردیف	سوالات	نمره
۱	اگر دو نقطه‌ی $B(n+1, n)$, $A(m-1, n)$ در دستگاه محورهای مختصات بر هم منطبق باشند، مقادیر m و n را بدست آورید.	۱
۲	اگر مرکز بازه‌ی $(n-1, 3n+1)$ برابر عدد ۶ باشد، مقدار n را بدست آورید.	۰/۵
۳	نامعادله‌ی $x^3 - 3x - 1 > 3 + x$ را حل نموده و مجموعه جواب آن را به صورت بازه نمایش دهید.	۱
۴	تابع با خصایطه‌ی $f(-1) = 6$ داده شده، مقدار a را چنان بیابید که $f(x) = x^3 - ax + 5$ باشد.	۱
۵	دامنه تابع زیر را بدست آورید. الف) $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-x-2}$ ب) $g(x) = \frac{1+\sin x}{\sqrt{4-x}}$	۲
۶	اگر $f(x) = x + \sqrt{x}$ و $g(x) = \frac{2x}{1-x}$ باشند، مقدار k را در رابطه‌ی زیر بدست آورید. $\forall f(1) + (f-g)(4) = 2k$	۱
۷	اگر $g = \{(1, 3), (3, 5), (7, 1)\}$ و $f = \{(2, 1), (3, 4), (5, 7)\}$ باشند، تابع gof را بدست آورید.	۱
۸	اگر تابع $f(x) = \begin{cases} x-2 & x \leq 1 \\ \sqrt{-1+x^2} & x > 1 \end{cases}$ باشد، مقدار a را در رابطه‌ی زیر بدست آورید. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3af(1)$	۱/۵
۹	حاصل حد های زیر را بیابید. الف) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+3x-10}{x^2+x-6}$ ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + \sin x}{x}$ ج) $\lim_{x \rightarrow 0} x^{-3}$	۲/۵

ادامه‌ی سوالات در صفحه‌ی دوم

ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: فنی و کامپیوتر
تاریخ امتحان: ۱۳۹۲/۲/۳۰		سال سوم فنی و حرفه ای
مرکز سنجش آموزش و پرورش	ttt://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۲

ردیف	سوالات	نمره
۱۰	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^3 - 3x}{2x^m + 5x + 2} = \frac{1}{6}$ اگر باشد، مقادیر a, m را بدست آورید.	۰/۷۵
۱۱	حاصل $\lim_{x \rightarrow 7^-} \frac{x-1}{7-x}$ را بدست آورید.	۰/۷۵
۱۲	پیوستگی تابع با ضابطه‌ی $f(x) = \begin{cases} x^3 + 8 & x > 2 \\ \sin \frac{\pi}{2} x & x = 2 \\ x^2 - 2x & x < 2 \end{cases}$ در نقطه‌ی $x = 2$ برسی نمایید.	۱/۵
۱۳	تابع با ضابطه‌ی $f(x) = \frac{1}{x} - \cos x$ در چه فاصله‌ای پیوسته است؟	۰/۵
۱۴	مشتق تابع با ضابطه‌ی $y = x^5 + 5$ را در نقطه‌ی $x = 1$ با استفاده از تعریف مشتق بدست آورید.	۱/۵
۱۵	با استفاده از فرمول‌های مشتق، مشتق دوم تابع زیر را بدست آورید. $y = x^3 + \sin x$	۱
۱۶	معادله خط مماس بر نمودار تابع با ضابطه‌ی $y = \sqrt{3-x}$ را در نقطه‌ی $x = 2$ واقع بر منحنی تابع بدست آورید.	۱/۵
۱۷	صعودی یا نزولی بودن (رفتار) تابع $f(x) = \frac{3x-1}{4-x}$ را با استفاده از مشتق در دامنه‌ی تابع برسی کنید.	۱
۲۰	جمع بارم: موفق باشید.	

با اسمه تعالی

رشته: فنی و کامپیوتر	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: ریاضی ۳
تاریخ امتحان: ۱۳۹۲/۲/۳۰	سال سوم فنی و حرفه‌ای
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۲

ردیف	راهنمای تصحیح	(جمع ۱ نمره)
۱	$\begin{cases} m - 1 = n + 1 \\ n = 6 - n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m - n = 2 \\ 2n = 6 \end{cases} \Rightarrow n=3, m=5$./۵ ./۲۵ ./۲۵	(جمع ۱ نمره)
۲	$x = \frac{n+1+n-1}{2} \Rightarrow n = 3$./۲۵ ./۲۵	(جمع ۰/۵ نمره)
۳	$2x - 1 > 3 + x \Rightarrow x > 4 \Rightarrow x \in (4, +\infty)$./۵ ./۵	(جمع ۱ نمره)
۴	$f(x) = x^r - ax + 5 \Rightarrow 6 = (-1)^r - a(-1) + 5 \Rightarrow a = 2$./۷۵ ./۲۵	(جمع ۱ نمره)
۵	a) $x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x-2)(x+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -1 \end{cases} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - \{-1, 2\}$ b) $4 - x > 0 \Rightarrow x < 4 \Rightarrow D_g = (-\infty, 4)$./۲۵ ./۲۵ ./۵	(جمع ۲ نمره)
۶	$f(1) = 1 + \sqrt{1} = 2$ $f(4) = 4 + \sqrt{4} = 6$ $g(4) = \frac{4(4)}{4-4} = 4$ $2f(1) + (f-g)(4) = 2k \Rightarrow 2f(1) + (f(4) - g(4)) = 2k \Rightarrow 2(2) + (6 - 4) = 2k \Rightarrow k = 4$./۲۵ ./۵ ./۲۵	(جمع ۱ نمره)
۷	$(gof)(2) = g(f(2)) = g(1) = 3$ $(gof)(5) = g(f(5)) = g(5) = 1$ $(gof)(x) = \{(2, 3), (5, 1)\}$./۲۵ ./۲۵ ./۵	(جمع ۱ نمره)
ادامهٔ راهنمای تصحیح در صفحهٔ دوم		

با سمه تعالی

رشته: فنی و کامپیوتر	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: ریاضی ۳
تاریخ امتحان: ۱۳۹۲/۲/۳۰	سال سوم فنی و حرفه ای
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزادسرا سرکشی نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۲

ردیف	راهنمای تصحیح
۸	$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x - 2) = -1 \quad . /5$ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt{-1 + x}) = . \quad . /5$ $f(1) = -1 \quad . /25$ $. + (-1) = 2a(-1) \Rightarrow a = \frac{1}{2} \quad . /25$ <p style="text-align: right;">(جمع ۱/۵ نمره)</p>
۹	<p>(الف) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 + x - 6} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+5)}{(x-2)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+5}{x+3} = \frac{7}{5} \quad . /5 \quad . /25 \quad . /25$</p> <p>(ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + \sin \alpha x}{x} = \frac{0}{0} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{\alpha x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 0 + 1 = 1 \quad . /5 \quad . /25 \quad . /25$</p> <p>(ج) $\lim_{x \rightarrow 0} -3 = -3 \quad . /5$</p> <p style="text-align: right;">(جمع ۲/۵ نمره)</p>
۱۰	$m = 3 \quad . /25$ $\frac{a}{2} = \frac{1}{6} \Rightarrow 6a = 3 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \quad . /5$ <p style="text-align: right;">(جمع ۰/۷۵ نمره)</p>
۱۱	$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-1}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{2}} = \frac{2-1}{\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{2}} = \frac{1}{0^+} = +\infty \quad . /25 \quad . /25 \quad . /25$ <p style="text-align: right;">(جمع ۰/۷۵ نمره)</p>
۱۲	$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + 1) = 16 \quad . /5$ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 2x) = . \quad . /5$ $f(2) = \sin \frac{\pi}{2} (2) = . \quad . /25$ <p>تابع در $x=2$ پیوسته نیست اما پیوستگی چپ دارد. $. /25$</p> <p style="text-align: right;">(جمع ۱/۵ نمره)</p>

ادامهٔ راهنمای تصحیح در صفحهٔ سوم

باسمه تعالی

رشته: فنی و کامپیوتر	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: ریاضی ۳
تاریخ امتحان: ۱۳۹۲/۲/۳۰	سال سوم فنی و حرفه‌ای
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزادسرا سرکشور نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۲

ردیف	راهنمای تصحیح
۱۳	$R - \{ \cdot \} =$ فاصله بیوستگی ./۵ (جمع ۰/۵ نمره)
۱۴	$f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1+\Delta x)^2 + 5 - 6}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1+2\Delta x + \Delta x^2) - 1}{\Delta x} = 2$./۵ ./۵ ./۲۵ ./۲۵ (جمع ۱/۵ نمره)
۱۵	$f(x) = 2x + \cos x$./۵ $f''(x) = 2 - \sin x$./۵ (جمع ۱ نمره)
۱۶	$y = \sqrt{r-x}$ $f(x) = \frac{-1}{r\sqrt{r-x}}$./۲۵ $x = 2 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow A(2,1)$./۲۵ $m = f'(2) = \frac{-1}{2\sqrt{r-2}} = \frac{-1}{2}$./۲۵ $y - 1 = \frac{-1}{2}(x - 2) \Rightarrow y = \frac{-1}{2}x + 2$./۲۵ ./۲۵ (جمع ۱/۵ نمره)
۱۷	$f(x) = \frac{r(r-x)-(-1)(rx-1)}{(r-x)^2} = \frac{11}{(r-x)^2} \Rightarrow f'(x) > 0 \Rightarrow$ تابع اکیداً صعودی است. ./۲۵ ./۲۵ ./۲۵ ./۲۵ (جمع ۱ نمره)
جمع بارم: ۲۰ نمره همکاران محترم خسته نباشید.	