




با سمه تعالی

مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی فیزیک علوم تجربی	نام و نام خانوادگی:
تعداد صفحه: ۴	تاریخ امتحان: ۲/۲۷/۱۳۹۵	سال سوم آموزش متوسطه نظری	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت خرداد سال ۱۳۹۵
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://ace.medu.ir			ردیف
نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)		

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) بلامانع است تا دو رقم اعشار دقت شود.

۱	در هر مورد از بین دو واژه داده شده، واژه مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید. الف) در حل بعضی مسائل استوکیومتری مربوط به گازها می‌توان با استفاده از قانون $\frac{\text{آبگارو}}{\text{نسبت های حجمی}}$ ، ضریب تبدیل حجمی - حجمی مناسب را از روی معادله موازن شده واکنش پیدا کرد. ب) اگر تغییر دمای یک جسم برابر یک درجه سلسیوس باشد در این صورت $\frac{\text{ظرفیت گرمایی}}{\text{ظرفیت گرمایی ویژه}} \times \text{جسم با مقدار گرمایی مبادله شده} = \text{برابر خواهد بود.}$ پ) سدیم تولید شده از تجزیه سدیم آزید (NaN_3) در کیسه هواخودرو، سرانجام به ماده بی خطر $\frac{\text{NaHCO}_3}{\text{Na}_2\text{O}}$ تبدیل می‌شود. ت) به طور میانگین می‌توان فرمول مولکولی بنزین را $\frac{\text{C}_8\text{H}_{18}}{\text{C}_6\text{H}_{12}}$ در نظر گرفت. ث) مجموع انرژی‌های جنبشی و پتانسیل همه ذره‌های تشکیل دهنده یک سامانه، $\frac{\text{انرژی گرمایی}}{\text{انرژی درونی}} \times \text{آن سامانه نامیده می‌شود.}$	۱/۲۵
۲	از فربون‌ها در صنعت به عنوان ماده ایجادکننده سرما در یخچال‌ها و فریزرها استفاده می‌شود. نمونه‌ای از این ترکیب‌ها دارای ۹/۹۳٪ کربن، ۵۸/۶٪ کلر و ۳۱/۴٪ فلوئور است؛ فرمول تجربی این ترکیب را به دست آورید. $C = ۱۲/۰\text{g.mol}^{-1}$ $Cl = ۳۵/۴۵\text{g.mol}^{-1}$ $F = ۱۹\text{g.mol}^{-1}$	۱/۲۵
۳	با توجه به واکنش‌های داده شده به موارد زیر پاسخ دهید. الف) واکنش (a) را موازن کنید. ب) در واکنش (c) جای خالی را کامل کنید. پ) نوع واکنش‌های (b) و (d) را مشخص کنید.	۱/۵
۴	هریک از مخلوط‌های زیر در فشار (۱ atm) و دمای (۲۵ °C) شامل چند فاز است؟ الف) مخلوط گاز NH_3 و گاز N_2 ب) مخلوط آب، یک قطعه یخ، روغن و یک قاشق (بدون هوا)	۰/۵
۵	با توجه به شکل‌های زیر به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید.   	۱/۵
	الف) در شکل (1) تولوئن با کدام ماده زیر مخلوط شده است؟ چرا؟ ا) نفتالن b) لیتیم کلرید ب) مخلوط مواد در کدام شکل الکترولیت است؟ چرا؟ «ادامه سوال‌ها در صفحه دوم»	

با سمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس: شیمی (۳) و آزمایشگاه	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی:	سال سوم آموزش متوسطه نظری	تاریخ امتحان: ۲/۲۷/۱۳۹۵	تعداد صفحه: ۴
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۵ مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir			


سؤالات (پاسخ نامه دارد)

ردیف	نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)
۶	۲	<p>آهن(III) اکسید طبق واکنش زیر با محلول هیدروکلریک اسید واکنش می‌دهد:</p> $\text{Fe}_2\text{O}_3(s) + 6\text{HCl}(aq) \rightarrow 2\text{FeCl}_3(aq) + 3\text{H}_2\text{O}(l)$ <p>الف- برای واکنش کامل ۷۹/۸۵g آهن(III) اکسید(Fe_2O_3) با درصد خلوص ۶۰٪ به چند مول هیدروکلریک اسید(HCl) نیاز است؟ $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 159/7 \text{ g.mol}^{-1}$</p> <p>ب- اگر در آزمایش دیگری ۵۰۰ میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید(HCl) با ۰/۹ مول آهن(III) اکسید(Fe_2O_3) خالص واکنش بدهد، غلظت مولی هیدروکلریک اسید(HCl) را حساب کنید.</p>
۷	۱/۵	<p>با توجه به انحلال خود به خود گاز هیدروژن کلرید در آب به موارد زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) این فرایند با افزایش آنتروپی همراه است یا با کاهش آنتروپی؟ چرا؟</p> <p>ب) کدام یک از حالت‌های زیر بیانگر انحلال خود به خود گاز هیدروژن کلرید در آب است؟ چرا؟</p> <p><u>واکنش دهنده‌ها (حالت آغازی)</u></p> <p>فراآورده‌ها (حالت پایانی)</p> <p>«۱» «۲» «۳»</p>
۸	۱/۷۵	<p>درستی یا نادرستی هریک از عبارت‌های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را در پاسخ نامه بنویسید.</p> <p>الف) افزودن محلول مس(II) سولفات به شیر سبب انعقاد آن می‌گردد.</p> <p>ب) علامت تغییر انرژی درونی سامانه هنگام ذوب یخ منفی است.</p> <p>پ) بخش باردار جزء آنیونی پاک‌کننده صابونی گروه سولفونات می‌باشد.</p> <p>ت) در واکنش $\text{C}_2\text{H}_2(g) + \text{H}_2(g) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4(g)$ آنتالپی استاندارد تشکیل $\text{C}_2\text{H}_4(g)$ بزرگتر از آنتالپی استاندارد تشکیل $\text{C}_2\text{H}_2(g)$ است.</p>
۹	۱/۷۵	<p>با توجه به اطلاعات داده شده، آنتالپی استاندارد واکنش داخل کادر را محاسبه کنید:</p> $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2(aq) + \text{H}_2\text{O}_2(aq) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2(aq) + 2\text{H}_2\text{O}(l)$ <p>۱) $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2(aq) + \text{H}_2(g) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2(aq)$; $\Delta H^\circ = -177 \text{ kJ}$</p> <p>۲) $2\text{H}_2\text{O}_2(aq) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l) + \text{O}_2(g)$; $\Delta H^\circ = -190 \text{ kJ}$</p> <p>۳) $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l)$; $\Delta H^\circ = -572 \text{ kJ}$</p>

«ادامه سوال‌ها در صفحه سوم»

پاسمه تعالیٰ

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۵	مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://ace.medu.ir	سال سوم آموزش متوسطه نظری	تاریخ امتحان: ۲۷/۰۵/۹۴	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی:	سؤالات امتحان نهایی درس: شیمی (۳) و آزمایشگاه علوم تجربی - رشته: ریاضی فیزیک -	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه
---	--	---------------------------	------------------------	---------------	---------------------	--	------------------	-----------------------

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره															
۱۰	نمونه‌های زیر را در شرایط یکسان از نظر ویژگی داده شده، با نوشتن دلیل مقایسه کنید. الف) یک میخ آهنی ۳۰ گرمی - یک قطعه بزرگ آهن ۸۰ کیلوگرمی (نقطه ذوب) ب) ۱۰۰ mL اتانول - ۲۰۰ mL (ظرفیت گرمایی)	۱															
۱۱	اگر بازده درصدی واکنش زیر ۲۵٪ باشد، حجم گاز هیدروژن لازم برای تولید ۵/۰ کیلوگرم آمونیاک را در شرایط استاندارد، بر حسب لیتر محاسبه کنید.	۱/۷۵															
۱۲	$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ $NH_3 = 17/0.3 g \cdot mol^{-1}$ در هر مورد دلیل بنویسید. الف) هنگام انجام واکنش در گرماسنج بمبی، مقدار ΔE برابر با q_v است. ب) گرمای آزاد شده هنگام سوختن یک مول گاز متان در هوای کافی را نمی‌توانیم به عنوان آنتالپی استاندارد سوختن متان در نظر بگیریم. پ) کتری در حال جوشیدن یک سامانه باز محسوب می‌شود.	۱/۵															
۱۳	در دما و فشار ثابت حجم‌های برابر از آب، محلول ۱/۰ مولال نمک خوراکی در آب و محلول ۱/۰ مولال شکر در آب را در سه ظرف مختلف و یکسان ریخته‌ایم پس از مدتی سطح مایع درون ظرف‌ها به صورت زیر در آمده است:  الف) چرا سطح آب خالص پایین‌تر از سطح مایع‌های درون دو ظرف دیگر است? ب) کدام محلول در ظرف «۱» قرار دارد؟ چرا؟	۱															
۱۴	با استفاده از داده‌های جدول زیر به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید.	۱/۷۵															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>نام</th> <th>فرمول شیمیایی</th> <th>انحلال پذیری ($\frac{\text{گرم حل شونده}}{100 \text{ g} H_2O}$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱-هگزانول</td> <td>$C_6H_{12}OH$</td> <td>۰/۵۹</td> </tr> <tr> <td>پتاسیم نیترات</td> <td>KNO_3</td> <td>۳۴</td> </tr> <tr> <td>باریم سولفات</td> <td>$BaSO_4$</td> <td>کمتر از ۰/۰۰۰۳</td> </tr> <tr> <td>۱-بوتanol</td> <td>C_4H_9OH</td> <td>۸/۲۱</td> </tr> </tbody> </table>			نام	فرمول شیمیایی	انحلال پذیری ($\frac{\text{گرم حل شونده}}{100 \text{ g} H_2O}$)	۱-هگزانول	$C_6H_{12}OH$	۰/۵۹	پتاسیم نیترات	KNO_3	۳۴	باریم سولفات	$BaSO_4$	کمتر از ۰/۰۰۰۳	۱-بوتanol	C_4H_9OH	۸/۲۱
نام	فرمول شیمیایی	انحلال پذیری ($\frac{\text{گرم حل شونده}}{100 \text{ g} H_2O}$)															
۱-هگزانول	$C_6H_{12}OH$	۰/۵۹															
پتاسیم نیترات	KNO_3	۳۴															
باریم سولفات	$BaSO_4$	کمتر از ۰/۰۰۰۳															
۱-بوتanol	C_4H_9OH	۸/۲۱															
الف) چرا انحلال پذیری ۱-بوتanol در آب بیشتر از انحلال پذیری ۱-هگزانول در آب است? ب) کدام ماده در آب نامحلول است؟ چرا؟ پ) با استفاده از جدول بالا، درصد چرمی ۱-بوتanol را در محلول سیرشده آن محاسبه کنید.																	

با اسمه تعالی

مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: شیمی (۳) و آزمایشگاه
تعداد صفحه: ۴	تاریخ امتحان: ۱۳۹۵/۲/۲۷	سال سوم آموزش متوسطه نظری	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۵ مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://ace.medu.ir			

ردیف	نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)

۱ H ۱/۰۰۸	راهنمای جدول تناوبی عنصرها												۲ He ۴/۰۰۳
۲ Li ۶/۹۴۱	عدد اتمی ۶												
۱۱ Na ۲۲/۹۹	C جرم اتمی میانگین ۱۲/۰۱												
۱۹ K ۳۹/۱۰	۲۰ Ca ۴۰/۰۸	۲۱ Sc ۴۴/۹۶	۲۲ Ti ۴۷/۸۷	۲۳ V ۵۰/۹۷	۲۴ Cr ۵۲/۰۰	۲۵ Mn ۵۴/۹۴	۲۶ Fe ۵۵/۸۵	۲۷ Co ۵۸/۹۳	۲۸ Ni ۵۸/۶۹	۲۹ Cu ۶۳/۵۵	۳۰ Zn ۶۵/۳۹	۳۱ Ga ۶۹/۷۲	۳۲ Ge ۷۲/۶۶
۳۷ Rb ۸۵/۴۷	۳۸ Sr ۸۷/۶۲	۳۹ Y ۸۸/۹۱	۴۰ Zr ۹۱/۲۲	۴۱ Nb ۹۲/۹۱	۴۲ Mo ۹۵/۹۴	۴۳ Tc (۹۸)	۴۴ Ru ۱۰/۱	۴۵ Rh ۱۰/۲/۹	۴۶ Pd ۱۰/۶/۴	۴۷ Ag ۱۰/۷/۹	۴۸ Cd ۱۱/۲/۴	۴۹ In ۱۱/۴/۸	۵۰ Sn ۱۱/۸/۷
۵۵ Cs ۱۳۲/۹	۵۶ Ba ۱۳۷/۳	۵۷ La ۱۳۸/۹	۷۲ Hf ۱۷۸/۵	۷۳ Ta ۱۸۰/۹	۷۴ W ۱۸۲/۸	۷۵ Re ۱۸۶/۲	۷۶ Os ۱۹۰/۲	۷۷ Ir ۱۹۲/۲	۷۸ Pt ۱۹۵/۱	۷۹ Au ۱۹۷/۰	۸۰ Hg ۲۰۰/۶	۸۱ Tl ۲۰۴/۴	۸۲ Pb ۲۰۷/۲
													۸۳ Bi (۲۰۹)
													۸۴ Po (۲۱۰)
													۸۵ At (۲۲۱)
													۸۶ Rn (۲۲۲)

دانلود نمونه سوالات از سایت ریاضی سرا www.riazisara.ir

باسمہ تعالیٰ

راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: شیمی (۳) و آزمایشگاه رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی سال سوم آموزش متوسطه نظری دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خردادماه سال ۱۳۹۵ مرکز سنجش آموزش و پرورش http://acec.medu.ir

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) نسبت های حجمی «۰/۲۵» ص ۲۵ ب) ظرفیت گرمایی «۰/۲۵» ص ۴۱ ۲۵ ص ۰/۲۵» NaHCO _۲	۱/۲۵
۲	ت) انرژی درونی «۰/۲۵» ص ۴۶ ۳۶ ص ۰/۲۵» C _۸ H _{۱۸}	۱/۲۵
۳	تقسیم بر کوچکترین مقدار (۰/۰۸۲۶) $\frac{۹/۹۳gC \times ۱molC}{۱۲/۰۱gC} = ۰/۸۲۶molC \Rightarrow ۱molC$ تقسیم بر کوچکترین مقدار (۰/۰۸۲۶) $\frac{۵۸/۶gCl \times ۱molCl}{۳۵/۴۵gCl} = ۱/۶۵molCl \Rightarrow ۲molCl \Rightarrow CCl_۴F_۲ \Rightarrow ۰/۰۸۲۶$ تقسیم بر کوچکترین مقدار (۰/۰۸۲۶) $\frac{۳۱/۴gF \times ۱molO}{۱۹gF} = ۱/۶۵molF \Rightarrow ۲molF$ تقسیم بر کوچکترین عدد «۰/۰۸۲۶» ص ۱۶ تا ۱۴	۱/۲۵
۴	الف) ص ۴ و ص ۵ ۴ HNO _۳ (g) + P _۴ O _{۱۰} (s) \rightarrow ۴ HPO _۴ (s) + ۲ N _۲ O _۵ (s) «۰/۰۸۲۶» «۰/۰۸۲۶» «۰/۰۸۲۶» ب) ۱۰ ص «۰/۰۸۲۶» Ca(OH) _۲ پ) b : سنتز یا ترکیب «۰/۰۸۲۶» ص ۷	۰/۷۵ ۰/۲۵ ۰/۵
۵	الف) یک فاز «۰/۰۸۲۶» ۷۵ ص «۰/۰۸۲۶» ب) چهار فاز «۰/۰۸۲۶» ص ۷۵ الف) لیتیم کلرید «۰/۰۸۲۶» - زیرا همان طور که در شکل نشان داده شده است یک ترکیب یونی نامحلول در تولوئن است ولی نفتالن که مولکول های ناقطبی دارد در تولوئن حل می شود. «۰/۰۸۲۶» ص ۷۸ ب) شکل «۳» «۰/۰۸۲۶» - زیرا حل شونده به صورت یونی در آب حل شده است و رسانای الکتریسیته است. «۰/۰۸۲۶» ص ۹۲	۰/۷۵ ۰/۷۵
۶	الف) ص ۲۴ ۱/۸ mol HCl = $\frac{۶\cdot ۹gFe_۲O_۳}{۷۹/۸۵gFe_۲O_۳} \times \frac{۱molFe_۲O_۳}{۱۵۹/۷۶gFe_۲O_۳} \times \frac{۶molHCl}{۱molFe_۲O_۳}$ «۰/۰۸۲۶» «۰/۰۸۲۶» «۰/۰۸۲۶» «۰/۰۸۲۶» ب) ص ۹۱ و ص ۹۲ $\frac{۱L \times ۵۰۰mL}{۱۰۰mL} \times \frac{۱L \times ۵molHCl}{۱۰۰mL} = ۵/۴molHCl$ $\frac{۰/۹molFe_۲O_۳ \times ۶molHCl}{۱molFe_۲O_۳} = ۵/۴molHCl$ تعداد مول حل شونده $= \frac{۵/۴molHCl}{۰/۵L} = ۱۰/۸mol \cdot L^{-۱}$ = غلظت مولی \Rightarrow غلظت مولی \Rightarrow محلول (بر حسب لیتر)	۱
	ادامه راهنمای در صفحه دوم «	

با اسمه تعالی

راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس : شیمی (۳) و آزمایشگاه	رشته : ریاضی فیزیک - علوم تجربی
تاریخ امتحان : ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۷	سال سوم آموزش متوسطه نظری
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خردادماه سال ۱۳۹۵ http://ace.medu.ir	مرکز سنجش آموزش و پژوهش

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۷	الف) کاهش آنتروپی «۰/۲۵» زیرا حل شدن گازها در آب با کاهش آنتروپی همراه است. «۰/۲۵» ص ۸۳ ب) <u>حالت ۲</u> «۰/۲۵»- زیرا حل شدن هیدروژن کلرید در آب خودبه خودی است بنابراین باستی $\Delta G < 0$ منفی باشد «۰/۲۵» یعنی با این که علامت عبارت $T\Delta S - \text{مثبت است}$ «۰/۲۵» ولی علامت $\Delta H < 0$ منفی است و در این مورد عامل مساعد (آنتالپی) بر عامل نامساعد (آنتروپی) غلبه کرده است و فرایند حل شدن خود به خود پیش رفته است. «۰/۲۵» ص ۷۱	۰/۵
۸	الف) درست «۰/۲۵» ص ۱۰۱ ب) نادرست «۰/۲۵»- علامت تغییر انرژی درونی سامانه هنگام ذوب بخ مثبت است. «۰/۲۵» ص ۴۷ پ) نادرست «۰/۲۵»- بخش باردار جزء آنیونی پاک کننده غیرصابونی گروه سولفونات می باشد یا بخش باردار جزء آنیونی پاک کننده صابونی گروه کربوکسیلات می باشد «۰/۲۵» ص ۱۰۳ ت) نادرست «۰/۲۵»- آنتالپی استاندارد تشکیل C_2H_4 است «۰/۲۵» ص ۶۳	۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵
۹	روش اول: با توجه به واکنش داخل کادر: باستی واکنش اول را وارونه کنیم «۰/۲۵» پس $\Delta H_f^\circ = +177 \text{ kJ}$ است «۰/۲۵»، ضرایب واکنش دوم را نصف کنیم «۰/۲۵» پس $\Delta H_d^\circ = -95 \text{ kJ}$ است «۰/۲۵» و ضرایب واکنش سوم را نیز نصف کنیم «۰/۲۵» پس $\Delta H_e^\circ = -286 \text{ kJ}$ است «۰/۲۵» $\Delta H = \Delta H_f^\circ + \Delta H_d^\circ + \Delta H_e^\circ = (+177 \text{ kJ}) + (-95 \text{ kJ}) + (-286 \text{ kJ}) = -204 \text{ kJ} \quad (۰/۲۵)$ روش دوم: با توجه به واکنش داخل کادر: ۴) $C_2H_4O_2(aq) \rightarrow C_2H_4O_2(aq) + H_2(g) \quad ; \quad \Delta H_f^\circ = +177 \text{ kJ} \quad (۰/۵)$ ۵) $H_2O_2(aq) \rightarrow H_2O(l) + \frac{1}{2} O_2(g) \quad ; \quad \Delta H_d^\circ = -95 \text{ kJ} \quad (۰/۵)$ ۶) $H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(l) \quad ; \quad \Delta H_e^\circ = -286 \text{ kJ} \quad (۰/۵)$ $C_2H_4O_2(aq) + H_2O_2(aq) \rightarrow C_2H_4O_2(aq) + 2H_2O(l) \quad (\text{واکنش کلی})$ ص ۵۹ تا ص ۶۳ = $\Delta H_f^\circ + \Delta H_d^\circ + \Delta H_e^\circ = (+177 \text{ kJ}) + (-95 \text{ kJ}) + (-286 \text{ kJ}) = -204 \text{ kJ} \quad (۰/۲۵)$	۱/۷۵
۱۰	الف) نقطه ذوب این دو جسم با هم برابر است «۰/۲۵»- زیرا نقطه ذوب کمیتی شدتی است. «۰/۲۵» ص ۴۶ ب) ظرفیت گرمایی 200 mL اتانول بیشتر است «۰/۲۵»- زیرا ظرفیت گرمایی یک کمیت مقداری است و به مقدار ماده بستگی دارد. «۰/۲۵» ص ۴۶	۰/۵ ۰/۵
۱۱	* ص ۲۵ تا ص ۳۳ * $\text{مقدار عملی} = \frac{\text{مقدار نظری}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 \Rightarrow 25 = \frac{0.5 \text{ kg NH}_3}{\text{مقدار نظری}} \times 100 \Rightarrow \text{مقدار نظری} = 2 \text{ kg NH}_3 \quad (۰/۲۵)$ $2 \text{ kg NH}_3 \times \frac{100 \text{ g NH}_3}{1 \text{ kg NH}_3} \times \frac{1 \text{ mol NH}_3}{17.03 \text{ g NH}_3} \times \frac{2 \text{ mol H}_2}{2 \text{ mol NH}_3} \times \frac{22.4 \text{ L H}_2}{1 \text{ mol H}_2} = 3945.97 \text{ L H}_2 \quad (۰/۲۵)$ «ادامه راهنمای در صفحه سوم»	۱/۷۵

با اسمه تعالی

رشته : ریاضی فیزیک - علوم تجربی	سال سوم آموزش متوسطه نظری
تاریخ امتحان : ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۷	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سواسترسور در نوبت خردادماه سال ۱۳۹۵ http://aee.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	الف) زیرا در گرماسنج بمبی واکنش در حجم ثابت انجام می شود «۰/۲۵» پس $W = q_v \cdot \Delta E = q_v \cdot ۴۹$ ص	۰/۵
۱۳	ب) زیرا گرمای آزاد شده هنگام سوختن یک مول متان در اکسیژن کافی و خالص به عنوان آنتالپی استاندارد سوختن متان در نظر گرفته می شود. «۵/۰» ص	۰/۵
	پ) زیرا با محیط هم مبادله ماده «۰/۲۵» و هم مبادله انرژی «۰/۲۵» دارد . ص ۴۵	۰/۵
۱۴	الف) زیرا آب خالص دارای حل شونده غیر فرار نیست و سرعت تبخیر سطحی در آن زیادتر است (مولکول های آن بدون داشتن مزاحمت به راحتی از سطح آن بخار می شوند) «۰/۲۵» ص ۹۴	۰/۲۵
	ب) محلول ۱/۰ مولال شکر در ظرف «۱» قرار دارد «۰/۲۵» - زیرا نسبت به محلول ۱/۰ مولال سدیم کلرید ذره های حل شونده غیر فرار کمتری دارد بنابراین سرعت تبخیر سطحی در آن زیادتر است (مولکول های حل برای تبخیر شدن با مزاحمت کمتری مواجه هستند) «۰/۵» ص ۹۴	۰/۷۵
	الف) زیرا بخش ناقطبی آن کوچکتر از بخش ناقطبی مولکول ۱-هگزانول است «۰/۲۵» بنابراین در حال قطبی (آب) بیشتر حل می شود. «۰/۲۵» ص ۸۰	۰/۵
	ب) باریم سولفات «۰/۲۵» - زیرا انحلال پذیری آن کمتر از ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ ص ۷۷	۰/۵
	پ) ص ۸۸	۰/۷۵
	$\text{جرم حل شونده} = \frac{۸/۲۱g}{۱۰۸/۲۱g} \times ۱۰۰ = ۷/۵۸\%$ $\text{جرم محلول} = \frac{۸/۲۱g}{۱۰۸/۲۱g} \times ۱۰۰ = ۰/۲۵$	

همکار محترم ضمن عرض خدا قوت؛ لطفاً برای پاسخ های درست بر پایه کتاب (به جز به کاربردن تناسب در حل مسائل عددی) نمره منظور فرمایید.