



سایت ویژه ریاضیات www.riazisara.ir

درسنامه ها و جزوه های دروس ریاضیات

دانلود نمونه سوالات امتحانات ریاضی

نمونه سوالات و پاسخنامه کنکور

دانلود نرم افزارهای ریاضیات

و...و

کانال سایت ریاضی سرا در تلگرام:

<https://telegram.me/riazisara> (@riazisara)

ریاضی ، ریاضی پیش‌دانشگاهی ، - ۱۳۹۵۰۲۳۱

۶۱- اگر $2 \log \sqrt{x} = \log \frac{1}{x} + 2 \log 2$ باشد، آن‌گاه مقدار x کدام است؟

-۲ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۱) صفر

شما پاسخ نداده اید

۶۲- با توجه به رابطه‌ی $M = \frac{2}{3} \log \frac{E}{E_0}$ قدرت زلزله در مقیاس ریشر و $J = 1.4 / M$ زلزله‌ای

به قدرت $4/4$ ریشر چند ژول انرژی آزاد می‌کند؟

۱۰.۸ (۴)

۱۰.۷/۶ (۳)

۱۰.۶/۶ (۲)

۱) ۱۱

شما پاسخ نداده اید

۶۳- اگر نیم عمر کربن ۵۷۰۰ باشد، پس از چند قرن جسم فسیلی ۳۰ درصد کربن اولیه‌ی خود را از

دست می‌دهد؟ ($\log 2 \approx 0.3$ و $\log 7 \approx 0.8$)

۴۰ (۴)

۳۸ (۳)

۳۵ (۲)

۳۲ (۱)

شما پاسخ نداده اید

۶۴- اگر نرخ رشد تورم ۱۲ درصد باشد، آن‌گاه کالایی که قیمت فعلی آن ۱۵۰۰ تومان است، پس از سه

سال قیمت آن تقریباً چند تومان است؟

۲۲۱۰ (۴)

۲۱۰۷ (۳)

۲۰۵۰ (۲)

۱۸۰۲ (۱)

شما پاسخ نداده اید

۶۵- مجموع دو عدد ۱۲ است. بیشترین مقدار حاصل ضرب آن‌ها کدام است؟

۴۸ (۴)

۳۶ (۳)

۲۷ (۲)

۲۰ (۱)

شما پاسخ نداده اید

۶۶- در یک شرکت تولیدی اگر معادله‌ی تقاضا به صورت $x - 27 - 3p = 0$ باشد، قیمت یک واحد کالا در

حالت ماقزیم درآمد کدام است؟ (p قیمت یک واحد کالا است).

۴/۵ (۴)

۴ (۳)

۳/۵ (۲)

۳ (۱)

شما پاسخ نداده اید

۶۷- در کیسه‌ی A پنج گوی به شماره‌های ۱, ۲, ۳, ۴, ۵ و در کیسه‌ی B سه گوی به شماره‌های ۱, ۳, ۵ وجود دارد. از هر کیسه یک گوی به تصادف انتخاب می‌کنیم. احتمال این‌که عدد گوی‌های خارج شده از هر دو کیسه یکسان باشد، کدام است؟

$$\frac{3}{4} \quad (4)$$

$$\frac{2}{3} \quad (3)$$

$$\frac{1}{5} \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} \quad (1)$$

شما پاسخ نداده اید

۶۸- ۴ مهره از ده مهره‌ی موجود در یک کیسه سفید و بقیه سیاه است. اگر به طور همزمان سه مهره به تصادف از بین آن‌ها خارج کنیم، احتمال آن‌که این سه مهره سیاه باشند کدام است؟

$$\frac{1}{4} \quad (4)$$

$$\frac{1}{5} \quad (3)$$

$$\frac{1}{6} \quad (2)$$

$$\frac{1}{7} \quad (1)$$

شما پاسخ نداده اید

۶۹- در پرتاپ ۲ تاس سالم با هم، احتمال آن‌که مجموع دو عدد ظاهر شده حداکثر ۴ باشد، کدام است؟

$$\frac{1}{6} \quad (4)$$

$$\frac{1}{4} \quad (3)$$

$$\frac{1}{8} \quad (2)$$

$$\frac{1}{7} \quad (1)$$

شما پاسخ نداده اید

۷۰- جدول زیر، آمار دانشجویان یک دانشکده را نشان می‌دهد. اگر دانشجویی از این دانشگاه به تصادف انتخاب شود، احتمال آن‌که پسر و شهرستانی باشد کدام است؟

جنسیت شهر	پسر	دختر
شهرستانی	۱۵۰	۲۰۰
تهرانی	۳۰۰	۳۵۰

$$0/35 \quad (4)$$

$$0/035 \quad (3)$$

$$0/15 \quad (2)$$

$$0/015 \quad (1)$$

شما پاسخ نداده اید

ریاضی ، ریاضی پیش‌دانشگاهی - گواه ، - ۱۳۹۵۰۲۳۱

۷۱- از معادله‌ی $\log(x+1) + \log(x-1) = \frac{1}{3}\log 125 - 2\log 2$ ، مقدار x کدام است؟

$$\frac{5}{2} \quad (4)$$

$$\frac{3}{2} \quad (3)$$

$$\frac{5}{4} \quad (2)$$

$$\frac{3}{4} \quad (1)$$

شما پاسخ نداده اید

۷۳- می دانیم شدت صدا از رابطه $D = 10 \log \frac{I}{I_0}$ محاسبه می شود ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$). تقریباً چند

واحد دسی بل باشد 2×10^{-10} وات در هر متر مربع ایجاد می شود؟ ($\log 2 = 0.3010$)

۲۵) ۴

۲۴) ۳

۲۳) ۲

۲۶) ۱

شما پاسخ نداده اید

۷۴- جمعیت یک کشور با گذشت ۴۰ سال ۴ برابر شده است. یک جمعیت با همین رشد ثابت با گذشت ۶۰ سال چند برابر خواهد شد؟

۹) ۴

۸) ۳

۶) ۲

۵) ۱

شما پاسخ نداده اید

۷۵- یک ظرف سفالی با قدمت ۲۸ قرن از زیر خاک بیرون آمده است. انتظار می رود تقریباً چند درصد از کربن (C^{14}) باقی مانده باشد؟ (نیم عمر کربن ۵۶۰۰ سال است).

۹۰) ۴

۷۰) ۳

۵۰) ۲

۴۰) ۱

شما پاسخ نداده اید

۷۶- یک کارگر ماهر، به مدیر کارگاهی متعهد شده است که در هر هفته، ۵۰ عدد کالا به قیمت هر واحد ۶۰۰ تومان تحویل دهد. در مقابل هر یک عدد کالای اضافی که تحویل دهد، از قیمت هر کالای ساخته شده، ۱۰ تومان کسر شود. بیشترین اجرت این کارگر در این هفته، چند تومان است؟

۳۰۷۵۰) ۴

۳۰۵۰۰) ۳

۳۰۴۵۰) ۲

۳۰۲۵۰) ۱

شما پاسخ نداده اید

۷۷- اگر x تعداد کالای مورد درخواست و p قیمت هر واحد کالا باشد، معادله تقاضا به صورت $p = 6000 - 60x$ است، ماکزیمم درآمد کدام است؟

۴۰۰۵۰۰) ۴

۳۳۷۵۰۰) ۳

۳۲۲۵۰۰) ۲

۳۸۳۵۰۰) ۱

شما پاسخ نداده اید

۷۸- اگر x تعداد واحد کالای مورد تقاضا باشد، معادلات درآمد و هزینه به ترتیب به صورت $C(x) = 500 + 20x$ و $R(x) = 200x - \frac{x^2}{3}$ باشند، ماکزیمم سود به ازای کدام مقدار x حاصل می شود؟

۲۴۰) ۴

۲۷۰) ۳

۳۰۰) ۲

۳۲۰) ۱

شما پاسخ نداده اید

۷۹- صفحه عقربه را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم می کنیم. اگر در ۱۰۰ بار چرخش، عقربه ۸ بار در ناحیه نهم قرار گیرد، اختلاف تخمین احتمال و احتمال نظری چقدر است؟

$\frac{1}{360}) ۴$

$\frac{1}{300}) ۳$

$\frac{1}{240}) ۲$

$\frac{1}{180}) ۱$

شما پاسخ نداده اید

۷۹- یک تاس سفید و یک تاس آبی را با هم پرتاب می‌کنیم. با کدام احتمال مجموع دو عدد ظاهر شده

برابر ۵ است؟

$$\frac{1}{8} \text{) ۴}$$

$$\frac{1}{6} \text{) ۳}$$

$$\frac{1}{12} \text{) ۲}$$

$$\frac{1}{9} \text{) ۱)$$

شما پاسخ نداده اید

۸۰- از ۳۶ دانشآموز یک کلاس که حداقل به یکی از دو ورزش والیبال یا فوتبال علاقه‌مندند ۲۵ نفر

به ورزش فوتبال و ۲۰ نفر به ورزش والیبال علاقه‌مند هستند، یک نفر به تصادف انتخاب شده است.

احتمال این که این فرد هم به فوتبال و هم به والیبال علاقه‌مند باشد، کدام است؟

$$\frac{1}{4} \text{) ۴}$$

$$\frac{1}{3} \text{) ۳}$$

$$\frac{2}{9} \text{) ۲}$$

$$\frac{1}{6} \text{) ۱)$$

شما پاسخ نداده اید

ریاضی ، ریاضی پیش‌دانشگاهی ، - ۱۳۹۵۰۲۳۱

(محمد بهیرابی)

-۶۱

$$2 \log \sqrt{x} - \log \frac{1}{x} = 2 \log 2$$

$$\Rightarrow \log(\sqrt{x})^2 - \log \frac{1}{x} = \log 4 \Rightarrow \log x - \log \frac{1}{x} = \log 4$$

$$\Rightarrow \log \frac{x}{\frac{1}{x}} = \log 4 \Rightarrow \frac{x}{\frac{1}{x}} = 4 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 & \text{ق.ق} \\ x = -2 & \text{غ.ق.ق} \end{cases}$$

(ریاضی پایه، لگاریتم، صفحه‌های ۷۵ تا ۷۹)

۴

۳✓

۲

۱

(محمد بهیرابی)

-۶۲

$$M = \frac{2}{3} \log \frac{E}{E_0} \Rightarrow 4/4 = \frac{2}{3} \log \frac{E}{1.4/4}$$

$$\Rightarrow 6/6 = \log \frac{E}{1.4/4} \Rightarrow \frac{E}{1.4/4} = 1.6/6 \Rightarrow E = 1.6/6 \times 1.4/4$$

$$\Rightarrow E = 1.11 J$$

(ریاضی پایه، لگاریتم، صفحه‌های ۷۵ تا ۷۹)

۴

۳

۲

۱✓

(همیدرضا سهودی)

چون 30 درصد کربن اولیه‌ی خود را از دست داده، پس 70 درصد آن باقی‌مانده است، یعنی:

$$b = 100\% - 30\% = 70\% \Rightarrow b = \frac{70}{100} = \frac{7}{10}$$

$$b = \left(\frac{1}{2}\right)^T \Rightarrow \frac{7}{10} = \left(\frac{1}{2}\right)^T \Rightarrow T \log \frac{1}{2} = \log \frac{7}{10}$$

$$\Rightarrow T(\log 1 - \log 2) = \log 7 - \log 10.$$

$$\Rightarrow T = \frac{\log 7 - \log 10}{\log 1 - \log 2} = \frac{0.845}{-0.301} = \frac{-0.296}{-0.301} = \frac{2}{3}$$

$$T = \frac{\text{قدمت}}{\text{نیم عمر}} \Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{t}{5700}$$

$$\Rightarrow t = \frac{5700 \times 2}{3} = \frac{11400}{3} = 3800 \text{ سال}$$

(ریاضی پایه، مدل‌سازی، صفحه‌های ۹۱ تا ۱۰۵)

۴

۳✓

۲

۱

(همیدرضا سهودی)

$$r = 0/12$$

$$A_0 = 1500$$

$$t = 3$$

$$A_t = A_0(1+r)^t \xrightarrow{t=3} A_3 = 1500 \times (1+0/12)^3$$

$$\Rightarrow A_3 = 1500 \times (1/12)^3 = 1500 \times 1/4096 = 2107/392 \text{ تومان}$$

(ریاضی پایه، مدل‌سازی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۱)

۴

۳✓

۲

۱

(کورش داودی)

$$x + y = 12 \Rightarrow y = 12 - x$$

$$x \times y = x \times (12 - x) = 12x - x^2$$

$$x_{\max} = -\frac{b}{2a} = -\frac{12}{2 \times (-1)} = 6$$

$$\Rightarrow x = y = 6 \Rightarrow x \times y = 6 \times 6 = 36$$

(ریاضی پایه، مدل‌سازی، صفحه‌های ۱۰۵ تا ۱۱۳)

۴

۳✓

۲

۱

(کورش داودی)

$$3p = 27 - x \Rightarrow p = 9 - \frac{1}{3}x$$

$$R(x) = x \times (9 - \frac{1}{3}x) = 9x - \frac{1}{3}x^2$$

$$x_{\max} = -\frac{b}{2a} = -\frac{9}{2(-\frac{1}{3})} = 13/5$$

$$\Rightarrow p = 9 - \frac{1}{3} \times 13/5 = 9 - 4/5 = 4/5$$

(ریاضی پایه، مدل سازی، صفحه های ۱۰۶ تا ۱۳۳)

 ۴✓ ۳ ۲ ۱

(همیدرضا سپوری)

$$\begin{cases} n(S) = 5 \times 3 = 15 \\ A = \{(1,1), (3,3), (5,5)\} \Rightarrow n(A) = 3 \end{cases}$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

(ریاضی پایه، احتمال، صفحه های ۱۲۹ تا ۱۳۳)

 ۴ ۳ ۲✓ ۱

(لیلا هاپی علیا)

اگر بخواهیم هر سه مهره سیاه باشند، باید این مهره ها از بین ۶ مهره هی سیاه انتخاب شوند، بنابراین داریم:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{\frac{6!}{3! \times 3!}}{\frac{10!}{3! \times 7!}}$$

$$= \frac{6! \times 3! \times 7!}{10! \times 3! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3! \times 7!}{10 \times 9 \times 8 \times 7! \times 3!} = \frac{1}{6}$$

(ریاضی پایه، احتمال، صفحه های ۱۲۹ تا ۱۳۳)

 ۴ ۳ ۲✓ ۱

(کورش داودی)

$$\begin{cases} n(S) = 6^2 = 36 \\ A = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (3,1)\} \Rightarrow n(A) = 6 \end{cases}$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

(ریاضی پایه، احتمال، صفحه‌های ۱۲۳ تا ۱۲۹)

۴✓

۳

۲

۱

(محمد بهیرانی)

$$n(S) = 300 + 200 + 350 + 150 = 1000$$

$$n(A) = 150$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{150}{1000} = 0.15$$

(ریاضی پایه، احتمال، صفحه‌های ۱۲۳ تا ۱۲۹)

۴

۳

۲✓

۱

ریاضی، ریاضی پیش‌دانشگاهی - گواه، - ۱۳۹۵۰۲۳۱

(کنکور سراسری ۸۱)

طرفین معادله را به یک لگاریتم تبدیل می‌کنیم:

$$\log(x+1) + \log(x-1) = \frac{1}{3} \log 125 - 2 \log 2$$

$$\Rightarrow \log \underbrace{(x+1)(x-1)}_{\text{اتحاد مزدوج}} = \log(5^3)^{\frac{1}{3}} - \log 2^2$$

$$\Rightarrow \log(x^2 - 1) = \log 5 - \log 4 \Rightarrow \log(x^2 - 1) = \log \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow x^2 - 1 = \frac{5}{4} \Rightarrow x^2 = \frac{5}{4} + 1 \Rightarrow x^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} & \text{قابل قبول} \\ x = -\frac{3}{2} & \text{غیر قابل قبول} \end{cases}$$

(ریاضی پایه، لگاریتم، صفحه‌های ۷۵ تا ۷۹)

۴

۳✓

۲

۱

(کنکور سراسری ۷۷)

$$D = 1 \cdot \log \frac{I}{I_0} \Rightarrow D = 1 \cdot \log \frac{2 \times 10^{-10}}{10^{-12}} \Rightarrow D = 1 \cdot \log(2 \times 10^2)$$

$$\Rightarrow D = 1 \cdot \left[\log 2 + 2 \underbrace{\log 10}_{1} \right] \Rightarrow D = 1 \cdot \left[\underbrace{0 / 301 + 2}_{2 / 301} \right]$$

$$\Rightarrow D = 10 \times 2 / 301 \Rightarrow D = 23 / 0.1 \approx 230$$

(ریاضی پایه، گلاریتم، صفحه‌های ۷۵ تا ۸۵)

۴

۳

۲ ✓

۱

(کنکور سراسری ۸۵)

ابتدا می‌بایستی پیدا کنیم جمعیت پس از چند سال ۲ برابر می‌شود
چون جمعیت پس از ۴۰ سال ۴ برابر می‌شود پس از ۲۰ سال دو برابر
خواهد شد و ۶۰ سال سه بازه‌ی ۲۰ ساله است و اگر جمعیت ابتدایی

باشد داریم:

$$A_0 \xrightarrow[\text{دو برابر}]{\text{۲۰ سال}} 2A_0 \xrightarrow[\text{دو برابر}]{\text{۲۰ سال}} 4A_0 \xrightarrow[\text{دو برابر}]{\text{۲۰ سال}} 8A_0$$

(ریاضی پایه، مدل‌سازی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۸)

۴

۳ ✓

۲

۱

(کنکور سراسری ۷۶)

$$T = \frac{\text{عمر عنصر}}{\text{نیم عمر}} = \frac{2800}{5600} = \frac{1}{2}$$

$$b = \left(\frac{1}{2}\right)^T = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx \frac{1/4}{2} = 0.7$$

$$= 0.7 \times 100 = 70\%$$

(ریاضی پایه، مدل‌سازی، صفحه‌های ۹۸ تا ۱۰۵)

۴

۳ ✓

۲

۱

اگر این کارگر ۵۰ کالا بفروشد قیمت هر کالا ۶۰۰ تومان می‌باشد بنابراین درآمد فروش 50×600 می‌شود، اما اگر X واحد اضافه‌تر بفروشد تعداد کالای فروخته شده $X+50$ خواهد شد و به ازای X واحد کالای بیش‌تر $100 - X$ تومان قیمت کسر می‌گردد یعنی قیمت فروش هر کالا $100 - X - 600$ می‌شود.

قیمت \times تعداد کالا = درآمد

$$\begin{aligned} R &= (50 + x)(600 - 10x) = 30000 - 500x + 600x - 10x^2 \\ \Rightarrow R &= -10x^2 + 100x + 30000 \\ \Rightarrow R_{\max} &= \frac{4ac - b^2}{4a} = \frac{4 \times (-10) \times (30000) - 100^2}{4 \times (-10)} \\ &= \frac{-1200000 - 10000}{-40} = \frac{-1210000}{-40} = 30250 \text{ تومان} \end{aligned}$$

(ریاضی پایه، مدل‌سازی، صفحه‌های ۱۰۶ تا ۱۱۳)

۴

۳

۲

۱ ✓

$$\begin{aligned} x &= 9000 - 6 \cdot p \Rightarrow 6 \cdot p = -x + 9000 \\ \Rightarrow p &= \frac{-1}{6}x + \frac{9000}{6} = \frac{-1}{6}x + 150. \end{aligned}$$

$R = x \times p = x \left(\frac{-1}{6}x + 150 \right) = \frac{-1}{6}x^2 + 150x$

$$\Rightarrow R_{\max} = \frac{4ac - b^2}{4a} = \frac{4 \left(\frac{-1}{6} \right) (.) - 150^2}{4 \left(\frac{-1}{6} \right)} = \frac{-150^2}{\frac{-1}{15}}$$

$$= 22500 \times 15 = 337500$$

(ریاضی پایه، مدل‌سازی، صفحه‌های ۱۰۶ تا ۱۱۳)

۴

۳ ✓

۲

۱

(کنکور سراسری ۱۰)

سود برابر است با درآمد منهای هزینه

$$P(x) = R(x) - C(x) \quad \text{سود} = R(x) - C(x)$$

$$= 20x - \frac{x^2}{3} - (500 + 20x)$$

$$P(x) = -\frac{x^2}{3} + 18x - 500$$

$$\Rightarrow x_{\max} = -\frac{b}{2a} \Rightarrow x_{\max} = -\frac{180}{2(-\frac{1}{3})} = \frac{-180}{-\frac{2}{3}} = \frac{180 \times 3}{2} = 270$$

(ریاضی پایه، مدل سازی، صفحه های ۱۰۶ تا ۱۱۳)

۴

۳✓

۲

۱

(کنکور سراسری ۱۹)

$$\begin{cases} \text{احتمال نظری} & = \frac{1}{12} \\ \text{تعداد حالت های مطلوب پیشامد} & = \frac{\text{تخمین احتمال}}{\text{تعداد کل آزمایش ها}} = \frac{8}{100} \\ \Rightarrow \frac{1}{12} - \frac{8}{100} & = \frac{100 - 96}{1200} = \frac{4}{1200} = \frac{1}{300} \end{cases}$$

(ریاضی پایه، احتمال، صفحه های ۱۱۷ تا ۱۲۹)

۴

۳✓

۲

۱

(کنکور سراسری ۱۰)

$$n(S) = 6 \times 6 = 36 \quad , \quad A = \{(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)\}$$

حالاتی که مجموع برابر ۵ می شود

$$\Rightarrow n(A) = 4 \Rightarrow P(A) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

(ریاضی پایه، احتمال، صفحه های ۱۲۳ تا ۱۲۹)

۴

۳

۲

۱✓

(خارج از کشور ۱۲)

$$n(S) = ۳۶$$

$A \Rightarrow n(A) = ۲۵$: علاقمندان به فوتبال

$B \Rightarrow n(B) = ۲۰$: علاقمندان به والیبال

$$۲۰ + ۲۵ = ۴۵ \Rightarrow n(A \cap B) = ۴۵ - ۳۶ = ۹$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = \frac{۹}{۳۶} = \frac{۱}{۴}$$

$P(A \cap B)$: احتمال علاقه‌مندی به فوتبال و والیبال است.

(ریاضی پایه، احتمال، صفحه‌های ۱۲۹ تا ۱۳۳)

۱

۲

۳

۴