



www.riazisara.ir سایت ویژه ریاضیات

درسنامه ها و جزوه های دروس ریاضیات

دانلود نمونه سوالات امتحانات ریاضی

نمونه سوالات و پاسخنامه کنکور

دانلود نرم افزارهای ریاضیات

و...و

کانال سایت ریاضی سرا در تلگرام:

[@riazisara](https://telegram.me/riazisara)

دباله خور

دباله های حسابی و هندسی

نویسنده:

حسین ایزن



دنباله‌هور

(دنباله‌های حسابی و هندسی)

حسین ایزن

ویرایش اول: بهمن ۹۵

فهرست

عنوان	صفحه
بخش اول: دنباله های حسابی	۱
بخش دوم: دنباله های هندسی	۴۲
بخش سوم: موشکافی تست های کنکور سراسری (۹۰-۹۵)	به زودی
بخش چهارم: مسائل خفن	به زودی

مقدمه

به لطف خداکار، تایپ و صفحه بندی کتاب سوم من هم به اتمام رسید در این کتاب که اسمش رو دنباله فور گذاشتم به بحث در مورد دنباله های حسابی و هندسی پرداخته می شود مطالب این کتاب برای پیهه های دبیرستانی و کسانی که قصد شرکت در کنکور سراسری رو دارن نوشته شده. طبق روال دو کتاب قبلیم این کتاب هم به زبان ساده و آمیخته به طرز نوشته شده و مطالب به صورتی بیان شده که دانش آموزان با پایه ضعیف و متوسط و کسانی که به معلم دسترسی ندارن بتوان از کتاب استفاده کنن. مطالب این کتاب شامل چهار بخش هست. در بخش اول دنباله حسابی به همراه مسائل و تست‌های متنوع مطرح شده است و بخش دوم به دنباله هندسی اختصاص دارد. دو بخش دیگر کتاب یعنی موشکافی کنکورهای سراسری پندر سال اخیر (در این قسمت با دید برد و جالبی سوالات کنکور بررسی شده) و همچنین مسائل فنون (دشوار) از دنباله ها رو نوشتم و در صورتی که فیబیک فوبی از ویرایش اول کتاب بگیرم هتما در ویرایش بعدی اونها رو هم اضافه می کنم (راستش تایپشون خیلی در درس داره). مثل همیشه سعی کردم که ماحصل کار کتابی کم اشتباه و با ظاهری باکیفیت از آب در بیار امیدوارم این تلاش مورد قبول دانش آموزان سرزمینیم و دیران عزیز قرار بگیره. مشتاقانه پذیرای نظرات ارزشمند همه عزیزان هستم.

در آفر لازمه تشكر ویژه ای داشته باشم از مدیران ممتاز سایت های پی سی (انلود)، کنکور، پارس بوک (<http://ketabnak.com>)، [کنکور](http://konkur.in) (www.parsbook.org) و ... که همت انتشار کتابهای قبلی من رو بر عهده گرفتن. و اما، روشی ارتباط:

وبلاگ انگرال فور: integralkhor.blogfa.com

کانال تلگرام انگرال فور: [@integralkhor](https://t.me/integralkhor)

ایمیل انگرال فور: integralkhor@gmail.com

SMS: 0938 572 5274

حسین ایزن

۷ بهمن ۱۳۹۵

پون دوستان زیادی از من در مورد کتابها می‌کنند فرمتون بگم که فعلاً این دو کتاب از من پاپ شده که در زیر عکسشون، و ملاحظه می‌کنید و برای تهیه این کتابها کافیه به کتابفروشی‌های معتبر شهر خودشون مراجعه نکنید!! پون هردوشون به صورت رایگان در اینترنت در سترس همه هستن. (بگذریم که عده‌ای این کتابها، و به اسم خودشون به مدت می‌خروشن!!)



اولین کتابم انتگرال فور (جلد اول) هستش که حدود پنج سال پیش منتشر شده و در مورد انتگرال نامعین هست و بیشتر به کار دانش بجهات میفوره البته دانش آموزای زرگ و علاقمند هم پیزهای جالبی توی این کتاب پیدا می‌کنند. این کتاب علاوه بر ایران در افغانستان هم طرفداری زیادی دارد!



روشی عدم موفقیت در کنکور، اسم دومین کتاب من هست که پندر ماهیه منتشر شده و البته به معروفیت انتگرال فور نیست. این کتاب در اصل برای دانش آموزای دیبرستانی که قصد شرکت در کنکور سراسری را دارن نوشته شده و حاصل تبریزیات من در زمینه کنکور هست. این کتاب به زبان طنز نوشته شده و میتوانه واسه دانش بجهاتی که میتوان کنکور ارشد بدن و کلا واسه کسایی که دنبال شیوه‌های مناسب مطالعه هستن مفید باشد.

دنباله حسابی

فب بریم سراغ اویین میتمون یعنی دنباله ها:

اصولا به پندر تا عدر که پشت سر هم قرار گرفتند می کیم دنباله مثلا

$$2, 5, 12, 17, \dots$$

وقت کنید که بین عددها هیچ علامتی نیست! به هر کدام از این عددها میگیم یه جمله دنباله

بنابراین 2 میشه جمله اول، 5 میشه جمله دوم، 12 میشه جمله سوم و ...

معمولا جملات یه دنباله رو با صروف اندیس دار نشون میدیم مثلا a_1 میشه جمله اول، a_2 میشه جمله دوم و ... بنابراین در دنباله بالا داریم:

$$a_1 = 2 \quad a_2 = 5 \quad a_3 = 12 \quad a_4 = 17, \dots$$

اکثر اوقات جملات یه دنباله از نظم خاصی پیروی می کنند مثلا دنباله زیر رو در نظر بگیرین:

$$2, 4, 8, 16, \dots$$

فب بگو بینم ارتباط بین جملات بالا چیه؟

آقا ابازه: جملات دنباله بالا توانهای 2 هستند یعنی جمله اول میشه 2^1 جمله دوم میشه 2^2 جمله ... 2^3 سوم



استاد: احسنست معمولا به جای نوشتن همه جملات فرمولی که این جملات از روی اون ساخته شده رو می نویسیم و بخش میگیم جمله عمومی و اون رو با a_n نشون می دیم. (جدیدا مر شده جمله عمومی رو با هم t_n نشون میدن!) که البته هیچ فرقی نمی کنه

واضهه که در اینجا جمله عمومی میشه:

با داشتن جمله عمومی می توانیم تمام جملات دنباله را بنویسیم کافیه $n=1$ قرار بدم تا جمله اول برسست بیاد و $n=2$ قرار بدم تا جمله دوم و ...

$$n = 1 \Rightarrow a_1 = 2^1 = 2$$

$$n = 2 \Rightarrow a_2 = 2^2 = 4$$

$$n = 3 \Rightarrow a_3 = 2^3 = 8$$

مواستون باشه که n یعنی اندرین جملات باید هتما اعداد طبیعی باشه بنابراین a_0 و $a_{3/2}$ و ... قبل قبول نیستند.

حالا بدم تا سوال آسون با هم حل کنیم (سقتاش رو می دم فودتون حل کنین!)

مثال اول $a_n = 3n - 2$ جمله عمومی یک دنباله باشد چند جمله اول دنباله را نوشته و بگویید چه ارتباطی بین جملات وجود دارد؟

آقا ابازه : به جای n عدد 1 رو قرار می دیم تا جمله اول برسست بیاد عدد 2 رو قرار می دیم تا جمله دوم برسست بیاد...



$$n=1 \rightarrow a_1 = 3(1) - 2 = 1$$

$$n=2 \rightarrow a_2 = 3(2) - 2 = 4$$

$$n=3 \rightarrow a_3 = 3(3) - 2 = 7$$

پس دنباله مورد نظر اینطوری میشه

$$1, 4, 7, 10, \dots$$

استاد : فب فوبه حالا بگو ارتباط بین جملات چیه؟



آقا اجازه : به هر جمله ۳ تا اضافه میشه تا جمله بعدی برسست بیار

استاد : احسنست به این نوع دنباله میکن دنباله حسابی یا عددي به همین راهی!

بنابراین :

در دنباله حسابی هر جمله (به بزرگی اول یعنی a_1) از اضافه کردن یک مقدار ثابت به جمله قبلی برسست میار به این مقدار میگیریم قدر نسبت که اون رو با d نشون می دیم.

البته وقت کنید که جمله اول دنباله و قدر نسبت باید مشخص باشن تا ما بتوانیم تمام جملات دنباله رو بنویسیم.

مثال ۲: پندر جمله از دنباله های عددي با جمله اول و قدر نسبت داده شده را بنویسید.

الف) $d=3$ و $a_1 = 5$

خب این که فیلم آسونه! جمله اول میشه ۵ و به جملات بعدی سه تا سه تا اضافه میشه (قدر نسبت برابر سه هست)
یعنی:


5, 8, 11, 14, ...

ب) $d=\frac{1}{2}$ و $a_1 = 1$

این هم مثل بالایی هستش

1, $\frac{3}{2}$, 2, $\frac{5}{2}$

تذکر مفهوم: در واقع دنباله حسابی رو میتوانیم مثل یه پله در نظر بگیریم که روی هر پله یک جمله از دنباله قرار میگیره و اضد
که خاصله بین دو پله میشه همون قدر نسبت d .



مثال^۳: در دنباله عددی $\dots, 2, 7, 12, 17, \dots$ مقادیر a_3 و d و a_{100} را بایابید.

جواب: a_1 که میشه همون جمله اول یعنی **2**

d یعنی قدر نسبت هم میشه **5**

اما برای a_{100} قادرتاً انتظار نداریم که ۱۰۰ جمله دنباله رو بنویسیم! اما نگران نباشیم یه کاریش می کنیم...

باید یه تکه دیگه به جملات دنباله بالا بندازیم :

2 = جمله اول

$$7 = 2 + 5 \rightarrow \text{جمله اول} = \text{جمله چهارم} + d$$

$$12 = 2 + 10 = 2 + 2 * 5 \rightarrow \text{جمله اول} = \text{جمله سوم} + 2d$$

$$17 = 2 + 15 = 2 + 3 * 5 \rightarrow \text{جمله اول} = \text{جمله چهارم} + 3d$$

بنابراین می توانیم بگوییم که:

$$\text{جمله اول} = \text{جمله صدر} + 99d$$

با توجه به پله ها هم این موضوع واضح و واضح هست!

$$a_{100} = a_1 + 99d \rightarrow a_{100} = 2 + 99(5) = 497$$

با توجه به این مثال کلی یک دنباله مسابی رو می توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$\frac{a_1}{a_1}, \quad \frac{a_1 + d}{a_2}, \quad \frac{a_1 + 2d}{a_3}, \quad \frac{a_1 + 3d}{a_4} \dots, \frac{a_1 + (n-1)d}{a_n}$$

بنابراین جمله n ام (همون جمله عمومی) یک نباله حسابی در حالت کلی از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

خب دیگه قضیه خیلی آسون شد پس آنکه مثلاً به ما گفتن a_{150} سریع میتوانیم

$$a_{231} = a_1 + 230d \quad \text{یا} \quad a_{231} = a_1 + (230-1)d$$

به بیان خودمونی

$$\text{قدر نسبت} = (n-1) + \text{جمله اول} = \text{جمله } n \text{ ام تناعد حسابی}$$

بازم تأکید می‌کنم که:

برای نوشتن جمله عمومی نباله حسابی به جمله اول و قدر نسبت نیاز داریم.

مثال ۴: در دنباله حسابی زیر جمله عمومی و جملات هفتم و سیزدهم را بنویسید.

$$3, 7, 11, 15, \dots$$


خطب! مواد مورد نیاز برای نوشتن جمله عمومی عبارتند از:

۱) جمله اول a_1 ۲) قدر نسبت d

$$a_1 = 3, d = 4$$

بنابراین جمله عمومی میشود:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d \rightarrow a_n = 3 + (n - 1)(4) \rightarrow a_n = 4n - 1$$



آقا اجازه: پس n چند میشه؟

استاد: باز تو شوت بازی در آوردم!

توی جمله عمومی (یا همون جمله n ام) پارامتر n همینظور می‌موند اما اگر به شما شماره جمله رو دادن مثل کفتن جمله پنجم اونوقت، در جمله عمومی به جای n عدد ۵ رو قرار می‌دی.

حالا می‌ریم سراغ جملات هفتم و سیزدهم:

$$a_7 = 4(7) - 1 = 27$$

$$a_{13} = 4(13) - 1 = 51$$

البته توجه (اشتہ باشید که بروون نوشتن جمله عمومی هم می‌توانیم a_7 و a_{13} و ۶ بنویسیم):

$$a_7 = a_1 + 6d = 27$$

$$a_{13} = a_1 + 12d = 51$$

مثال ۵: اگر a_1 و d به ترتیب جمله اول و قدر نسبت یک دنباله حسابی باشند عبارت های زیر را برعهای a_1 و d بنویسید.

$$(الف) \quad a_4 + a_5$$

$$(ب) \quad 2a_5 - a_9 + a_{11}$$

$$(ج) \quad a_{10} - a_3$$

$$(د) \quad a_{25} - a_{12}$$

ذب این یه مسئله ساده پارامتری هست. برای حل این مسئله لایحه توجه (اشته باشیم) که فرمول جمله عمومی تبعاعداً

حسابی به صورت زیر است :

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

بنابراین:

$$(الف) \quad a_4 + a_5 = (a_1 + 3d) + (a_1 + 4d) = 2a_1 + 7d$$

$$(ب) \quad 2a_5 - a_9 + a_{11} = 2(a_1 + 4d) - (a_1 + 8d) + (a_1 + 10d)$$

$$= 2a_1 + 8d - a_1 - 8d + a_1 + 10d = 2a_1 + 10d$$

$$(ج) \quad a_{10} - a_3 = (a_1 + 9d) - (a_1 + 2d) = a_1 + 9d - a_1 - 2d = 7d$$

$$(د) \quad a_{25} - a_{12} = (a_1 + 24d) - (a_1 + 11d) = a_1 + 24d - a_1 - 11d = 24d - 11d = 13d$$

حالا یه بار دیگه به جواب قسمت (ج) و (د) نگاه کنید.

$$\text{ج) } a_{10} - a_3 = 7d$$

$$\rightarrow a_{25} - a_{12} = 13d$$

به نظرتون په ارتباطی اینها وجود داره؟

آقا ابازه : می تونیم اینطوری بنویسیم:



$$a_{10} - a_3 = (10 - 3)d = 7d$$

$$a_{25} - a_{12} = (25 - 12)d = 13d$$

استد : احسنست دارم بعثت امیروار می شم! البته یه بور دیکه هم میشه به مسئله نگاه کرده:

در واقع وقتی میکیم $a_{10} - a_3$ یعنی: (جمله سوم - جمله هم)

حالا اگر مثل قبل نباله مسابی رو شیوه یه پله در نظر بگیریم جمله هم روی پله هم قرار میگیره و جمله سوم روی پله سوم پس: $a_{10} - a_3$ یعنی اختلاف بین پله هم و پله سوم که میشه ۷ پله

به طور کلی می تونیم بگویم:

$$a_m - a_n = (m - n)d$$

بنابراین همیشه یادتون باش که با داشتن ۲ جمله می تونیم قدر نسبت رو در بیاریم

یه حالت خاص ولی معنی زمانی هست که دو جمله متولی رو از هم کم کنیم: مثلا

$$a_7 - a_6 = (7 - 6)d = d$$

$$a_{12} - a_{11} = (12 - 11)d = d$$

λ

همانطور که میبینید اختلاف دو جمله متولی (نباله حسابی میشه قدر نسبت اون (نباله آله به پله ها هم نگاه کنید این مطلب واضحه).

توجه: وقت داشته باشد این تمرین که با هم حل کردیم در عین سادگی فیلی موم و کاربردیه و در زمان حل تست ها زیاد به کارمون میاد بنابراین به منظور افزایش سرعت سعی کنید هنی الامکان این عبارات رو به صورت ذهنی بنویسید و اسه تمرین بیشتر پند عبارت زیر رو ذهنی حل کنید.

تمرین ۱: عبارت های زیر را بر حسب a_1 و d بنویسید. (ذهنی)

- A) $a_{10} - a_9$
- B) $a_9 - a_2$
- C) $a_7 + a_3$
- D) $a_1 + a_6 + a_9$
- E) $a_{10} - a_2 + a_5$
- F) $2a_6 - a_3$

جواب تمرین ۱:

- A) d , B) $7d$, C) $2a_1 + 8d$, D) $3a_1 + 13d$, E) $a_1 + 12d$, F) $a_1 + 8d$

تمرین ۲: اگر a_n جمله n ام یک (نباله حسابی باشد $a_{20} - a_5$ برابر است با:

- 1) $a_{25} - a_{10}$ 2) $a_{30} - a_{10}$ 3) $a_{35} - a_{10}$ 4) $a_{40} - a_{10}$

جواب تمرین ۲: گزینه یک

پندرنگته در مورد جمله عمومی تناععد عددی

همونطور که دیرینه جمله عمومی یک تناععد حسابی به صورت زیر هست:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

نکته اول اینکه: جمله عمومی نسبت به n از درجه اول هست یعنی اگر شما به جای a_1 و d عدد بزارید به یک پندر

جمله ای درجه اول نسبت به n می‌رسید مثلا:

$$a_1 = 2, d = 5 \rightarrow a_n = 2 + (n - 1)(5) = 5n - 3$$

نتیجه کلی معم اینکه عباراتی به صورت زیر نمیتوانند جمله عمومی یه نباله حسابی باشند:

$$a_n = n^2 - 2n + 1, \quad a_n = \frac{2+n}{n^2}, \quad a_n = \sin(3n - 5)$$

نکته دوم اینکه: ضریب n توی جمله عمومی میشه قدر نسبت تناععد حسابی

مثالا:

$$a_n = 3n - 7 \rightarrow d = 3$$

$$a_n = 5 - n \rightarrow d = -1$$

$$a_n = \frac{3n - 9}{2} \rightarrow a_n = \frac{3n}{2} - \frac{9}{2} \rightarrow d = \frac{3}{2}$$

نکته سوم اینکه: برای بدست آوردن جمله اول از جمله عمومی کافیه $n=1$ قرار بیم (البته این مطلب واضحه ولی...)

مثالا:

$$a_n = 7 - 2n \rightarrow n = 1 \rightarrow a_1 = 7 - 2(1) = 5$$

$$a_n = \frac{3n - 9}{2} \rightarrow n = 1 \rightarrow a_1 = \frac{3(1) - 9}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$

مثال ۱: در نباله حسابی با جمله عمومی $a_n = \frac{5+3n}{2}$ جمله هفتم په قدر، از جمله سوم بیشتر است؟

۲۴

۳۴

۶۰

(۱)

فب اول بینیم مسئله اصلاً چی میفواه.

جمله هفتم په قدر، از جمله سوم بیشتر است یعنی

از طرفی یادمون هست که $a_7 - a_3 = (7-3)d = 4d$ و داشته باشیم یعنی مسئله قدر،

نسبت رو من فواد (فب از همون اول منه په آدم میگفت d رو میفواه!) حالا میریم سراغ یافتن d

آقا اجازه: نکتش په بود؟



استاد: ضرب n میشه d

آقا اجازه: یادمون او مرد پس دریم:



$$d = \frac{3}{2} \rightarrow a_7 - a_3 = 4\left(\frac{3}{2}\right) = 6$$

استاد: حالا سر جاسه امتحان یا کنکور که من نیستم من فوای چلا، کنی؟ آله یه نکته ای یادت رفت په؟

آقا اجازه: راستش نمیدونم تا حالا بوش خکر نکردم!



استاد: بیین پسر فوب! وقتی من میگم نکته منظور این نیست که سریع بری هفتش کنی بلکه میفواه تو رو به اون قسمت از درس جلب کنم و اهمیت اون مطلب رو نشون بدم بنابراین وقتی توی یه کتاب یا بزوه نکته ای میبینی باید سعی کنی فوب بفهمیش نه اینکه فقط هفتش کنی. علاوه بر این همیشه باید این احتمال رو بدی

که سر جلسه امتحان ممکنه یه نکته ای فراموشت بشه پس باید بدل باشی که بدون اون نکته هم کارت رو راه بندازی متلا خرض کن یادت رفت که ضریب n میشه قدر، نسبت اونوقت کافیه یه بار $n=1$ قرار بدی تا a_1 در بیاد و یه بار $n=2$ قرار بدی تا a_2 در بیاد اونوقت $a_2 - a_1$ میشه قدر، نسبت. (توی کتاب "روشی عدم موفقیت در کنکور" راجع به این موضوع مفصل صحبت کرد.)

$$a_n = \frac{5 + 3n}{2} \rightarrow a_1 = \frac{5 + 3}{2} = 4$$

$$a_2 = \frac{5 + 6}{2} = \frac{11}{2} \rightarrow a_2 - a_1 = \frac{11}{2} - \frac{8}{2} = \frac{3}{2} = d$$

البته توی این مسئله می تونستید از همون اول a_7 و a_3 رو حساب کرده و از هم کم کنید.

$$\begin{aligned} n = 7 \Rightarrow a_7 &= \frac{5+3(7)}{2} = 13 & n=3 \Rightarrow a_3 &= \frac{5+3(3)}{2} = 7 \\ \Rightarrow a_7 - a_3 &= 13 - 7 = 6 \end{aligned}$$

مثال ۷: چندین جمله از دنباله حسابی **3, 7, 11, ..., 175** برابر **175** می شود؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

حل:

وقتی در صورت مسئله میگه چندین جمله یعنی n رو می خواهد پس کافیه با داشتن a_1 و d جمله عمومی رو بنویسیم

$$\rightarrow a_1 = 3 , d = 4 \rightarrow a_n = 3 + (n-1)(4) = 4n - 1$$

حالا کافیه $a_n = 175$ قرار بیم n بدست بیاد (یعنی بر عکس رفعه های قبل)

$$a_n = 175 \rightarrow 4n - 1 = 175 \rightarrow 4n = 176 \rightarrow n = \frac{176}{4} = 44$$

مثال ۱: پنجمین جمله از دنباله $5, 8, 11, \dots$ بزرگتر از 200 می شود؟

$$a_n > 200 \rightarrow n = ? \rightarrow a_1 = 5 \quad d = 3$$

$$\rightarrow a_n = 5 + (n - 1)(3) = 3n + 2 > 200$$

$$3n + 2 \rightarrow 3n > 198 \rightarrow n > \frac{198}{3} \rightarrow n > 66 \rightarrow n = 67$$

مثال ۹: در مثال قبل مقدار اولین جمله بزرگتر از 300 چقدر است؟

خب اینجا یکم وقت نیاز دارد!

اول باید بینیم که جمله بزرگتر از 300 میشه (یعنی n رو برسیت بیاریم) بعد با جایگذاری n برسیت آمد و در جمله

عمومی می تونیم بواب رو برسیت بیاریم. (وقت کنید که جمله عمومی رو از مثال قبل داریم)

$$a_n > 300 \quad 3n + 2 > 300 \quad 3n > 298 \quad n > \frac{298}{3}$$

$$n \geq 99.3 \rightarrow n = 100 \rightarrow a_{100} = 3(100) + 2 = 302$$

تمرین ۳: مقدار اولین جمله سه رقمی دنباله مسابی $3, 10, 17, \dots$ چقدر است؟

بواب تمرین ۳: ۱۰

تمرین ۴: بزرگترین جمله سه رقمی دنباله مسابی بالا کدام است؟

بواب تمرین ۴: a_{143}

مثال ۱۰: پندر عدده سه رقمی مغرب ۱۵ وجود دارند؟

۱۵, ۳۰, ۴۵ ... خوب اعداد مغرب ۱۵ چی هستند؟

یعنی یه تعداد عددی با $a_1 = 15$ و $d=15$ پس:

$$a_n = 15 + (n - 1)(15) = 15n$$

البته خیلی راحت می تونستیم این مطلب رو ذهنی بگیم پس وقت کنید وقتی کفتن مضرب **15n** یعنی **15**، کفتن مضرب **7** میشه **7n** حالا گفته اعداد سه رقمی (یعنی اعداد بین ۱۰۰ تا ۹۹۹) پس:

$$100 \leq 15n \leq 999 \Rightarrow \frac{100}{15} \leq n \leq \frac{999}{15}$$

$$6.6 \leq n \leq 66.6 \rightarrow n=7,8,..66 \rightarrow \text{میشه ۶۰ عدد}$$

آقا ابازه: 66-7 که میشه 59 تا ؟



استاد: وقت کن پسر جان فاصله، و که نفواستیم، تعداد اعداد، و فواستیم مثلًا تعداد اعداد **3,4,...7**

میشه

3,4,5,6,7 → 5

برای محاسبه یاد بگیریم **66-7+1=60** **7-3+1=5** توی این مثال هم مینویسیم

تمرین ۵: پندر عدد چهار رقمی مضرب **501 وجود دارد؟**

جواب تمرین ۵: ۱۸ عدد

تمرین ۶: پندر رصد از اعداد سه رقمی مضرب **15 هستند؟**

جواب تمرین ۶: ۶۷ رصد

مثال‌اوه اکبر به قدر نسبت یک (نباله حسابی) **2** و اhad اضافه کنیم به جمله پنجم (نباله حاصل چند و اhad اضافه می‌شود؟)

روشن اول: (روشن پارامتری) جمله عمومی (نباله هندسی) میشه $a_n = a_1 + (n - 1)d$ حالا اکه **2** و اhad به
قدر نسبت اضافه کنیم (اریم):

$$a'_n = a_1 + (n - 1)(d + 2)$$

در، حالت اول جمله پنجم میشه:

$$a_5 = a_1 + 4d$$

در، حالت دوم جمله پنجم میشه:

$$a'_5 = a_1 + 4(d + 2) = a_1 + 4d + 8$$

بنابراین:

$$a'_5 - a_5 = 8$$

روشن دوم: چون در، صورت سوال نگفته که جمله اول و قدر نسبت تھاعر حسابی چند هست فرمون براش **$a_1 = 1$** و **$d=2$** در، نظر میکیریم اونوقت (نباله ما میشه :

$$1, 3, 5, 7, 9 \rightarrow a_5 = 9$$

حالا اکه **2** و اhad به قدر نسبت اضافه کنیم (اریم

و (نباله ما میشه:

$$1, 5, 9, 13, 17 \rightarrow a'_5 = 17$$

بنابراین:

$$a'_5 - a_5 = 8$$

مثال ۱۲: در نباله حسابی $125, x, 35, y$ عدد y کدام است؟ (انسانی ۱۰)

$$۵) (۳) \quad \circ \quad -۵) (۲) \quad -۱۰) (۱)$$

یه تست باید! ، در این تست جمله اول و سوم به ما آه شده و جمله پنجم را از ما میخواه

$$a_1 = 125 \quad a_3 = 35 \quad a_4 = y = ?$$

گفتیم که با داشتن ۲ جمله می توانیم قدر نسبت را دریابیم (یادتون که نرفته!)

$$a_3 - a_1 = 2d \rightarrow 35 - 125 = 2d \Rightarrow d = -45$$

$$\rightarrow y = a_4 = a_1 + 3d = 125 + 3(-45) = -10$$

به جمله دوم یعنی x هم کاری نداریم!!

مثال ۱۳: در نباله حسابی $1, 5, 9, \dots, 209$ پنجم جمله را بجذب کنید

خط لکاخیه بینیم 209 جمله پنجم چند است؟

$$a_1 = 1 \quad d = 4 \quad \rightarrow a_n = 1 + (n-1)(4) = 209$$

$$1 + 4(n-1) = 209 \rightarrow 4(n-1) = 208$$

$$n-1 = \frac{208}{4} \rightarrow n-1 = 52 \rightarrow n = 53$$

پس در نباله آه شده ۱۳ جمله دارد. به عنوان تمرین خودتون حساب کنید که این در نباله پنجم جمله سه رقمی دارد.

مثال ۱۴: در یک نباله حسابی $a_2 + a_5 + a_8 = 12$ جمله پنجم در نباله کدام است؟

فیلی سریع عبارت $a_2 + a_5 + a_8$ را بر حسب a و d می نویسیم :

$$a_2 + a_5 + a_8 = (a+d) + (a+4d) + (a+7d) = 3a + 12d \rightarrow$$

$$3a + 12d = 12$$

مسئله از ما چی میفوار؟ جمله پنجم یعنی $a+4d$ فب کاغیه عبارت بالا را بر ۳ تقسیم کنیم

$$\frac{3a + 12}{3} = \frac{12}{3} \rightarrow a + 4d = 4 \rightarrow a_5 = 4$$

تمرین ۷: در مثال بالا $a_3 + a_7$ حاصل چقدر است؟

جواب تمرین ۷:

تمرین ۱: در یک دنباله حسابی جمله اول برابر ۱۰ و مجموع جملات پنجم و ششم برابر ۱۱ است جمله چهارم کدام است؟

۹) ۴

۱۰) ۱۳

۱۱) ۲۴

۱۲) ۱

جواب تمرین ۱: گزینه ۲

مثال ۵: در یک دنباله حسابی مجموع دو جمله اول برابر ۷.۵ و مجموع جملات سوم و چهارم برابر ۵.۵ است قدر نسبت آن چقدر است؟

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 &= 2a + d = 7.5 \\ a_3 + a_4 &= 2a + 5d = 5.5 \end{aligned} \xrightarrow{\text{و مجموع}} \left\{ \begin{array}{l} -(2a + d) = 7.5 \\ 2a + 5d = 5.5 \end{array} \right. \rightarrow 4d = -2 \rightarrow d = \frac{-1}{2}$$

توجه: توی مبحث دنباله ها به ستگاه دو معادله دو مجهول (برمیس d ، a) زیاد بر من فواید خوب یادش بگیرید.

تمرین ۹: جمله هفتم یک تصاعد حسابی برابر ۷ و مجموع جمله اول و چهارم برابر ۴ است جمله نهم کدام است؟

(۷۷) انسانی

-۱۳) ۴

-۱۲) ۱۳

-۱۱) ۲

-۱۰) ۱

جواب تمرین ۹: گزینه ۲

تمرین ۱۰: در یک تھاوند حسابی $a_1 + a_2 + a_7 + a_8 = 20$ اگر $a_4 = 3$ باشد a_5 برابر است با؟
(ریاضی ۲۷)

۱) ۳

۷) ۳

۶) ۲

۵) ۱

جواب تمرین ۱۰: کلینه ۳

سه جمله متولی یک دنباله حسابی

دنباله عددی زیر را در نظر بگیرید

$$2, 5, 8, 11, 14, \dots$$

سه جمله متولی از این دنباله را در نظر بگیرید مثلاً ۱۱، ۸، ۵ هالا بکو بینم ارتباط بین دو جمله کناری یعنی

۵, ۱۱ با جمله وسط یعنی ۸ چیه؟

آقا ابازه: جمیشون میشه دو برابر جمله وسط یعنی :



$$5+11=2\times 8$$

استاد: احسنست! این خاصیت واسه هر سه جمله متولی دنباله حسابی برقراره یعنی اگر a, b, c سه جمله متولی دنباله

حسابی باشند درین:

$$a + c = 2b \rightarrow b = \frac{a + c}{2}$$

به عبارت ساده تر می تونیم بکیم جمله وسط میانگین (واسطه عددی) دو جمله کناریه.



آقا ابازه: اگر مثل پله را در نظر بگیریم این مطلبی که کفتهن واضھه پون پله دوم وسط پله های اول و سومه.

استاد: احسنست این را خوب اومدی! البته این تضییه، و میشه واسه وقتی که سه جمله متولی نباشد تعمیم داد اما اول بزار چند مثال با هم حل کنیم.

مثال ۱: اعداد 1 , $2p+3$, $3p+4$, $5p-1$ سه جمله متولی یک دنباله عددی هستند قدر نسبت این دنباله کدام است؟

$$7 \quad 13 \quad 5 \quad 1$$

یه تست خیل آیک! (فقط یادتون باشه برای درآوردن d باید دو جمله متولی رو از هم کم کنیم).

$$(2p + 3) + (5p - 1) = 2(3p + 4) \rightarrow 7p + 2 = 6p + 8 \rightarrow p = 6$$

با معلوم شدن p می تونیم مقدار عددی سه جمله رو برسیم پیاریم

$$P=6 \rightarrow \underbrace{2P+3=15}_{a_1}, \underbrace{3P+4=22}_{a_2}$$

$$a_2 - a_1 = d \rightarrow d = 22 - 15 = 7$$

مثال ۲: اولین جمله و قدر نسبت یک تناعیر حسابی به ترتیب به صورت دو عدد متولی و جمله سوم آن برابر ۱۴ بوده
قدر نسبت تناعیر پقدار بوده است؟ (ازاد انسانی ۸۲)

$$5 \quad 13 \quad 3 \quad 1$$

یه تست جالب‌گشای خوب دقت کنید

فرض کنید اولین جمله برابر x باشه اونوقت قدر نسبت میشه $x + 1$ پس جمله دوم میشه

$$a_2 = a + d = x + x + 1 = 2x + 1$$

پس سه جمله تناعیر حسابی میشه

$$x, \quad 2x + 1, \quad 14$$

$$\rightarrow x + 14 = 2(2x + 1) \rightarrow x + 14 = 4x + 2$$

$$\rightarrow 12 = 3x \rightarrow x = 4 \rightarrow 2x + 1 = 9 \rightarrow d = 5$$

مثال ۱۸: واسطه عدی بین دو عدد $\frac{2}{1-\sqrt{3}}$ و $1+\sqrt{3}$ کدام است؟

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $\sqrt{3}$ ۳) ۰ ۴) $\frac{2}{\sqrt{3}-1}$

نرسید! واسطه عدی همون میانگینه.

$$\frac{\frac{2}{1-\sqrt{3}} + \frac{1+\sqrt{3}}{1}}{2} = \frac{\frac{2+1-3}{1-\sqrt{3}}}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

تمرین ۱۹: واسطه عدی بین $\sqrt{3} + 1$ و $\frac{2}{\sqrt{3}-1}$ پذیر است؟

۱) $\sqrt{3} + 1$ ۲) جواب تمرین ۱۹:

تمرین ۲۰: به ازای کدام مقدار a اعداد $a + 4, 4a + 1, 9a - 3$ جملات متولی یک تهاعر عدی هستند؟

۱) ۵ ۲) ۱.۵ ۳) ۱ ۴) ۰.۵

جواب تمرین ۲۰: کزینه یک

مثال ۲۱: زوایایی یک مثلث قائم الزاویه سه جمله متولی یک تهاعر عدی هستند کوچکترین زاویه مثلث کدام است؟

یه مسله ساده ولی جالب!

فرض کنید سه زاویه مثلث به صورت a, b, c باشد طبق فرض مسئله این سه زاویه سه جمله متوالی یک تناعیر حسابی هستند پس داریم :

$$a + c = 2b$$

از طرفی می دانیم جمع زوایایی یک مثلث برابر 180° است پس :

$$a + b + c = 180^\circ \rightarrow 2b + b = 180 \rightarrow b = 60^\circ$$

اما در مورد دو زاویه دیگر! در صورت مسئله کفته مثلث قائم الزاویه پس زاویه بزرگ مثلث یعنی c میشه 90° درجه

بنابراین زاویه کوچک مثلث یعنی a میشه 30° درجه ($180^\circ - 90^\circ - 60^\circ$)

$$30^\circ, \quad 60^\circ, \quad 90^\circ \quad \text{زوایای مثلث}$$

خب حالا برایم سراغ تعمیم تحقیقیه قبل (رابطه بین سه جمله متوالی) (وباره همون پله معروف رو در نظر بگیرید

واضهه که پله سوم و سط پله های اول و پنجم است بنابراین می تونیم بنویسیم :

$$a_3 = \frac{a_1 + a_5}{2} \Rightarrow a_1 + a_5 = 2a_3$$

اثبات ریاضی رابطه بالا هم نیلی ساده است :

$$a_1 + a_5 = a_1 + (a_1 + 4d) = 2a_1 + 4d = 2(a_1 + 2d) = 2a_3$$

به طور کلی بین هر سه جمله تناعیر حسابی که هم فاصله باشند، رابطه بالا برقراره مثلا:

$$a_2 \longleftrightarrow_3 a_5 \longleftrightarrow_3 a_8 \Rightarrow a_2 + a_8 = 2a_5$$

به همین صورت:

$$a_5 + a_9 = 2a_7$$

$$a_{10} + a_{16} = 2a_{13}$$

به طور کلی اگر جمله وسط، a_m بنامیم و جملات کناری، a_{m-k} و a_{m+k} اونوقت می توانیم بنویسیم:

$$a_{m-k} \xleftarrow[\text{فاصله } k]{} a_m \xrightarrow[\text{فاصله } k]{} a_{m+k} \Rightarrow a_{m-k} + a_{m+k} = 2a_m$$

مثال ۲۰: اگر در یک تماعه مسابی $a_7 = 11$, $a_3 = 7$ باشد جمله پنجم این تماعه کدام است؟

روش اول: با استفاده از نکته بالا سه جمله‌ی a_3 , a_5 , a_7 هم خاصیت هستند پس داریم:

$$a_3 + a_7 = 2a_5 \rightarrow 7 + 11 = 2a_5 \rightarrow a_5 = 9$$

روش دوم: استدلال دو معادله دو مجهول:

$$\begin{cases} a_3 = a_1 + 2d = 7 \\ a_7 = a_1 + 6d = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -1 \times (a_1 + 2d = 7) \\ a_1 + 6d = 11 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -a_1 - 2d = -7 \\ a_1 + 6d = 11 \end{cases}$$

$$\rightarrow d = 1 \rightarrow a_1 + 2(1) = 7 \rightarrow a_1 = 5$$

$$a_5 = a_1 + 4d = 5 + 4(1) = 9$$

تمرین ۱۳: در یک نباله مسابی اگر $a_5 = 5$ باشد قدر نسبت تماعه پنجم، $a_1 + a_7 + a_{13} = 39$ است؟

-4 (۴)

4 (۱۴)

$\frac{-1}{4}$ (۱۲)

$\frac{1}{4}$ (۱)

پواب تمرین ۱۳: گزینه ۳

تمرین ۴: در یک تماuder حسابی $a_1 = 1$, $a_2 = \frac{5}{3}$ حاصل عبارت $\frac{a_{15}+a_{17}+a_{19}}{a_{33}+a_{35}+a_{37}}$ کدام است؟

$$\frac{21}{17} \quad (\text{ز})$$

$$\frac{7}{17} \quad (\text{م})$$

$$\frac{105}{71} \quad (\text{ز})$$

$$\frac{35}{71} \quad (\text{ل})$$

جواب تمرین ۴: کزینه ۱

درج واسطه حسابی

یه سوال ساده: فرض کن دو تا درفت داریم که ۱۳ متر از هم خاصله دارن آن بفواهیم بین این ۳ تا درفت چیه با خاصله یکسان بگایم بین هر درفت چقدر خاصله می افته؟

آقا ابازه: اونوقت روی هم رفته ۵ تا درفت داریم که بینشون ۴ تا خاصله هست پس خاصله بین دو

$$\cdot \frac{12}{4} = 3 \quad \text{درفت میشه}$$



بین ۵ درفت ۴ خاصله هست!

استار: احسنست! به این میگیم درج (قراردادن) واسطه حسابی بین دو عدد (البته در اینجا واسطه درستی!) حالا ما همین کار رو با اعداد اندام می دیم.

مثال ۱۳: بین اعداد $\underline{21}$ و $\underline{5}$ سه واسطه عددی درج کردیم قدر، نسبت تناعیر حاصل پقدر است؟

$$\text{واسطه عددی} = \frac{\text{عدد اصلی}}{\text{فاصله}} \Leftrightarrow \text{فاصله} = \frac{\text{واسطه عددی}}{\text{عدد اصلی}}$$

طبق شکل بالا با قرار دادن سه واسطه درایم :

$$4d = 21 - 5 \Rightarrow d = \frac{21 - 5}{4} \Rightarrow d = 4$$

اینطوری هم میشه کفت که اگر d را جمله اول فرض کنیم $\underline{21}$ میشه جمله پنجم یعنی:

$$\underbrace{5}_{a_1}, \underbrace{a_2}, \underbrace{a_3}, \underbrace{a_4}, \underbrace{21}_{a_5}$$

بنا بر این :

$$a_5 - a_1 = (5 - 1)d \Rightarrow 21 - 5 = 4d \Rightarrow d = 4$$

به طور کلی اگر n واسطه حسابی بین دو عدد a, b درج کنیم a, b میشه جمله اول و b میشه جمله $n+2$ بنابراین :

$$a_{n+2} - a_1 = b - a = (n + 1)d$$

$$\Rightarrow d = \frac{b - a}{n + 1}$$

فرمول بالا را مفتخ نکنید بلکه بفهمیش!

مثال ۱۴: بین دو عدد $\underline{2}$ و $\underline{12}$ سه عدد قرار داده ایم که با این دو عدد تشکیل یک تناعیر حسابی صعودی $(d > 0)$ را

برهند جمله هفتم این تناعیر کدام است؟

$$a_1 = 2 \quad a_5 = 12 \quad \Rightarrow a_5 - a_1 = 4d = 12 - 2 = 10 \quad d = \frac{10}{4} = 2.5$$

$$a_7 = a_1 + 6d = 2 + 6(2.5) = 17$$

دیرید که هیچ نیازی هم به فرمول نیو!

مثال ۳۳: بین دو عدد $\sqrt{3} + 5$ و $\sqrt{3} - 5$ پندره ایم قرار دارد که رشته حاصل تشکیل تماعده مساوی با قدر نسبت یک به ده.

(۱) ۱)

(۲) ۱۰)

(۳) ۹)

(۴) ۸)

این تست جالیه فوب وقت کنید!

فرض کنید n عدد بین دو عدد داره شده درج کردیم بنابراین داریم:

$$\frac{\sqrt{3} - 5}{a_1}, \quad \text{عدد } n, \quad \frac{\sqrt{3} + 5}{a_{n+2}}$$

$$a_1 = \sqrt{3} - 5, \quad a_{n+2} = \sqrt{3} + 5$$

$$a_{n+2} - a_1 = (n+1)d = (\sqrt{3} + 5) - (\sqrt{3} - 5) = 10$$

$$(n+1)d = 10 \xrightarrow{d=1} (n+1) = 10 \Rightarrow n = 9$$

تمرین ۵: یازده واسطه مساوی بین دو عدد **-11, 19** درج کرده ایم قدر نسبت این تماعده کدام است؟

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۰.۵

(۴) -۳

هواب تمرین ۵: گزینه ۲

تمرین ۶: بین دو عدد ۳ و ۱۹ پندره واسطه مساوی با قدر نسبت ۴ میتوان درج کرد؟

(۱) ۷

(۲) ۵

(۳) ۴

(۴) ۳

هواب تمرین ۶: گزینه ۱

مجموع جملات یک دنباله حسابی

(نباله زیر رو در نظر بگیرید)

$$5, 8, 11, 14, 17, 20, \dots$$

فرض کنید حاصل جمع ۱ جمله اول این دنباله از ما فوایده شده باشد. یک روش برای محاسبه این حاصل جمع اینه که همینطور منه کلاس اولی ها جملات رو با هم جمع کنیم و ببینم جلو! اما ما میتوانیم در اینجا از یک روش ابتکاری استفاده کنیم پس خوب وقت کنید.

اگر جمله اول رو با آخوند جمع کنیم میشه:

$$5 + 20 = 25$$

اگر جمله دوم رو با ماقبل آخوند جمع کنیم میشه

$$8 + 17 = 25$$

به همین صورت جمله سوم با...

$$11 + 14 = 25$$

پس ۳ دسته ۲۵ تایی داریم که میشه ۷۵

$$5+8+11+14+17+20=75$$

حالا اگر تعداد جملات زیاد بود چی میشه؟

هیچ کاری نداره! کافیه جملات اول و آخوند رو باهم جمع کنیم تا حاصل یک دسته برسد یاد سپس این عدد رو در تعداد دسته ها ضرب می کنیم و این که تعداد دسته ها میشه تعداد جملات تقسیم بر دو. پس به طور کلی جمع جملات تعداد

حسابی میشه :

$$\frac{\text{تعداد جملات}}{2} \times (\text{جمله اول} + \text{جمله آخوند}) = \text{جمع جملات دنباله حسابی}$$

به بیان ریاضی مطلب بالا رو میشه به صورت زیر نوشته:

$$S_n = \frac{n}{2} [a_1 + a_n]$$

n: تعداد جملات

a_1 : جمله اول

a_n : جمله آخر

S_n : جمع جملات

مثال ۲۴: مجموع ۱۰ جمله اول از تعداد حسابی زیر را باید.

3, 7, 11, ...

برای محاسبه مجموع **n** جمله به سه پارامتر نیاز داریم جمله اول، جمله آخر و تعداد جملات

در اینجا جمله اول که مشخصه **$a_1 = 3$** تعداد جملات هم که مشخصه **$n = 10$** اما جمله آخر پندر میشه؟

خب توجه کنید که

$$a_{10} = a_1 + 9d$$

بنابراین با داشتن **a_{10}** و **d, a_1** میتوسیم:

$$d = 7 - 3 = 4 \Rightarrow a_{10} = a_1 + 9d = 3 + 9(4) = 39$$

$$S_{10} = \frac{10}{2} [3 + 39] = 5[42] = 210$$

دیرید که برای محاسبه **a_{10}** در مثال بالا یکم اذیت شدیم! به همین دلیل برای مسائلی که جمله آخر یعنی **a_n** مشخص

نیست می توانیم یه فرمول دیگه واسه **S_n** به جای **a_n** بزاریم:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

بنابراین **S_n** به صورت زیر دیدار:

$$\Rightarrow S_n = \left(\frac{n}{2}\right)[a_1 + a_1 + (n-1)d] = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$$

محاسبه مجموع n جمله اول یک دنباله حسابی با اشتباه a_1 و d

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$$

حالا مثال قبل را با این فرمول حل میکنیم:

$$n = 10 , \quad a_1 = 3 , \quad d = 4 \Rightarrow S_n = \left(\frac{10}{2}\right)[2(3) + 9(4)]$$

$$S_n = (5)[6 + 36] = 5[42] = 210$$

پند نکته در مورد محاسبه S_n

- وقت کنید برای محاسبه S_n لایحه a_1, a_n, n و داشته باشیم یا n, d, a_1 و داشته باشیم
- اما در بسیاری از مسائل به جای اینکه این پارامترها را مستقیماً بدن یکم می پیچونش! پس خوب به صورت مسائل توجه کنید.
- در گذشته اغلب مسائل مطرح شده از بخش دنباله ها در مورد محاسبه S_n هست پس باید به اندازه کافی مسئله و تست در این مورد حل کنید.
- وقت کنید که S_n حاصل جمع جملات اول تا n ام هست بنابراین اگر در مسئله ای جمع خواسته شده از جمله اول شروع نشده بود به شکل زیر عمل می کنیم
- مثلاً فرض کنید حاصل جمع جملات ششم تا هفتم یک دنباله حسابی خواسته شده بود لایحه بنویسیم:

$$S_{6-10} = a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10}$$

$$\Rightarrow S_{6-10} = S_{10} - S_5$$

به بیان ساده تر :

مجموع پنج جمله اول - مجموع جملات اول تا دهم = مجموع جملات ششم تا دهم

مثال ۳۵: در یک دنباله حسابی جمله $a_n = \frac{3}{2}n - 5$ است مجموع ۱۵ جمله اول این دنباله کدام است؟

یه سوال ساده اما چالب!

وقت کنید وقتی a_n به ما داده شده خیلی راحت میتوانیم a_1, d , و برسیت بیاریم یادتون هست که ضریب n در جمله عمومی میشه قدر نسبت پس دریم:

$$d = \frac{3}{2}$$

اگر هم این مورد یادتون نیود $a_2 - a_1 = d$ برسیت بیاید بعدش $a_2 = 2$ به همین راحتی!

حالا با داشتن a_1, n, d , می تونیم S_n , و در بیاریم.

روش دوم اینه که a_1, a_n, n حساب کنیم:

$$n = 1 \Rightarrow a_1 = \frac{3}{2}(1) - 5 = \frac{45}{2} - 5 = \frac{35}{2}$$

$$n = 15 \Rightarrow a_{15} = \frac{3}{2}(15) - 5 = \frac{45}{2} - 5 = \frac{35}{2}$$

$$S_{16} = \frac{15}{2} \left[\frac{-7}{2} + \frac{35}{2} \right] = \frac{15}{2} [14] = 105$$

مثال ۳۶: مجموع اعداد دو رقمی مضرب ۹ پقدار است؟

اعداد دو رقمی مضرب ۹ میشند:

18, 27, 36, ..., 99

در اینجا a_1, a_n و داریم ولی فود n مشخص نیست خب مسئله در اینجا مثل مثال ۷ میشه در واقع سؤال اینه که پندهین جمله از نباله بالا برابر ۹۹ میشه؟

کاغذیه با اشتن a_1, d جمله عمومی را بنویسیم:

$$\Rightarrow a_1 = 18, d = 9 \Rightarrow a_n = 18 + (n - 1)(9) = 99$$

$$\Rightarrow (n - 1)(9) = 99 - 18 \Rightarrow 9(n - 1) = 81$$

$$n - 1 = \frac{81}{9} = 9 \Rightarrow n = 10$$

$$S_{10} = \frac{10}{2}(18 + 99) = 585$$

حالا فودتون مثل بالا را برای مفارب ۳ رقمی ۹ حل کنید.

مثال ۳۷: مجموع اعداد طبیعی از ۱ تا n را بدست آورید.

یه سوال ساده اما بسیار معنی

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = ?$$

واضنه که در اینجا n عدد داریم:

$$a_1 = 1, d = 1, a_n = n \Rightarrow S_n = \frac{n}{2}[1 + n] = \frac{n(n + 1)}{2}$$

این رابطه توی ذهنتون باشه ضرر نمی کنید!

مجموع اعداد طبیعی از یک تا n

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

مثال ۲۸: مجموع اعداد طبیعی فرد از ۱ تا $2n - 1$, برداشت آورید.

$$1 + 3 + \cdots + (2n-1) = ?$$

$$a_1 = 1, d = 2, \quad a_n = 2n - 1, \quad n = n$$

$$S_n = \frac{n}{2} [1 + 2n - 1] = \frac{n}{2} [2n] = n^2$$

مثال ۲۹: مجموع اعداد طبیعی زوج از ۱ تا $2n$, برداشت آورید.

$$2 + 4 + \cdots + (2n) = ?$$

$$S_n = 2 + 4 + \cdots + (2n) = 2(1 + 2 + 3 + \cdots + n) = 2 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) = n(n+1)$$

توجه: مثالهای ۲۷ تا ۲۹ فیلی معم هستند هواستون باشه!

مثال ۳۰: در یک دنباله عددی $a_1, a_2, a_3, \dots, a_7 = 4$, $a_2 + a_8 = 0$ است؟

در اینجا $n = 8$ درجه شده اما $a_1, a_2, a_3, \dots, a_7 = 4$ نامشخص هستند اما با توجه به درجه های مسئله در این :

$$a_2 + a_8 = 0 \Rightarrow (a_1 + d) + (a_1 + 7d) = 0$$

$$a_7 = 4 \Rightarrow a_1 + 6d = 4$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a_1 + 8d = 0 \\ a_1 + 6d = 4 \end{cases}$$

باز ۴۵ دستگاه دو معادله دومجهول! این رو ریکه فورتون مل کنید بجایش میشه:

$$a_1 = -8 , \quad d = 2$$

بنابراین S_8 به صورت زیر بدست میاد:

$$S_8 = \frac{8}{2} [2(-8) + 7(2)] = 4[-16 + 4] = -8$$

توصیه هم: هر وقت به بن بست فور دید جملات دنباله رو برهسب a_1 , d , بنویسید. (تبزیه کنید)

مثال ۳۱: در یک دنباله حسابی $a_7 + a_{17} = 42$ می باشد مجموع بیست و سه جمله نفست این دنباله چقدر است؟

$$: a_{17} , \quad a_7 \quad \text{تبزیه}$$

$$a_7 + a_{17} = a_1 + 6d + a_1 + 16d = 2a_1 + 22d = 42$$

$$2a_1 + 22d = 42$$

یک معادله و دومجهول، ظاهر یک معادله کمه!

اما آن خواسته مسئله رو بنویسیم قسمیه فور به فور مل میشه:

$$S_{23} = \frac{23}{2} [2a_1 + 22d] = \frac{23}{2} [42] = 23(21) = 483$$

وقت کنید:

$$23 \times 21 = 23(20 + 1) = 460 + 23 = 483$$

تمرین ۱۷: در یک تناعیر حسابی جمله هم برابر ۵ است. مجموع ۱۹ جمله اول این تناعیر چقدر است؟

(۳) ۹۰

(۴) ۱۰۰

(۵) ۱۰۵

(۶) ۹۵

جواب تمرین ۱۷: کنینه یک

تمرین ۱۸: مجموع اعداد زوج از ۲ تا ۵۰۰ کدام است؟

(۱) ۱۲۱۰۰

(۲) ۱۲۷۵۰

(۳) ۱۲۷۰۰

(۴) ۱۲۷۵۰

جواب تمرین ۱۸: کنینه سه

تمرین ۱۹: در یک تناعیر عددی که دارای ۱۷ جمله است. جمله نهم برابر ۱ است مجموع جملات این تناعیر چقدر است؟

(۱) ۱۵۳

(۲) ۱۲۸

(۳) ۱۳۶

(۴) ۱۳۷

جواب تمرین ۱۹: کنینه یک

تمرین ۲۰: در یک دنباله حسابی مجموع ۱۲ جمله اول آن ۱۳۸ و جمله ششم آن برابر ۱۰ است جمله اول این دنباله چقدر است؟

جواب تمرین ۲۰: $a_1 = -5$

پند نکته در مورد مجموع جملات یک دنباله حسابی

s_n نسبت به n از درجه دوم است (a_n نسبت به n از درجه اول بود یادتونه ؟!)

با کمی مرتب سازی می تونیم رابطه s_n را به صورت زیر بنویسیم:

$$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d] = na_1 + \frac{n}{2}(n-1)d = na_1 + \frac{n^2}{2}d - \frac{n}{2}d$$

$$= \frac{d}{2}n^2 + \left(a - \frac{d}{2}\right)n \Rightarrow S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a - \frac{d}{2}\right)n$$

بنابراین ضریب n^2 میشه $\frac{d}{2}$ و ضریب n میشه $a - \frac{d}{2}$

در رابطه a_n ضریب n برابر d است

در رابطه S_n ضریب n^2 برابر $\frac{d}{2}$ است

مثال ۲: مجموع n جمله اول یک دنباله عددی برابر $S_n = \frac{n^2}{3}$ است جمله یازدهم این تناععد کدام است؟ (ریاضی ۱۱)

۹) (۳)

۱۰) (۳)

۷) (۲)

۱) (۱)

روش اول: با توجه به این کته ای که فتیم ضریب n^2 میشه :

$$\frac{d}{2} = \frac{1}{3} \Rightarrow d = \frac{2}{3}$$

از طرفی اگر در فرمول S_n قرار بدم $n=1$ در واقع a_1 رو برسیم (حاصل جمع یک جمله اول میشه a_1)
(یکه!!!)

$$S_1 = a_1 = \frac{1^2}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow a_1 = \frac{1}{3}$$

حالا با داشتن a_1 و d می تونیم هر جمله ای رو برسیم یاریم:

$$a_{11} = a_1 + 10d = \frac{1}{3} + 10\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{21}{3} = 7$$

روش دوم: فرض کنیم که نکته بالا رو بله نباشیم

$$s_1 = \frac{1^2}{3} = a_1 \quad \text{اول قرار میدیم: } n = 1$$

$$s_2 = \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3} = a_1 + a_2 \quad \text{بعدش قرار میدیم: } n = 2$$

بنابراین داریم:

$$a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_2 = s_2 - s_1 = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1$$

$$\Rightarrow d = a_2 - a_1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

حالا با داشتن a_1 و d می توانیم a_{11} و مثل روش اول برست بیاریم.

روش سوم: اگر $n = 10$ قرار بدم S_{10} (مجموع ده جمله اول) بدست میاد.

$$S_{10} = \frac{10^2}{3} = \frac{100}{3}$$

اگر $n = 11$ قرار بدم S_{11} بدست میاد.

$$S_{11} = \frac{11^2}{3} = \frac{121}{3}$$

حالا قبول داریم که $S_{11} - S_{10} = a_{11}$

(اصلا رونمایی قبول نداشته باشید؟!!)

بنابراین فیلی راهت مینویسیم:

$$S_{11} - S_{10} = \frac{121}{3} - \frac{100}{3} = \frac{21}{3} = 7$$



آقا ابازه: روش سوم از همه آسونتر بور نمیشه فقط همون رو یاد بگیریم؟

استاد: بیین عزیز دل ببرادر! درسته که توی این مسئله روش سوم از همه ساده تر بود ولی ممکنه توی امتحان یا لکلور صورت مسئله رو طوری تغییر بدن که دیگه این روش پندران کارکشا نباشه بنابراین شما باید روش‌های دیگه رو هم خوب یاد بگیری. علاوه بر این، حل یک مسئله از پندر روش باعث میشه که شما از زوایای مختلفی به مسئله نگاه کنی و خود این باعث افزایش عمق یادگیری شما میشه.

مثال ۳۳: در یک دنباله عددی جمله پنجم برابر $\frac{1}{2}$ است و هر جمله از جمله ما قبل خود به اندازه $\frac{1}{2}$ کمتر است
مجموع n جمله اول آن چقدر است؟

هر جمله از جمله ما قبل خود به اندازه $\frac{1}{2}$ کمتر است یعنی چه؟

یعنی قدر نسبت برابر $\frac{-1}{2}$ است!

میکن نه یه مثال عددی من زنیم!

5. 1 1.5 2

حالا در مسئله گفته $a_5 = 3$ بنابراین (دریم):

$$a_5 = a_1 + 4d = 3 \Rightarrow a_1 + 4\left(\frac{-1}{2}\right) = 3 \Rightarrow a_1 = 5$$

$$S_{10} = \frac{10}{2} \left[2(5) + 9\left(\frac{-1}{2}\right) \right] \Rightarrow$$

$$S_{10} = 5\left(\frac{11}{2}\right) = \frac{55}{2} = 27.5$$

مثال ۳۴: مجموع پندر جمله از دنباله حسابی $\dots, 2, 5a-2, a, 2, 5$ برابر ۵۵ است؟

(۱۳)

(۱۲)

(۱۱)

(۱۰)

به تست ترکیبی فبلی زیبا!

توی صورت تست کفته پندر جمله یعنی n مجهوله از طرفی جواب S_n را برابر ۵۵ داده همچنین جمله اول و قدر نسبت هم مجهوله!

از طرفی کفته دنباله به صورت $\dots, 2, 5a-2, a, 2, 5$ هست یعنی سه جمله اول دنباله حسابی رو داده پس طبق فاصیت سه جمله متوالی دنباله حسابی داریم:

$$a + 5a - 2 = 2(2) = 4 \Rightarrow 6a - 2 = 4 \Rightarrow a_1 = a = 1$$

$$a_2 = 2 \Rightarrow a_2 - a_1 = d = 1$$

$$S_n = \frac{n}{2} [2(1) + (n-1)(1)] = 55 \Rightarrow \frac{n}{2} [n+1] = 55$$

$$n(n+1) = 2 \times 55 = 110 \Rightarrow n(n+1) = 110 = 10 \times 11 \Rightarrow n = 10$$

مثال ۳۵: آنکه مجموع هشت جمله از دنباله حسابی $a_2 = p-1$ و $a_1 = 1+2p$ باشد قدر نسبت دنباله پقدار است؟

به سوال جالب!

مثال ۳۶: داده شده از طرفی d مجهوله a_1, a_2 هم مستقیماً داده نشده ولی با داشتن $n = 8$ میتوانیم a ,

بر حسب p بدست آوریم:

$$a_2 - a_1 = d \Rightarrow (p-1) - (1+2p) = -p-2 = d$$

$$\begin{aligned} S_n = \frac{8}{2}[2a_1 + 7d] = 60 &\Rightarrow 4[2(1 + 2p) + 7(-p - 2)] = 60 \Rightarrow \\ &\Rightarrow [2(1 + 2p) + 7(-p - 2)] = 15 \Rightarrow 2 + 4p - 7p - 14 = 15 \\ &\Rightarrow -3p = 27 \Rightarrow p = \frac{27}{-3} = -9 \Rightarrow d = -p - 2 = 9 - 2 = 7 \end{aligned}$$

مثال ۳۶: مجموع تمام اعداد طبیعی بخش پذیر بر ۶ بین دو عدد ۱۰۰ و ۲۰۰ کدام است؟

وقت کنید اعداد بخش پذیر بر ۶ همون مغارب ۶ میشند یعنی **6n** حالا مسئله را از دو روش برآتون حل میکنیم.

روش اول: روش سنتی! مثل مثال ۲۶ عمل کرده و مغارب ۶ بین ۱۰۰ و ۲۰۰ را مینویسیم:

102 , 108 , ... , 198

آقا اجازه: از کجا سریع فهمیدیں که اولین و آخرین عدد میشه ۱۰۲ و ۱۹۸؟



استاد: خوب باید زرنگ باشی! بین ۹۰ بر ۶ بخش پذیره پس از ۹۰ شروع کن بنویس (من ذهنی انجام دادم)

90, 96 , 102 , 192 , 198 , 204

پس اولین عدد ۱۰۲ و آخرین عدد ۱۹۸ است خوب عدد اول و آخر مشخصه فقط می مونه تعداد جملات بازم مثلا مثال

۲۶ عمل میکنیم:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d \Rightarrow 198 = 102 + (n - 1)(6) \Rightarrow 96 = 6(n - 1)$$

$$n = 17 \Rightarrow S_{17} = \frac{17}{2}[102 + 198] = \frac{17}{2}[300] = 17[150] = 2550$$

روش دوم: روش بالکلاس! اعداد بخش پذیر بر ۶ را به صورت **6n** فرض می کنیم:

$$100 \leq 6n \leq 200 \Rightarrow \frac{100}{6} < n < \frac{200}{6}$$

$$16.66 < n < 33.33 \Rightarrow n = 17, \dots, 33$$

اگر $n = 17$ قرار بایم اولین جمله و آخر $n = 33$ قرار بایم آخرين جمله (نباله برسست میاد).

$$n = 17 \Rightarrow 6n = 6(17) = 102$$

$$n = 33 \Rightarrow 6n = 6(33) = 198$$

تعداد جملات هم میشه:

$$n = 33 - 17 + 1 = 17$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{17}{2} [102 + 198] = 17[150] = 2550$$

این روش رو فوب یاد بگیرید به کارتون میاد!

مثال ۳۷: در یک تھاعر عددی با جمله اول a اگر یک واحد به قدر نسبت افزوده شود آنگاه به مجموع ۲۰ جمله اول

آن چه قدر افزوده خواهد شد؟

۱۹۰ (۴)

۱۸۰ (۳)

۱۷۰ (۲)

۱۶۰ (۱)

روش اول: روش پارامتری جمع ۲۰ جمله اول میشه:

$$S_{20} = 10[2a + 19d]$$

حالا خرض می کنیم یک واحد به قدر نسبت اضافه شده:

$$d' = d + 1$$

$$S'_{20} = 10[2a + 19d'] = 10[2a + 19d + 19]$$

$$S'_{20} - S_{20} = 10[(2a + 19d + 19) - (2a + 19d)] = 10(19) = 190$$

روش دوم: هلا فرض کنید $a = 1, d = 2$ باشد (لمون خواست اینطوری فرض کنیم!)

اونوقت درین:

$$S_{20} = 10[2 + 19(2)] = 10(40) = 400$$

در هالت دو میشه $a = 1, d' = 3$

$$S'_{20} = 10[2 + 19(3)] = 10[59] = 590$$

$$\Rightarrow S'_{20} - S_{20} = 590 - 400 = 190$$

تمرین ۲۱: مجموع چندجمله از تماuder حسابی ۷ و ۵ و ۳ برابر ۲۸۱ می شود؟

(۱) ۱۸

(۲) ۱۷

(۳) ۱۶

(۴) ۱۵

جواب تمرین ۲۱: گزینه دو

تمرین ۲۲: مجموع n جمله یک تماuder حسابی از رابطه $S_n = n^2 + 2n$ برست می آید مجموع جملات هفتم و هشتم و نهم چقدر است؟

(۱) ۷۶

(۲) ۵۱

(۳) ۵۷

(۴) ۷۴

جواب تمرین ۲۲: گزینه دو

تمرین ۲۳: در یک تماuder حسابی مجموع n جمله اول $(1 + 2n)$ آن کدام است؟

(۱) $4n - 3$ (۲) $4n - 1$ (۳) $2n + 3$ (۴) $2n + 1$

جواب تمرین ۲۳: گزینه سه

تمرین ۳۴: بین ۱ و ۸ په تعداد جمله درج شود تا مجموع جمله های تناعمر حسابی حاصل برابر ۲۴۶ کنند؟

۶) ۴

۵) ۳

۴) ۲

۳) ۱

هواب تمرین ۳۴: گزینه دو

دنباله هندسی

خوب! به امید خدا ببریم سراغ میبست بعدی یعنی دنباله هندسی. انشالا که دنباله حسابی رو خوب یاد گرفته باشید و بعشن مسلط شده باشید



آقا اجازه : ما فول شدیم!!!

استاد: شدن خیلی خوبه مواظب باش fool نشی!!!!

بلزیریم....

نهتما یادتون هست که در دنباله حسابی به جمله اول (همون پله اول) عدد ثابتی به نام قدر، نسب (d) اختلاف میشود تا جمله بعدی بدست بیار مثل:

۳ و ۱۸ و ۳۳ و ۱۸ و ۳....

و جمله عمومی دنباله حسابی میشود:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

اما در دنباله هندسی به جای اینکه به هر جمله یک عدد ثابت اختلاف کنیم هر جمله رو در یک عدد ثابت (همون قدر، نسبت) ضرب می‌کنیم تا جمله بعدی بدست بیار مثل:

۲ و ۵۰ و ۱۰ و ۲...

همینطور که می‌بینید جمله اول در اینها برابر ۲ و قدر نسبت که اون رو با q نشون می‌یعنی برابر ۵ است اگر دقت کنید در دنباله بالا داریم:

$$a_1 = 2, \quad a_2 = a_1 q = 2(5), \quad a_3 = a_1 q^2 = 2(5^2) \dots$$

بنابراین جمله هم میشه: $a_{10} = a_1 q^9$

و به همین صورت جمله پانزدهم میشود:

بنابراین می توانیم جمله عمومی (یا جمله n ام) یک دنباله هندسی را به صورت زیر بنویسیم:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

مثال ۱۳۸: با توجه به جمله عمومی داده شده مقادیر a_1 , q , $\frac{a_5}{a_3}$ را محاسبه کنید.

$$a_n = 5(2^{n-1}) \quad (\text{الف})$$

حل:

با مقایسه با فرمول جمله عمومی تعداد هندسی یعنی $a_1 q^{n-1}$ میشود $q = 2$ و $a_1 = 5$

اما، روش مطمئن تر اینه که برای $n = 1$ قرار برد تا a_1 بدرست بیارد و برای $n = 2$ قرار برد تا a_2 بدرست بیارد و از تقسیم دو ابتدی q را بدرست بیارید.

$$n = 1 \Rightarrow a_1 = 5(2^0) = 5(1) = 5$$

$$n = 2 \Rightarrow a_2 = 5(2^1) = 10 \Rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{aq}{q} = \frac{10}{5} = 2$$

برای محاسبه $\frac{a_5}{a_3}$ می نویسیم:

$$\frac{a_5}{a_3} = \frac{a_1 q^4}{a_1 q^2} = q^2 = 4$$

دقت کنید که تعریف دنباله هندسی قدر نسبت دو جمله متولی بدرست میگوید اما در دنباله هندسی قدر نسبت از تقسیم دو جمله متولی بدرست میگیرد به بیان ریاضی:

،، تفاضل حسابی

$$a_{n+1} - a_n = d$$

،، تفاضل هندسی

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$$

همچنین ،، تفاضل حسابی (اشتیم (حالت کلی بالا)

$$a_m - a_n = (m - n)d$$

مثال:

$$a_5 - a_2 = (5 - 2)d = 3d$$

این رابطه ،، دنباله هندسی به صورت زیر در میاد:

$$\frac{a_m}{a_n} = q^{m-n}$$

مثال:

$$\frac{a_5}{a_3} = q^{5-3} = q^2$$

حالا باید سراغ ادامه مثال ۳۸

ب) $a_n = 5(3^{n+1})$

حل:



آقا ابازه: این هم خیلی آسونه a_1 میشه ۵ و q هم میشه ۳.

استاد: دقیقا غلطه !!

حالا من از روش استاندارد میرم خوب نگاه کن:

$$n = 1 \Rightarrow a_1 = 5(3^2) = 5 \times 9$$

$$n = 2 \Rightarrow a_2 = 5(3^3) = 5 \times 27$$

$$\Rightarrow q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{5 \times 27}{5 \times 9} = 3$$

$$\frac{a_5}{a_3} = q^{5-3} = q^2 = 3^2 = 9$$

(وقت کنید که ظاهر جمله عمومی دنباله هندسی خیلی ساده است اما برفی اوقات اونقدر میپیوونش که دیگه با به نگاه نمیشه a و q را تشخیص داد پس بعتره از همون روش استاندارد استفاده کنید)

$$\text{ج) } a_n = \frac{4}{3^{2-3n}}$$

حل:

$$n = 1 \Rightarrow a_1 = \frac{4}{3^{2-3}} = \frac{4}{3^{-1}} = 4 \times 3 = 12$$

$$n = 2 \Rightarrow a_2 = \frac{4}{3^{2-6}} = \frac{4}{3^{-4}} = 4 \times 3^4$$

$$\Rightarrow q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{4 \times 3^4}{4 \times 3} = 3^3 = 27$$

$$\frac{a_5}{a_3} = q^{5-3} = q^2 = 27^2$$

مثال ۳۹: در یک نباله هندسی جمله اول نباله کدام است؟ (آزمودن)

$$2\sqrt{2} \quad (\varepsilon) \quad \varepsilon \quad (۱۲) \quad ۲ \quad \sqrt{2} \quad (۱)$$

حل: یادتون هست که توی نباله هسابی توی آندر مسائل نیاز بود که جملات رو تجزیه کنیم مثلًا اگر a_6 داره بود سریع $a_6 = a_1 q^5$ در نباله هندسی هم حقیقا همین کار رو انجام می دیم مثلًا $a_6 = a_1 + 5d$ می نوشتیم بنابراین:

$$a_2 a_4 = 2a_5 \Rightarrow aq \cdot aq^3 = 2aq^4 \Rightarrow a^2 q^4 = 2aq^4 \Rightarrow a^2 = 2a \Rightarrow a = 2$$

پس تجزیه یادتون نره دیگه تکرار نمی کنم ها !!

مثال ۴: در یک نباله هندسی با قدر نسبت ۲ حاصل _____ مقدار است؟

$$\frac{a_1 a_7}{a_2^2} = \frac{a_1 \cdot a_1 q^6}{(a_1 q)^2} = \frac{a_1^2 q^6}{a_1^2 q^2} = q^4 = 2^4 = 16$$

یه سوال ساده از ریاضیات پایه !

مثال ۵: جمله های اول و سوم یک نباله هندسی به ترتیب $\sqrt{2} + 1$ و $\sqrt{2} - 1$ می باشند قدر نسبت این نباله برابر است با :

$$a_4 \quad (\varepsilon) \quad a_3 \quad (\varepsilon) \quad a_2 \quad (۱۲) \quad a_1 \quad (۱)$$

حل:

پون دو جمله از تماعده هندسی یعنی a_3 و a_1 رو دریم با یه تقسیم ساده می تونیم قدر نسبت q رو پیدا کنیم:

$$\frac{a_3}{a_1} = \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} = q^{3-1} = q^2 \Rightarrow \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} \times \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} + 1} = \frac{(\sqrt{2} + 1)^2}{2 - 1}$$

$$\Rightarrow q^2 = (\sqrt{2} + 1)^2 \Rightarrow q = \sqrt{2} + 1 = a_3$$

گویا کردن مخرج کسر که یادتون نرفته !!

تمرین ۵: جمله نهم یک دنباله هندسی پنج برابر جمله ششم است نسبت جمله یازدهم به جمله پنجم برابر است با:

(۱) ۱۲۵ (۲) ۲۵ (۳) ۱۵ (۴) ۵۰

جواب تمرین ۵: گزینه دو

تمرین ۶: در یک تماuder هندسی با جمله عمومی $\frac{2}{3^n}$ جمله چهارم چند برابر جمله ششم است؟

(۱) ۲۱ (۲) ۳ (۳) ۱۵ (۴) ۹

جواب تمرین ۶: گزینه ۴

تمرین ۷: در یک تماuder هندسی جمله سوم مساوی است با جمله دوم بعلاوه دو برابر جمله اول کدام دو عدد می

توانند قدر نسبت این تماuder باشند؟

(۱) ۱ و -۲ (۲) ۱ و ۲ (۳) ۲ و -۱ (۴) -۲ و -۱

جواب تمرین ۷: گزینه دو

مثال ۲: در یک دنباله هندسی $a_1 \cdot a_5$ کدام است؟

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۱

(۴) ۵

حل: فیلی سریع میریم سراغ تبزیه جملات:

$$a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 = a_1 q \cdot a_1 q^2 \cdot a_1 q^3 = a_1^3 q^3 = 8 \Rightarrow a_1 q^2 = 2$$

حالا مسئله از ما چی میخواهد؟

$$a_1 a_5 = a_1 \cdot a_1 q^4 = a_1^2 q^4 = (a_1 q^2)^2 = (2)^2 = 4$$

سه جمله متولی یک تضاعف هندسی

اگه یادتون باشه (که مطمئناً یادتون نیست!) توی دنباله حسابی برای سه جمله متولی (یا متساوی الفاصله)، ابطه زیر برقرار بود:

$$a, b, c \Rightarrow a + c = 2b \Rightarrow b = \frac{a + c}{2}$$

که به b می‌گوییم واسطه حسابی (عددی) یا همون میانگین a, c به همین صورت برای سه جمله متولی تضاعف هندسی (اریم):

$$a, b, c \Rightarrow ac = b^2 \Rightarrow b = \sqrt{ac}$$

در اینجا به b می‌گوییم واسطه هندسی یا میانگین هندسی a, c

مثال:

$$2, 6, 18 \Rightarrow (2)(18) = (6)^2 \Rightarrow 6 = \sqrt{(18)(2)}$$

آقا ابازه: میشه این خاصیت رو اثبات کرده؟



استاد: چرا نمیشه، اتفاقاً اثباتش هم خیلی سادست فرض کن a, b, c جملات اول، دوم و سوم

یه تفاضل هندسی باشد در این صورت می تونیم بنویسیم:

$$a = a_1 \quad b = a_1 q \quad c = a_1 q^2$$

$$\Rightarrow a \cdot c = a_1 \cdot a_1 q^2 = (a_1 q)^2 = b^2 \Rightarrow b = \sqrt{a \cdot c}$$

مثال ۳: واسطه هندسی دو عدد کدام عدد است؟

$$\frac{3}{4} \quad (\varepsilon) \qquad \frac{\sqrt{3}}{4} \quad (\mu) \qquad \frac{3}{2} \quad (\nu) \qquad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\eta)$$

واسطه هندسی دو عدد a, c میشه بنابراین:

$$a \cdot c = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3}{4} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{ac} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

تست از این کلاسی تر دیده بودید!

مثال ۴: به ازای کدام مقدار x دنباله $x - 4, x - 2, x + 4$ هندسی است؟

$$(\varepsilon)$$

$$(\mu)$$

$$(\nu)$$

$$(\eta)$$

$$(x - 4) \cdot (x + 4) = (x - 2)^2 \quad \Rightarrow \quad x^2 - 16 = x^2 - 4x + 4 \quad \Rightarrow \quad 4x = 20 \\ \Rightarrow \quad x = 5$$

مثال ۵: واسطه هندسی بین دو عدد $\sqrt{240}$ و $\sqrt{15}$ کدام است؟

$$2\sqrt{15} \quad (\varepsilon)$$

$$3\sqrt{15} \quad (\mu)$$

$$2\sqrt{13} \quad (\nu)$$

$$3\sqrt{13} \quad (\eta)$$

تست جالبیه فوب وقت کنیدا

$$b = \sqrt{ac} \Rightarrow a \cdot c = \sqrt{240} \cdot \sqrt{15} = \sqrt{(240)(15)}$$

اول باید اعداد زیر را دریکال و به صورت محاصل ضرب عوامل اول بنویسیم:

$$240 = (2)^4(3)(5) , \quad 15 = (3)(5)$$

$$a \cdot c = \sqrt{(240)(15)} = \sqrt{(2)^4(3)^2(5)^2} = (2)^2(3)(5)$$

تاژه باید یه رادیکال دیکه بگیریم:

$$b = \sqrt{ac} = \sqrt{(2)^2(3)(5)} = 2\sqrt{15}$$

مثال ۴: اگر x_1 و x_2 ریشه های معادله $x^2 + 3x + (\sqrt{7} - \sqrt{2}) = 0$ باشند به ازای چه مقدار m عدد ۵ واسطه هندسی x_1 و x_2 است؟ (به تست فیلی موم)

$$5(\sqrt{7} + \sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{2}) = 5(\sqrt{7}^2 - \sqrt{2}^2) = 5(7 - 2) = 25$$

مل:

اگر ۵ واسطه هندسی بین x_1 و x_2 باشد دریم:

$$x_1 \cdot x_2 = 5^2 = 25$$

از بحث معادلات درجه دوم تما هاظرتون هست که محاصل ضرب دو ریشه معادله برابر است پس:

$$\begin{aligned} x_1 \cdot x_2 &= \frac{c}{a} = \frac{(\sqrt{7} - \sqrt{2})m}{1} = 25 \Rightarrow m = \frac{25}{(\sqrt{7} - \sqrt{2})} \\ &= \frac{25}{(\sqrt{7} - \sqrt{2})} \cdot \frac{(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{(\sqrt{7} + \sqrt{2})} = \frac{25(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{7 - 2} = 5(\sqrt{7} + \sqrt{2}) \end{aligned}$$

توبه: وقت کنید که فاصله بین هر سه جمله غیر متوالی نباله هندسی هم برقرار است (مشابه نباله حسابی) البته به شرطی که a, b, c باشد مثلا:

$$a_3, a_6, a_9 \Rightarrow a_3 \cdot a_9 = (a_6)^2$$

مثال ۷: در یک تماunder هندسی حاصلضرب جمله چهارم و هشتم برابر ۸ است جمله ششم این تماunder کدام است؟

۳ $\sqrt{2}$ (۱) ۲ $\sqrt{2}$ (۲) ۷ (۳) $\sqrt{2}$ (۴)

روش اول: رابطه بین جملات چهارم و ششم و هشتم پیدا!

$$a_4, a_6, a_8 \Rightarrow a_4 \cdot a_8 = (a_6)^2 \Rightarrow 8 = (a_6)^2 \Rightarrow a_6 = 2\sqrt{2}$$

روش دوم: می توانیم از همون روش سنتی هم استفاده کنیم:

$$a_4 a_8 = a_1 \cdot q^3 a_1 q^7 = a_1^2 q^{10} = (a_1 q^5)^2 = 8 \Rightarrow a_6 = 2\sqrt{2}$$

تمرین ۸: واسطه هندسی بین دو عدد (۲)(۵)^۳(۱۱)^۲ و (۲)^۳(۵)(۷)^۲ کدام است؟

۸۷۰۰ (۱) ۱۵۰۰ (۲) ۷۸۰۰ (۳) ۷۷۰۰ (۴)

جواب تمرین ۸: کنینه یک

تمرین ۹: آنکه معادله $x^2 - (\mathbf{b} - \mathbf{a})(\mathbf{b} + \mathbf{c})x + (\mathbf{a} + \mathbf{b})(\mathbf{c} - \mathbf{b}) = \mathbf{0}$ حاصلضرب ریشه های

معادله مسادی با مجموع ریشه های آن باشد آنگاه

b واسطه عدی بین a و c است.

b واسطه عدی بین a و C است.

(۳) واسطه هندسی بین a و b است.

(۴) b واسطه هندسی بین a و c است.

جواب تمرین ۳۹: گزینه ۴

تمرین ۳۹: خرض کنید سه عدد مثبت $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ به ترتیب سه جمله متوالی یک تھاعد هندسی باشند در مورد $\log a, \log b, \log c$ په میتوان گفت؟

(۱) سه جمله متوالی یک تھاعد حسابی است

(۲) سه جمله متوالی یک تھاعد هندسی است.

(۳) $\log b, \log c$ واسطه حسابی بین $\log a$ است.

(۴) $\log b, \log c$ واسطه هندسی بین $\log a$ است.

جواب تمرین ۳۹: گزینه یک

تمرین ۳۹: پنج عدد $\frac{5}{12}, c, b, a, \frac{5}{3}$ به ترتیب جمله های متوالی یک تھاعد هندسی هستند b کدام است؟

$$\frac{4}{5} \quad (۴)$$

$$\frac{3}{4} \quad (۳)$$

$$\frac{5}{6} \quad (۲)$$

$$\frac{2}{3} \quad (۱)$$

جواب تمرین ۳۹: گزینه دو

درج واسطه هندسی

اگه یادتون باشه وقتی می خواستیم n عدد بین دو جمله a, b قرار بدم به صورتی که همه بملات تشکیل یک تھاعد حسابی بدن قدر، نسبت نباله از ابطه زیر برسست میومد:

$$b - a = (n + 1)d \Rightarrow d = \frac{b - a}{n + 1}$$

به همین صورت اگر بین دو جمله a, b بفواهیم n عدد قرار بدم به صورتی که همه اعداد با هم تشکیل یک تضاعف هندسی را بدنهندر قدر نسبت دنباله از رابطه زیر برسی می‌دارد:

$$\frac{b}{a} = q^{n+1}$$

مثال ۸: بین دو عدد ۳۶ و ۲۴ دو واسطه هندسی درج کرده ایم نسبت دو واسطه هندسی چقدر است؟

هل: نیازی به فرمول نیست! فقط یکم وقت لازمه!

$$3, a_2, a_3, 24 \Rightarrow \frac{24}{3} = \frac{a_4}{a_1} = q^3 = 8 \Rightarrow q = 2 \Rightarrow \frac{a_3}{a_2} = q = 2$$

مثال ۹: بین اعداد ۸ و $\frac{81}{2}$ سه واسطه هندسی درج کرده ایم قدر نسبت این دنباله چقدر است؟

$$8, a_2, a_3, a_4, \frac{81}{2} \Rightarrow \frac{\frac{81}{2}}{8} = \frac{a_5}{a_1} = q^4 = \frac{81}{16} = \frac{3^4}{2^4} \Rightarrow q = \pm \frac{3}{2}$$

اگر قدر نسبت ثابت باشه دنباله هندسی ما صعوری میشه:

$$8, 12, 18, 27, \frac{81}{2}$$

اما اگر قدر نسبت منفی باشه دنباله نوسانی میشه (نه صعوری و نه نزولی)

$$8, -12, 18, -27, \frac{81}{2}$$

به مثال بعدی فوب توجه کنید!

مثال ۵۰: بین دو عدد ۳ و ۱۹۲ پنج واسطه هندسی درج کرده ایم مجموع این واسطه ها برابر است با:

$$-M(4)$$

$$-VV(3)$$

$$-66(2)$$

$$-55(1)$$

حل:

اگر ۳ را جمله اول دنباله در نظر بگیریم ۱۹۲ جمله هفتم دنباله می شود (پرا) بنابراین می توانیم بنویسیم:

$$\frac{a_7}{a_1} = q^6 = \frac{192}{3} \Rightarrow q^6 = 64 = 2^6 \Rightarrow q = \pm 2$$

اگر قدر نسبت مثبت باشد دنباله هندسی به صورت زیر در میاد:

$$3, 6, 12, 24, 48, 96, 192$$

که در این حالت مجموع پنج جمله واسطه برابر ۱۸۶ می شود که با توجه به گزینه ها این حالت مر نظر نیست!

اگر قدر نسبت منفی باشد دنباله به صورت زیر میشود:

$$3, -6, 12, -24, 48, -96, 192$$

و در این حالت مجموع پنج جمله واسطه میشه -66

مجموع جملات یک دنباله هندسی

مشابه دنباله حسابی، ابتداء حاصل جمع جملات یک دنباله هندسی فیلی راهت برسست میاد.

$$S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \dots + a_1q^{n-1} = a_1(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1})$$

از طرفی از ریاضیات پایه میدونیم:

$$x^n - 1 = (x - 1)(1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1})$$

بنابراین می توانیم بنویسیم:

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} = \frac{x^n - 1}{x - 1}$$

خط برعیم سراغ ادامه اثبات:

$$S_n = a_1(1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1}) = a_1 \left(\frac{q^n - 1}{q - 1} \right)$$

بنابراین رابطه مجموع n جمله اول یک دنباله هندسی به صورت زیر هست:

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

وقت کنید که توی دنباله حسابی برای محاسبه نیاز به جمله اول, قدر نسبت و تعداد جملات بود در اینجا هم (قیقاً) همینطوره!

مثال ۱۵: در دنباله هندسی مثبت $5, b, 45$ مجموع چهار جمله اول چقدر می شود؟

حل: در اینجا جمله اول و سوم دنباله هندسی (اده شده بنابراین با اشتن) و جمله می توانیم قدر نسبت را هم در بین اینها پس قضیه ملء!

$$\frac{a_3}{a_1} = q^2 = \frac{45}{5} = 9 \quad \Rightarrow \quad q = 3 \quad \Rightarrow \quad S_4 = \frac{5(3^4 - 1)}{3 - 1} = 200$$

مثال ۱۶: در یک دنباله هندسی با قدر نسبت $\sqrt{2}$ مجموع هشت جمله اول چند برابر مجموع چهار جمله اول است؟

(۱) ۱۷

(۲) ۳۴

(۳) ۵

(۴) ۱۵

حل: در اینجا جمله اول (اده شده اما نگران نباشد) چون توی مسئله نسبت را می‌فواز:

$$S_8 = \frac{a(q^8 - 1)}{q - 1} \quad S_4 = \frac{a(q^4 - 1)}{q - 1} \Rightarrow$$

$$\frac{S_8}{S_4} = \frac{(q^8 - 1)}{(q^4 - 1)} = \frac{(q^4 - 1)(q^4 + 1)}{(q^4 - 1)} = (q^4 + 1)$$

$$\Rightarrow \frac{S_8}{S_4} = q^4 + 1 = (\sqrt{2})^4 - 1 = 4 - 1 = 3$$

نکته: نسبت S ها زیاد تر تر است ها دیره میشند به خصوص نسبت $\frac{S_6}{S_3}$ یا $\frac{S_{10}}{S_5}$ مثلاً $\frac{S_{2n}}{S_n}$ بنابراین خوب
یادتون باشید که:

$$\frac{S_{2n}}{S_n} = q^n + 1$$

مثال ۵۳: حاصل مجموع $x = \sqrt{2}$ به ازای $1 + x + x^2 + \dots + x^{12}$ است؟

$$127 + 63\sqrt{2} \quad 128 + 63\sqrt{2} \quad 127 + 64\sqrt{2} \quad 128 + 64\sqrt{2}$$

حل: این ترست جالبیه خوب گوش کنید!

در اینجا یه تماضر هندسی داریم با جمله اول برابر ۱ و قدر نسبت x تعداد جملات هم ۱۳ تا هست (قبول نداری بشمارا!)

$$S_{13} = \frac{(1)((q)^{13} - 1)}{(q - 1)} = \frac{((\sqrt{2})^{13} - 1)}{(\sqrt{2} - 1)} \cdot \frac{(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{2} + 1)} = \frac{(\sqrt{2}^{14} + \sqrt{2}^{13} - \sqrt{2} - 1)}{2 - 1}$$

سفت شر نه!

نترسید فقط وقت کنید که:

$$\sqrt{2}^{14} = \left(2^{\frac{1}{2}}\right)^{14} = 2^7 = 128 \quad , \quad \sqrt{2}^{13} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}^{12} = \sqrt{2}(64) = 64\sqrt{2}$$

بنابراین $\Delta r_{\text{یک}} =$

$$S_{13} = 128 + 64\sqrt{2} - \sqrt{2} - 1 = 127 + 63\sqrt{2}$$

دیرید که همچنین بحث ریاضیات پایه بود!

مثال ۵۴: مجموع هشت جمله نباله هندسی کدام است؟

$$\frac{230}{128} \quad (1) \quad \frac{255}{256} \quad (2) \quad \frac{5}{64} \quad (3) \quad \frac{1}{256} \quad (4)$$

حل: ابتدا جمله اول، قدر نسبت و تعداد جملات را مشخص می‌کنیم:

$$a = \frac{1}{2}, \quad q = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}, \quad n = 8$$

$$S_8 = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^8\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)} = 1 - \frac{1}{2^8} = 1 - \frac{1}{256} = \frac{255}{256}$$

مثال ۵۵: در تمعاویر هندسی $2, \frac{1}{2}, \dots$ مجموع ۵ جمله اول چند برابر مجموع ۵ جمله دوم است؟

$$2^5 \quad (1) \quad 2 \quad (2) \quad 2^2 \quad (3) \quad 2^{10} \quad (4)$$

یه تست جالب و نکته دار فوب، وقت کنید!

$$a = 2, \quad q = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}, \quad n = 5$$

روش اول: محاسبه پنج جمله اول که کاری نداره:

$$S_5 = \frac{(2) \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^5\right)}{\left(1 - \frac{1}{4}\right)} = \frac{(2)(1 - (2)^{-10})}{\left(\frac{3}{4}\right)} = \left(\frac{8}{3}\right)(1 - 2^{-10})$$

اما مجموع پنج جمله (و ۳ میشه چی؟) توی تضاد مسابی برآتون گفتم یادتونه؟!

$$\begin{aligned} S_{10} - S_5 &= \frac{(2) \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{10}\right)}{\left(1 - \frac{1}{4}\right)} - \left(\frac{8}{3}\right)(1 - 2^{-10}) \\ &= \left(\frac{8}{3}\right)(1 - 2^{-20}) - \left(\frac{8}{3}\right)(1 - 2^{-10}) \\ &= \left(\frac{8}{3}\right)(1 - 2^{-10})[1 + 2^{-10} - 1] = \left(\frac{8}{3}\right)(1 - 2^{-10})(2^{-10}) \end{aligned}$$

حالا مسئله از ما چی میخواهد؟

$$\frac{S_5}{S_{10} - S_5} = \frac{\left(\frac{8}{3}\right)(1 - 2^{-10})}{\left(\frac{8}{3}\right)(1 - 2^{-10})(2^{-10})} = \frac{1}{2^{-10}} = 2^{10}$$

اما به نظرتون این راه حل منطقیه؟!.... مسلماً فیرا!

روش دوم: این روش هالت ابتکاری داره خوب نیگاه کنید!

$$\frac{S_5}{S_{10} - S_5} = \frac{1}{\frac{S_{10}}{S_5} - \frac{S_5}{S_5}} = \frac{1}{\frac{S_{10}}{S_5} - 1} = \frac{1}{(1 + q^5) - 1} = \frac{1}{q^5} = \frac{1}{\left(\frac{1}{4}\right)^5} = 2^{10}$$

فرایش راه حل رو هال کردید؟!!

روش سوم:

فرض کنید احلا نفوایم مخ بسوزونیم و ابتلار به فرج بزیم!

اگه یادتون باشه توی دنباله حسابی گفتیم که وقتی مجموع جملات وسطی دنباله فواسته شده باشد مثلاً بگن پنج جمله دوم (مته اینها) دو راه هل داریم یکی اینکه پنج جمله دوم رو به صورت $S_{10} - S_5$ بنویسیم (مثل روش اول) و روش دوم اینکه پنج جمله دوم رو به صورت یه دنباله بگیرد در نظر بگیریم که جمله اولش میشه همون جمله ششم دنباله اصلی

$$\underbrace{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5}_{S_5}, \underbrace{a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}}_{S'_5}$$

$$S_5 = \frac{a(q^5 - 1)}{(q - 1)} \quad , \quad S'_5 = \frac{aq^5(q^5 - 1)}{(q - 1)} \quad \Rightarrow \quad \frac{S_5}{S'_5} = \frac{1}{q^5} = \frac{1}{\left(\frac{1}{4}\right)^5} = 2^{10}$$

وقت کنید توی این مسئله آفر کار عدگزاری کنیم بقطره.

تشفیض نزولی یا صعودی بودن دنباله هندسی

یکی از مواردی که توی برهنی از سوالای دنباله به کار میاد تشفیض صعودی یا نزولی بودن دنباله هاست در تضاعف حسابی این کار فیلی راهت بود چون اگر $\mathbf{d} > 0$ (دنباله عدی صعودی) و اگر $\mathbf{d} < 0$ (دنباله نزولی) بود اما در دنباله هندسی یه مقدار قضیه خرق فوکوله!

اول از همه فرض کنید قدر نسبت دنباله هندسی منفی باشد مثلاً $a = 5, q = -2$ اونوقت جملات دنباله هندسی به صورت زیر (رمیار):

$$5, -10, 20, -40, \dots$$

می بینیم که در این حالت دنباله هندسی نوسانی هست یعنی نه نزولیه و نه صعودی بنابراین:

در دنباله هندسی اگر $q > 0$ دنباله نوسانی هست

اما اگر $q > 0$ باید پھر، هالت رو در نظر بگیرید (البته دو هالت رو فقط باشید کاغذیه!)

الف) اگر $q > 1$ و $a_1 > 0$ دنباله صعودی هست (بهترین هالت!) مثلا:

$$a_1 = 2, q = 3 \Rightarrow 2, 6, 18, \dots$$

ب) اگر $0 < q < 1$ و $a_1 > 0$ دنباله نزولی هست مثلا:

$$a_1 = 2, q = \frac{1}{2} \Rightarrow 2, 1, \frac{1}{2}, \dots$$

اما اگر $a_1 < 0$ باشه تخفیفیه بر عکسهه یعنی:

ج) اگر $q > 1$ و $a_1 < 0$ دنباله نزولی هست مثلا:

$$a_1 = -2, q = 2 \Rightarrow -2, -4, -8, \dots$$

د) اگر $0 < q < 1$ و $a_1 < 0$ دنباله صعودی هست مثلا:

$$a_1 = -2, q = \frac{1}{2} \Rightarrow -2, -1, \frac{-1}{2}, \dots$$

هالت $q = 1$ هم که مشخصه یه دنباله ثابت میشه!

آقا اجازه: ما قاطعی کردیم!



استاد: بین من فورم اینطوری حفظ کردم:

اولاً هالت $q < 0$ که نوسانی هست بشی توشن نیست

حالا هالت $0 < q < 1$ رو میگیرم منفی و هالت $q > 1$ رو میگیرم مثبت

همچنین دنباله صعودی رو مثبت و دنباله نزولی رو منفی میگیریم بنابراین:

هالت $a_1 > 0$ و $0 < q < 1$ میشه مثبت در منفی که میشه منفی بنابراین دنباله نزولی هست

بقیه هالت ها رو هم به همین صورت میشه!

آقا اجازه: آگر سرچلسه بازم یادمون رفت پس؟



استاد: اصلاً نگران نباش لغایه یه مثال عدی و اسه فورت بنزی تا یادت بیار.

حالا یه سوال: آگر در صورت سوال گفته بود که دنباله غیر نزولی کدام هالت ها میشه؟

آقا اجازه میشه:



$$a > 0, \quad q > 1$$

$$a < 0, \quad 0 < q < 1$$

پون هردوشون صعودی هستن.

استاد: خوبه ولی یه هالت رو با انداختن!

غیر نزولی یعنی صعودی یا نوسانی! پس هالت $0 < q < 1$ هم جزو غیر نزولی محسوب میشه! گرفتی؟

مثال ۵۶: دنباله هندسی $\dots, \frac{1}{2}, x, 2$ غیر نزولی است مجموع شش جمله اول آن کدام است؟

$$\frac{23}{16} \quad (۱)$$

$$\frac{11}{8} \quad (۲)$$

$$\frac{21}{16} \quad (۳)$$

$$\frac{41}{32} \quad (۴)$$

یه تست فیلی هوشمندانه از لکلور سراسری! توی این تست طراح حداقل تلاش خودشو انجام داره تا پنهانها رو به اشتباه بذرآزه! وقت کنید که دنباله غیر نزولی یعنی صعودی یا نوسانی

حالا بایم سراغ حل مسئله:

$$\Rightarrow a_1 = 2 \Rightarrow \frac{a_3}{a_1} = q^2 = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4} \Rightarrow q = \pm \frac{1}{2}$$

$$q = \frac{1}{2} \quad \text{اگر} \quad \text{و، نظر بگیریم (اریز)}$$

$$a_1 = 2 > 0, \quad 0 < q < 1 \Rightarrow \text{دنباله نزولی هست}$$

$$\text{پس فقط می مونه حالت } q = -\frac{1}{2} \quad \text{در این صورت:}$$

$$a_1 = 2, q = -\frac{1}{2} \Rightarrow S_6 = \frac{2 \left[\left(\frac{-1}{2} \right)^6 - 1 \right]}{\left(\frac{-1}{2} - 1 \right)} = \frac{2 \left(1 - \frac{1}{64} \right)}{\frac{3}{2}} = \frac{21}{16}$$

دنباله هندسی تا محدود

از ریاضیات پایه می دونیم که اگر یک عدد بین -1 و 1 باشد برسونیم اون عدد به سمت صفر میل می کنه مثلا:

$$d = \frac{1}{2} \Rightarrow d^2 = \frac{1}{4}, d^3 = \frac{1}{8}, \dots, n \rightarrow \infty \Rightarrow d^n = 0$$

بنابراین اگر یک دنباله هندسی تا محدود باشد باشیم مجموع جملات دنباله از ابتدی

زیر بررسی میاد:

$$S_{\infty} = \frac{a(1 - q^n)}{1 - q} \quad \xrightarrow{q^{n \rightarrow 0}} \quad S_{\infty} = \frac{a}{1 - q}$$

$-1 < q < 1 \Rightarrow S_{\infty} = \frac{a}{1 - q}$

مثال ۵۷: مجموع جملات یک دنباله هندسی نامتناهی که جمله اول آن ۱۶ و قدر نسبت آن $\frac{1}{7}$ باشد کدام است؟

(۳) ۱۸

(۲) ۲۱

(۱) ۳۶

(۴) ۴۲

$$S_{\infty} = \frac{a}{1 - q} = \frac{18}{1 - \frac{1}{7}} = \frac{18}{\frac{6}{7}} = 21$$

مثال ۵۸: مجموع یک تناهی هندسی چهار برابر جمله اول آن است قدر نسبت این تناهی چقدر است؟

 $\frac{7}{8}$ (۱) $\frac{5}{8}$ (۲) $\frac{3}{4}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴)

$$S_{\infty} = 4a_1 \Rightarrow \frac{a_1}{1 - q} = 4a_1 \Rightarrow \frac{1}{1 - q} = 4 \Rightarrow 1 - q = \frac{1}{4} \Rightarrow q = \frac{3}{4}$$