


نام و نام خانوادگی :	رشته : ریاضی - فیزیک	تعداد صفحه: ۲	سؤالات امتحان نهایی درس : ریاضیات گسسته
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ صبح	ساعت شروع: ۸	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۱	http://aee.medu.ir		
ردیف	سوالات پاسخ نامه دارد. (استفاده از ماشین حساب ساده، با چهار عمل اصلی، مجاز است.)		

۱	هر یک از گزاره های زیر را اثبات و یا با ارائه مثال نقض کنید. الف) برای هر عدد طبیعی n ، عدد $1 + 2^n$ اول است. ب) مربع هر عدد فرد، عددی فرد است.	۱
۱/۲۵	اعدادی صحیح هستند و $b_۳$ ، $b_۲$ ، $b_۱$ هم همان اعداد ولی به ترتیب دیگری قرار گرفته اند. ثابت کنید $(a_۱ - b_۱)(a_۲ - b_۲)(a_۳ - b_۳)$ عددی زوج است.	۲
۰/۷۵	اگر عدد طبیعی a ، دو عدد $(5k+9)$ و $(8k+13)$ را عاد کند، ثابت کنید: $a = 7$ یا $a = 42$ بیابید.	۳
۱	اگر باقیمانده تقسیم عدد a بر دو عدد ۶ و ۷ به ترتیب ۳ و ۵ باشد، باقیمانده تقسیم عدد a را بر ۴۲ بیابید.	۴
۱/۲۵	ثابت کنید باقیمانده تقسیم هر عدد بر ۹، برابر است با باقیمانده تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر ۹.	۵
۱/۷۵	دانش آموزی در یک آزمون علمی شرکت کرده است، او به سوالات ۵ امتیازی و ۳ امتیازی پاسخ داده و مجموعاً ۴۲ امتیاز کسب کرده است. (پاسخ به هر سؤال یا امتیاز کامل دارد و یا امتیازی ندارد). این دانش آموز به چه صورت هایی توانسته این امتیاز را کسب کند؟	۶
۲/۲۵	با توجه به گراف G (شکل مقابل) به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) یک مسیر به طول ۳ از a به c بنویسید. ب) یک دور به طول ۴ مشخص کنید. پ) درجه رأس a را در گراف \bar{G} تعیین کنید. ت) آیا گراف G همبند است؟ (با ذکر دلیل) ث) $N_G[f]$ را بنویسید.	۷
۱	به سوالات زیر پاسخ داده و برای آنها دلیل ارائه کنید. الف) یک گراف کامل ۱۱ رأسی چند یال دارد؟ ب) در یک گراف از مرتبه ۸ با $\Delta = 3$ ، حداقل چند رأس برای احاطه همه رئوس لازم است؟	۸
۱/۵	به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) گراف C_8 را رسم کنید. ب) یک 7 -مجموعه از آن مشخص کنید. پ) یک مجموعه احاطه گر مینیمال 4 -عضوی از آن را مشخص کنید.	۹

ادامه سوالات در صفحه ۹۵

نام و نام خانوادگی :	رشته : ریاضی - فیزیک	تعداد صفحه: ۲	سؤالات امتحان نهایی درس : ریاضیات گسسته
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ صبح	ساعت شروع: ۸ صبح	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۱			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir
ردیف	سوالات پاسخ نامه دارد. (استفاده از ماشین حساب ساده، با چهار عمل اصلی، مجاز است.)	ردیفه	نمره

۱۰	با توجه به گراف (G) به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) عدد احاطه گری را برای گراف زیر مشخص کنید. ب) یک مجموعه احاطه گر مینیمال مشخص کنید که مینیمم نباشد.	۱/۲۵	 (G)
۱۱	به چند طریق می‌توان ۴۵ دانش آموز را در چهار کلاس ۸ نفره ، ۱۰ نفره ، ۱۲ نفره و ۱۵ نفره در یک مدرسه قرار داد ؟	۱	
۱۲	برای کنار هم قرار گرفتن ۴ دانش آموز پایه دوازدهم و ۶ دانش آموز پایه یازدهم مسئله‌ای طرح کنید که پاسخ آن $7! \times 4!$ باشد.	۱	
۱۳	تعداد جواب‌های صحیح و نامنفی معادله زیر را با شرایط داده شده به دست آورید. $x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 9$ $(x_i \geq 0 \text{ و } 1 \leq i \leq 4 \text{ و } x_5 = 2)$	۱/۵	
۱۴	دومربع لاتین متعامد 3×3 را بنویسید. (دلیل متعامد بودن آنها را بیان کنید).	۱/۲۵	
۱۵	تعداد توابع یک به یک، از یک مجموعه ۵ عضوی به یک مجموعه ۷ عضوی را به دست آورید. (راه حل نوشته شود)	۱/۲۵	
۱۶	حداقل چند نقطه از داخل مثلثی متساوی الاضلاع به طول ضلع ۲، انتخاب کنیم تا مطمئن باشیم حداقل دونقطه از آنها فاصله شان کمتر از ۱ است ؟	۱	
	"موفق باشید"	۲۰	جمع نمره

راهنماي تصحیح امتحان نهايی درس: ریاضیات گسته	رشته: ریاضی فیزیک	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهریور ماه سال ۱۴۰۱		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	

ردیف	راهنماي تصحیح	نمره
۱	الف) نادرست، مثال نقض $n=3$ (۰/۵) (مشابه کاردکلاس صفحه ۳) $a=2k+1 \Rightarrow a' = (2k+1)' = 2(2k'+2k)+1 = 2k' + 1 \quad (۰/۲۵)$ ب) درست (۰/۲۵)، اثبات: (تمرین صفحه ۸)	
۲	اگر $(a_1-b_1)(a_2-b_2)(a_3-b_3)$ زوج نباشد (فرض خلف) پس عددی فرد است، (۰/۲۵) پس هر سه عامل (a_1-b_1) و (a_2-b_2) و (a_3-b_3) هم باید فرد باشند، (۰/۲۵) در نتیجه مجموع آنها هم باید فرد باشد. (۰/۲۵) اما با توجه به فرض مسئله: مجموع این سه عبارت برابر صفر است که عددی زوج است، (۰/۲۵) با توجه به تناقض ایجاد شده، فرض خلف باطل و حکم ثابت می شود. (۰/۲۵) (مثال صفحه ۶)	۱/۲۵
۳	(مشابه مثال ۳ صفحه ۱۲) $\begin{cases} a \mid 5k+9 \\ a \mid 8k+13 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \mid 40k+72 \\ a \mid 40k+65 \end{cases} \Rightarrow a \mid 7 \quad (۰/۲۵) \Rightarrow a=1 \vee a=7$	۰/۷۵
۴	$a=6q+3 \quad (۰/۲۵) \Rightarrow 6a=42q+21 \quad (۰/۲۵) \Rightarrow a=42(q-q'-1)+33 \quad (۰/۲۵) \Rightarrow r=33 \quad (۰/۲۵)$ $a=6q'+5 \quad (۰/۲۵) \Rightarrow 6a=42q'+30 \quad (۰/۲۵)$ (مشابه مثال صفحه ۱۴)	۱
۵	عدد n رقمی $A=a_{n-1}a_{n-2}\dots a_0$ را بسط می دهیم (۰/۲۵) و در هم نهشتی به پیمانه ۹ به جای هر توان 10^k را قرار می دهیم. $A=10^{n-1} \times a_{n-1} + \dots + \dots + 10^1 a_1 + 10 a_0 + a_0 \Rightarrow A \equiv 1 \times a_{n-1} + \dots + 1 \times a_1 + a_0 \Rightarrow A \equiv a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0$ $\quad (۰/۲۵) \quad (۰/۲۵) \quad (۰/۲۵)$	۱/۲۵
۶	$5x+3y=42 \Rightarrow 5x \equiv 42 \equiv 0 \quad (۰/۲۵) \Rightarrow x \equiv 0 \quad (۰/۲۵) \Rightarrow x=3k \quad (۰/۲۵) \Rightarrow 5(3k)+3y=42 \Rightarrow y=-5k+14 \quad (۰/۲۵)$ $\Rightarrow \begin{cases} x=0 & (۰/۲۵) \\ y=14 & (۰/۲۵) \end{cases}; \quad \begin{cases} x=3 & (۰/۲۵) \\ y=9 & (۰/۲۵) \end{cases}; \quad \begin{cases} x=6 & (۰/۲۵) \\ y=4 & (۰/۲۵) \end{cases}$ (مشابه مثال صفحه ۲۸)	۱/۷۵
۷	الف) $a b g c$ (۰/۵) (تعريف مسیر صفحه ۳۸) ب) $b c d g b$ (۰/۵) (تعريف دور صفحه ۳۸) پ) ۵ (۰/۲۵) (مسئله صفحه ۳۷) ت) خیر (۰/۲۵) زیرا دارای رأس ایزوله است (هیچ مسیری از f به سایر رئوس وجود ندارد). (۰/۲۵) (تعريف گراف همبند صفحه ۳۹) ث) $N_G[f] = \{f\}$ (مشابه مثال صفحه ۳۶)	۲/۲۵
۸	الف) (مسئله ۱ صفحه ۳۸) $\frac{p(p-1)}{2} = \frac{11(11-1)}{2} = 55 \quad (۰/۵)$ $\left \frac{n}{\Delta+1} \right = \left \frac{\lambda}{\gamma+1} \right = 2 \quad (۰/۵)$ ب) (صفحه ۴۹) $\left \frac{n}{\Delta+1} \right = \left \frac{\lambda}{\gamma+1} \right = 2 \quad (۰/۵)$	۱

راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضیات گستته	رشته: ریاضی فیزیک	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهریور ماه سال ۱۴۰۱ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			

ردیف	راهنماي تصحیح	نمره
۹	الف) رسم گراف C_8 (۰/۵) (صفحه ۳۸) ب) $D = \{a, d, g\}$ (۰/۵) (تعريف صفحه ۴۴) پ) $\{a, c, e, g\}$ (۰/۵) (صفحه ۴۶) يك مجموعه احاطه گر مینيمال	۱/۵
۱۰	الف) $\{g, c\} \Rightarrow \gamma(G) = 2$ (۰/۵) (مشابه تمرين ۳ صفحه ۵۲) ب) $\{h, d, b\}$ (۰/۷۵) (صفحه ۴۶)	۱/۲۵
۱۱	در صورتی که جواب را به فرم $\frac{45!}{8! \times 10! \times 12! \times 15!}$ هم نوشتند، نمره داده شود. $\left(\underbrace{45}_{(0/25)} \times \underbrace{37}_{(0/25)} \times \underbrace{27}_{(0/25)} \times \underbrace{15}_{(0/25)} \right)$ (مثال صفحه ۵۹)	۱
۱۲	۴ دانش آموز پایه دوازدهم و ۶ دانش آموز پایه یازدهم را به چند طریق می توان در يك ردیف (کنار هم) قرار داد به طوری که همواره دانش آموزان پایه دوازدهم در کنار هم باشند. (۱نمره) (با توجه به باز پاسخ بودن سؤال، به پاسخ های صحیح دیگر نمره داده شود) (تمرين صفحه ۷۱)	۱
۱۳	$x_i + 4x_r + x_r + x_f + 2 = 9 \Rightarrow x_i + 4x_r + x_r + x_f = 7 \quad (0/25)$ $x_r = 0 \Rightarrow x_i + x_r + x_f = 9 \quad (0/25) \Rightarrow \binom{9}{2} = 36 \quad (0/25) \Rightarrow 36 + 10 = 46 \quad (0/25)$ $x_r = 1 \Rightarrow x_i + x_r + x_f = 5 \quad (0/25) \Rightarrow \binom{5}{2} = 10 \quad (0/25)$ (مشابه سوال ۷۱ صفحه ۹)	۱/۵
۱۴	الف) به هر کدام از مربع های لاتین مانند نمونه زیر (۰/۵) نمره . متعامدند چون در مربع ترکیبی عدد تکراری نداریم. (۰/۲۵) (صفحه ۶۴)	۱/۲۵
۱۵	اگر فرض کنیم $B = \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_7\}$ و $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ (۰/۲۵)، برای تعریف f روی هر عضو A ، B انتخاب داریم (۰/۲۵)، بنابراین طبق اصل ضرب (۰/۲۵) تعداد کل تابع های يك به يك برابر است با $\frac{7!}{2!} = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 5040 \quad (0/25)$ (اگر دانش آموزی از فرمول $\frac{7!}{2!} = 5040$ پاسخ دهد نمره کامل داده شود). (مشابه مثال صفحه ۷۸)	۱/۲۵
۱۶	۵ نقطه را کبوتر (۰/۲۵) و ۴ مثلث کوچک را لانه (۰/۲۵) در نظر می گیریم. طبق اصل لانه کبوتری (۰/۲۵) ($4 < 5$) حداقل يك لانه (مثلث) وجود دارد که دو نقطه (کبوتر) در آن قرار می گیرد. (۰/۲۵) (مشابه مثال صفحه ۸۲)	۱
۲۰	جمع نمره	

«همکاران گرامی لطفا برای راه حل های صحیح دیگر بارم را به تناسب تقسیم فرمایید.»