




ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	رشته: ادبیات و علوم انسانی / علوم و معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۲	سوالات آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۱
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	تاریخ آزمون: پایه دهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و اینترنت داخل و خارج کشور خرد داد ۱۴۰۳ azmoon.medu.ir			
نمره	سوالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.		
			ردیف
۱	<p>درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.</p> <p>(الف) در معادله درجه دوم، $\Delta = 0$ باشد. آنگاه معادله دارای ریشه مضاعف است.</p> <p>(ب) در نمودار دایره ای گزارش درصد، به تنها یکی اطلاعات کافی را در اختیار ما قرار می دهد.</p> <p>(ج) مجموعه کل واحدهای آماری را جامعه آماری می نامند.</p> <p>(د) وقتی با داده هی دور افتاده مواجه هستید، میانگین معمولاً بازتاب بهتری از داده ها می دهد تا میانه.</p>		
۱	<p>در سوالات زیر گزینه درست را انتخاب نمایید.</p> <p>(۱) معادله ریاضی عبارت توصیفی " سه برابر پول شخصی به اضافه هی نصف آن ۲۸۰۰۰ تومان می شود" کدام است؟</p> <p>الف) $\frac{3x}{2} + x = 14000$ ب) $3x + \frac{x}{2} = 28000$ ج) $3x + x = 28000$ د) $3x + \frac{x}{2} = 14000$</p> <p>(۲) اگر $\{(y, x), (2, 5), (3, 4), (1, 2), (2, 1)\}$ یک تابع باشد، مقدار $y + x$ کدام است؟</p> <p>الف) ۵ ب) ۱ ج) ۶ د) ۴</p> <p>(۳) مقدار متغیر سوم در نمودار حبابی، متناسب با کدام یک از موارد زیر است.</p> <p>الف) شعاع دایره ها ب) مساحت دایره ها ج) محیط دایره ها د) قطر دایره ها</p> <p>(۴) وزن شخصی با نماتوب (BMI) 20 و قد 150 سانتی متر کدام است؟</p> <p>الف) ۴۰ ب) ۴۵ ج) ۵۰ د) ۵۵</p>		
۱	<p>جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.</p> <p>(الف) برای حل معادله $7 = 6x + x^2$ به روش مربع کامل، عدد را به دو طرف اضافه می کنیم.</p> <p>(ب) تقریباً درصد از مشاهدات در فاصله هی یک برابر انحراف معیار از میانگین قرار دارد.</p> <p>(ج) موتورسواری با سرعت ثابت 3 متر در ثانیه در حرکت است. نمایش جبری رابطه بین زمان (t) و مسافت طی شده (d) به شکل $d = 3t$ نمایش داده می شود. در این رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته است.</p>		
۰.۷۵	معادله درجه دومی بنویسید که ریشه های آن -4 و 3 باشد.		
۲	<p>معادله های درجه دوم زیر را به روش های خواسته شده حل کنید.</p> <p>الف) $x^2 - 3x = 0$ روش تجزیه ب) $3x^2 + 5x - 2 = 0$ روش کلی (Δ)</p>		
۱.۵	معادله $1 = \frac{3x+1}{x^2-1} + \frac{x}{x+1}$ را حل کنید.		
۰.۵	<p>برد تابع زیر را با توجه به ضابطه و دامنه داده شده به دست آورید.</p> <p>$f : A \rightarrow B$ $A = \{5, 9\}$ $f(x) = \sqrt{x-1}$ $B = \{\dots, \dots\}$</p>		



سوالات آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۱	تعداد صفحه: ۲	رشته: ادبیات و علوم انسانی / علوم و معارف اسلامی	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح																		
پایه دهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه																		
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و اینتلگر داخل و خارج کشور خرد داد ۱۴۰۳ azmoon.medu.ir			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش																		
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.		نمره																		
۱۰	کدام رابطه تابع است و کدام رابطه تابع نیست؟ چرا؟																				
۱	 																				
۹	نمودار تابع خطی f از نقطه‌ی (۱,۵) می‌گذرد و $f(2) = 8$ است. ضابطه‌ی آن را مشخص کنید.		۱.۵																		
۱۰	<p>(الف) رأس سهمی به معادله $y = -(x-1)^2$ را مشخص کنید و به کمک آن نمودار سهمی را رسم کنید.</p> <p>(ب) تابع هزینه‌ی شرکتی $R(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x + 40$ و تابع درآمد آن $C(x) = 18x$ است. بیشترین مقدار سود را بیابید</p>		۲																		
۱۱	<p>متغیرها را در چهار مقیاس «اسمی، ترتیبی، فاصله‌ای و نسبتی» دسته‌بندی کنید.</p> <p>(الف) وزن دانش آموزان یک کلاس</p> <p>(ب) رتبه‌ی دانش آموز در مسابقه‌ی علمی</p> <p>(ج) درجه‌ی حرارت شهرهای مختلف بر حسب سانتی‌گراد (سلسیوس)</p>		۰.۷۵																		
۱۲	روش‌های گردآوری داده‌ها را نام ببرید.		۱																		
۱۳	میانگین، انحراف معیار و واریانس داده‌های زیر را به دست آورید.		۱.۵																		
۱۴	سن بازیکنان والیبال نوجوانان یک کشور به شرح زیر است. نمودار نقطه‌ای آن را رسم کنید. ۱۳, ۱۲, ۱۵, ۱۳, ۱۲, ۱۴, ۱۴, ۱۲, ۱۴, ۱۷, ۱۸, ۱۴		۱																		
۱۵	<p>برای داده‌های مقابل:</p> <p>الف) چارک‌ها را مشخص کنید. (ب) دامنه‌ی میان چارکی را به دست آورید. (ج) نمودار جعبه‌ای داده‌ها را رسم نمایید.</p>		۱.۷۵																		
۱۶	<p>(الف) اگر در یک نمودار راداری ۵ متغیر حضور داشته باشند، زاویه‌ی بین دو شعاع مجاور را به دست آورید.</p> <p>(ب) نمرات ۵ درس دانش آموزی در جدول زیر داده شده است. نمودار راداری آن را رسم کنید.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>درس</th> <th>فارسی</th> <th>ریاضی</th> <th>عربی</th> <th>منطق</th> <th>جامعه‌شناسی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>نمره</td> <td>۱۷</td> <td>۱۴</td> <td>۱۶</td> <td>۸</td> <td>۱۰</td> </tr> <tr> <td>بیشینه</td> <td>۲۰</td> <td>۲۰</td> <td>۲۰</td> <td>۲۰</td> <td>۲۰</td> </tr> </tbody> </table>	درس	فارسی	ریاضی	عربی	منطق	جامعه‌شناسی	نمره	۱۷	۱۴	۱۶	۸	۱۰	بیشینه	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰		۱.۷۵
درس	فارسی	ریاضی	عربی	منطق	جامعه‌شناسی																
نمره	۱۷	۱۴	۱۶	۸	۱۰																
بیشینه	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰																

ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۱
تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳	
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://azmoon.medu.gov.ir	تعداد صفحه: ۴	پایه دهم دوره دوم متوسطه
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) درست (ص ۲۸) ب) نادرست (ص ۷۳) ج) درست (ص ۱۱۲)	۱ هر مرد (۰/۲۵)
۲	۱) گزینه‌ی الف (ص ۱۱) ۲) گزینه‌ی ج (ص ۲۹) ۳) گزینه‌ی ب (ص ۴۱) هر مرد (۰/۲۵)	۱ هر مرد (۰/۲۵)
۳	الف) ۹ (ص ۲۳) ب) ۶۸ (ص ۹۳)	۱ هر مرد (۰/۲۵)
۴	روش اول: $(x+4)(x-3) = \cdot \rightarrow x^2 + x - 12 = \cdot$ $x_1 + x_2 = -4 + 3 = 1$ روش دوم: $x_1 \cdot x_2 = -4 \times 3 = -12 \rightarrow x^2 + x - 12 = \cdot$	۰/۷۵ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)
۵	الف) $x^2 - 3x = \cdot \rightarrow x(x-3) = \cdot \rightarrow \begin{cases} x = \cdot \\ x = 3 \end{cases}$ ب) $\Delta = b^2 - 4ac = 5^2 - 4(3)(-2) = 25 + 24 = 49$ $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 \pm \sqrt{49}}{2 \times 3} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-5 + 7}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \\ x_2 = \frac{-5 - 7}{6} = \frac{-12}{6} = -2 \end{cases}$	(۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)
۶	روش اول: $\frac{3x+1}{x^2-1} + \frac{x}{x+1} - 1 = \cdot \Rightarrow \frac{3x+1}{x^2-1} + \frac{x(x-1)}{x^2-1} - \frac{x^2-1}{x^2-1} = \cdot \Rightarrow$ $\frac{3x+1+x^2-x-x^2+1}{x^2-1} = \cdot \Rightarrow \frac{2x+2}{x^2-1} = \cdot \Rightarrow \begin{cases} 2x+2 = \cdot \\ x^2-1 \neq \cdot \end{cases} \Rightarrow$ معادله ریشه ندارد \Rightarrow ریشه مخرج روش دوم: $\frac{3x+1+x^2-x}{x^2-1} = 1 \Rightarrow x^2 + 2x + 1 = x^2 - 1 \Rightarrow$ معادله ریشه ندارد \Rightarrow ریشه مخرج روش سوم: $(x^2 - 1) \left(\frac{3x+1}{x^2-1} + \frac{x}{x+1} \right) = (x^2 - 1) \times 1 \Rightarrow 3x + 1 + x^2 - x = x^2 - 1$ $\Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow$ معادله ریشه ندارد \Rightarrow ریشه مخرج مشابه تمرين (ص ۳۷)	۱/۵ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۱	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	ساعت شروع: ۳۰:۰۰ صبح										
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶											
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://azmoon.medu.gov.ir	تعداد صفحه: ۴	پایه دهم دوره دوم متوسطه										
۰/۵	$f(5) = \sqrt{5-1} = 2, f(9) = \sqrt{9-1} = \sqrt{8}$ $B = \{2, \sqrt{8}\}$ (۰/۵)	۷										
	اگر فقط مقادیر تابع در نقاط دامنه حساب شده، ۰/۲۵ داده شود. (۵۱)											
۱	الف) خیر، زیرا خطی موازی محور z هست که نمودار را در دو نقطه قطع کرده است. (۰/۲۵) ب) بله، زیرا از هر عضو مجموعه A ، دقیقاً یک پیکان خارج شده است. (۰/۲۵) (۴۵)	۸										
۱/۵	$f(1) = 5 \rightarrow m = \frac{8-5}{2-1} = 3$ $f(2) = 8 \rightarrow m = \frac{8-5}{2-1} = 3$ $f(x) = mx + h \rightarrow f(x) = 3x + h \rightarrow h = 2 \rightarrow f(x) = 3x + 2$ به روش (۱) $y - 5 = 3(x - 1)$ نیز نمره داده شود. (۰/۲۵) روش دوم: $f(1) = 5 \rightarrow \begin{cases} 5 = m + h \\ 8 = 2m + h \end{cases} \rightarrow m = 3, h = 2 \rightarrow f(x) = 3x + 2$ (۰/۲۵) (۰/۵) (۵۹)	۹										
۱	الف) روش اول: رأس: $(1, -3)$ (۰/۵) رسم درست شکل (۰/۵) روش دوم:  <table border="1"><tr><td>x</td><td>۰</td><td>۱</td><td>۲</td><td>۳</td></tr><tr><td>y</td><td>-1</td><td>-3</td><td>-1</td><td>5</td></tr></table> رسم درست شکل (۰/۵) (۶۸)	x	۰	۱	۲	۳	y	-1	-3	-1	5	۱۰
x	۰	۱	۲	۳								
y	-1	-3	-1	5								
۱	$P(x) = R(x) - C(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 30x - 18x - 40 = -\frac{1}{2}x^2 + 12x - 40$ $x = \frac{-12}{2(-\frac{1}{2})} = 12 \Rightarrow P(12) = -\frac{1}{2} \times 12^2 + 12(12) - 40 = 38$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۷۰)											

ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۱															
تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳																
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://azmoon.medu.gov.ir	تعداد صفحه: ۴	پایه دهم دوره دوم متوسطه															
۰/۷۵	(ص) ۸۰	الف) نسبتی (۰/۲۵) ب) فاصله‌ای (۰/۲۵) ج) ترتیبی (۰/۲۵)															
۱	(ص) ۷۶	مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، دادگانها (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)															
۱/۵	$\bar{x} = \frac{۲+۵+۸+۹}{۴} = ۶ \quad (۰/۵)$ $\sigma = \sqrt{\frac{(۲-۶)^۲ + (۵-۶)^۲ + (۸-۶)^۲ + (۹-۶)^۲}{۴}} = \sqrt{\frac{۱۶+۱+۴+۹}{۴}} = \frac{\sqrt{۳۰}}{۲} \quad (۰/۵)$ $\sigma^2 = \frac{۳۰}{۴} = ۷/۵ \quad \text{واریانس} \quad (۰/۵)$ <p>اگر ابتدا واریانس و سپس انحراف معیار محاسبه شده، نمره داده شود.</p> $\bar{x} = \frac{۲+۵+۸+۹}{۴} = ۶ \quad (۰/۵)$	روش اول: روش دوم:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>داده‌ها</th> <th>انحراف مشاهدات از میانگین</th> <th>انحراف مشاهدات از میانگین به توان ۲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۲</td> <td>۴</td> <td>۱۶</td> </tr> <tr> <td>۵</td> <td>۱</td> <td>۱</td> </tr> <tr> <td>۸</td> <td>۲</td> <td>۴</td> </tr> <tr> <td>۹</td> <td>۳</td> <td>۹</td> </tr> </tbody> </table> $\sigma = \frac{\sqrt{۳۰}}{۲} \Rightarrow \sigma^2 = \frac{۳۰}{۴} = ۷/۵ \quad \text{واریانس} \quad (۰/۲۵) \quad (۰/۵)$	داده‌ها	انحراف مشاهدات از میانگین	انحراف مشاهدات از میانگین به توان ۲	۲	۴	۱۶	۵	۱	۱	۸	۲	۴	۹	۳	۹	(۰/۲۵)
داده‌ها	انحراف مشاهدات از میانگین	انحراف مشاهدات از میانگین به توان ۲															
۲	۴	۱۶															
۵	۱	۱															
۸	۲	۴															
۹	۳	۹															
۱		اگر به جای جدول، محور کشیده شده است، نمره داده شود. رسم درست ۱ نمره (۱۰۶)															

ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۱
تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳	
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://azmoon.medu.gov.ir	تعداد صفحه: ۴	پایه دهم دوره دوم متوسطه

۱/۷۵	<p>الف) $Q_1 = \frac{6+8}{2} = 7$, $Q_2 = m = 14$, $Q_3 = \frac{18+20}{2} = 19$</p> <p>(۰/۲۵)</p> <p>ب) $IQR = 19 - 7 = 12$</p> <p>(۰/۲۵)</p> <p>ج) (۱۰۶)</p> 	۱۵
۱/۷۵	<p>الف) $\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$ زاویه</p> <p>(۰/۵)</p> <p>ب) تقسیم‌بندی درست شعاع‌ها</p> <p>(۰/۲۵)</p> <p>هم اندازه بودن شعاع‌ها</p> <p>(۰/۲۵)</p> <p>رسم نمودار بیشینه یا</p> <p>مشخص کردن نقاط بیشینه</p> <p>(۰/۲۵)</p> <p>رسم درست نمودار</p> <p>(۰/۵)</p> 	۱۶
۲۰	<p>همکاران گرامی، خدا قوت، تمام موارد در خور اهمیت جهت نمره‌گذاری در راهنمای تصحیح نوشته شده است، خواهشمند است جهت رعایت عدالت آموزشی، برگه‌های دانش آموزان، به راه حل‌های درست دیگر به تناسب بارم نمره تعلق گیرد.</p> <p>با سپاس از مساعدت همکاران بزرگوار</p>	